

روز باقی حاجی، ئېزىز ئابلىمىت

جىگەر كېسەللىكلەرنى ئۇرۇش تېبابىتىدە مۇۋالاش



شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

مۇقۇننى لايىھىلىگۈچى : يالقۇنجان ئىسمائىل مۇزارىت



ISBN 7-5372-3822-7

(民文) 定价 : 7.00 元

ISBN 7-5372-3822-7



9 787537 238229 >

كىرىش سۆز

تەننىڭ سالامەتلىكى — كۆڭۈلنىڭ خاتىرجەملىكىنىڭ ئاساسىدۇر. كۆڭۈلنىڭ خاتىرجەملىكى بارلىق ئىشلىرىمىزنىڭ غەلىبىلىك بولۇشىنىڭ يول باشلامچىسى بولغانلىقىدەك جىگەرنىڭ ساغلاملىقى ھەرقانداق جان ئىگىسىنىڭ ھاياتلىقىنىڭ ئاساسىدۇر. جىگەر بولسا ئادەم بەدىنىدىكى رەئىس ئەزالارنىڭ بىرىدۇر. ھەرقانداق جان ئىگىسىنىڭ ئىستېمال قىلغان ئوزۇقلۇقلىرى ئاشقازان، 12 بارماق ۋە ئىنچىكە ئۈچەيلەرنىڭ ھەزىمىدىن كېيىن جىگەرگە سۈمۈرۈلگەن كەيلىس (سۇيۇق ماددىلار) نى ئۆزىنىڭ تەبىئىي ھارارىتى بىلەن پىششىقلاپ ئىشلەپ سۇيۇق قىسمى (سۇ قىسمى) نى بۆرەككە يوللاپ قالغان قىسمىدىن سەپرا، قان، بەلغەم، سەۋدا خىلىتلىرىنى ھاسىل قىلىپ پۈتۈن بەدەننى ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلەيدىغان خىمىيىۋى زاۋۇت ۋە زاپاس ساقلاش ئامبىرىدۇر.

جىگەرنىڭ نورمالسىزلىقى پۈتۈن بەدەننىڭ نورمالسىزلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇڭا، مەيلى قانداق ۋاقىتتا بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، جىگەرنىڭ ساغلاملىقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش ئىنتايىن مۇھىم. بىز خەلقىمىزنىڭ بۇ خىل كېسەللىك ئاساردىن تىنىدىن قۇتۇلۇپ ھاياتقا ھەر ۋاقىت كۈلۈپ قارىشىغا مەلۇم دەرد-جىدە پايدىسى بولار دېگەن مەقسەتتە ئۇزۇن يىللىق تېببىي داۋالاش ئەمەلىيىتىمىز جەريانىدا سىناقتىن ئۆتۈپ تارىم ۋادىسىدىكى

كۆپلىگەن خەلقنىڭ تۈرلۈك جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۈنۈملۈك داۋالاپ ساقايتىشتا ئۈنۈملۈك رول ئوينىغان يېڭى رېتسېپلارنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ «جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۇيغۇر تېبابىتىدە داۋالاش» دېگەن بۇ كىتابچىنى تۈزۈپ چىقتۇق. كىتابقا كىرگۈزۈلگەن رېتسېپلارنىڭ ھەممىسى ئەمەلىي ئۈنۈم بەرگەن رېتسېپلار بولۇپ، تۈرلۈك جىگەر كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولغان بىمارلارنىڭ ئۆز - ئۆزىنى داۋالاپ ساقايتىشىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدۇ.

بىز بۇ كىتابىمىزدا جىگەرنىڭ تۈزۈلۈشى، ئورنى، خىزمىتى، مىزاجى ھەمدە جىگەرنىڭ ساغلاملىقىنى ساقلاش، جىگەر كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز قويۇش، دورا بەلگىلەش، ئوزۇقلۇق، روھىي جىسمانىي جەھەتلەردىكى پەرۋىشلەرگە ئائىت مەسىلىلەر ئۈستىدە قەدىمكى كلاسسىك تېببىي ئەسەرلەردىن پايدىلانغان ھەمدە داۋالاش كەسپى بىلەن شۇغۇللانغان 38 يىل ئىچىدە ھاسىل قىلغان نەزەرىيىۋى ۋە ئەمەلىي داۋالاش تەجرىبىلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتىمىز.

مۇندەرىجە

- 1 جىگەر ھەققىدە چۈشەنچە
- 1 1. جىگەرنىڭ ئورنى
- 1 2. جىگەرنىڭ تۈزۈلۈشى
- 2 3. جىگەرنىڭ بەدەندىكى رولى
- 4 4. جىگەرنى ئاسراش ۋە جىگەر ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
- 3 تەدبىرلىرى
- 5 5. جىگەر ساغلاملىقىنىڭ بەلگىسى
- 6 6. جىگەر كېسەللىكلىرىدە كۆرۈلىدىغان ئورتاق
- 6 ئالامەتلەر
- 7 7. جىگەر مىزاجىنىڭ بەلگىلىرى
- 9 جىگەر كېسەللىكلىرىنى داۋالاش
- 9 1. جىگەر مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى
- 11 2. جىگەر ئاغرىقى
- 12 3. جىگەر ئاجىزلىقى
- 14 4. جىگەردە توسالغۇ پەيدا بولۇش
- 16 5. جىگەر ئىششىقى (جىگەر ياللۇغى)
- 22 6. جىگەر قېتىش (يىگلەش)
- 23 7. جىگەردە قۇرت پەيدا بولۇش
- 8 8. جىگەر كېسەللىكى سەۋەبىدىن بولغان سېرىقكە
- 25 سەل (يارقان كېسىلى)
- 28 9. جىگەر راكى
- 29 10. جىگەر قورۇلۇش ۋە قۇرۇش كېسەللىكى
- 29 11. جىگەر مەنبەلىك ئىچى سۈرۈش
- 30 12. جىگەر سانجىقى (جىگەر - ئۆت تاش كېسىلى)

13. جىگەر يىرىڭلىق ئىششىقى 32
14. جىگەرنىڭ يەللىك كۆپۈشۈپ قېلىشى 34
15. جىگەر ئۆسمىسى 35
16. بەدەن كۆپۈپ ئىششىش (سوئولقونىيە) 36
17. سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا) 38
- جىگەر كېسەللىكلىرى سەۋەبىدىن پەيدا بولغان بىر قىسىم كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارنى داۋالاش 46
1. ئۆتكۈر ئۆت ياللۇغى 46
2. سوزۇلما ئۆت ياللۇغى 47
3. جىگەر مەنبەلىك ئۆت خالتىسى يىگەش 48
4. جىگەر سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان تالغا قان ئۆ-يۈش كېسەللىكى 50
5. جىگەر سەۋەبىدىن بولغان تال چوڭىيىش كېسەللىكى 50
6. دورا بىلەن زەھەرلىنىشتىن بولغان جىگەر كېسەللىكى 51
7. جىگەر ئاجىزلىقتىن پەيدا بولغان مېڭە كېسەللىكى 53
8. جىگەر ۋە ئۆت تېشى كېسەللىكى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان غەيشى (بېھۈشلۈك)، يۈرەك رېتىمىزلىقى 55
9. جىگەر خىزمىتىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن پەيدا بولغان ئاقكېسەل 56
10. جىگەر كېسەللىكى سەۋەبىدىن پەيدا بولغان دىئا-بىت كېسەللىكى 59
- جىگەر كېسەللىكلەرنى داۋالاش ئۇسۇللىرى 62
- جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بەلگە ۋە مۇرەككەپ دورىلار 66
- جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىپ ئەمەلىي ئۆ-نۈم بەرگەن بىر قىسىم دورا نۇسخىلىرى 74

جىگەر ھەققىدە چۈشەنچە

1. جىگەرنىڭ ئورنى

جىگەر قورساق بوشلۇقىنىڭ ئوڭ تەرەپ تۆۋەنكى قوۋۇرغا ئاستىغا جايلاشقان بولۇپ، جىگەرنىڭ يۇقىرىقى چېگرىسى يۈ-قىرىدىن سانىغاندا 5 قوۋۇرغا ئاستىغا، تۆۋەنكى قىسمى ئوڭ تەرەپ بۆرەك پەردىسىگە، سول تەرەپ ئاشقازان ئۈستىگە تېگىپ تۇرىدۇ. جىگەرنىڭ كىچىك بۆلىكى بولسا ئاشقازانغا تېگىپ تۇرىدۇ. رەڭگى قارامتۇل قىزىل. جىگەرنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20~25 سانتىمېتىرغىچە كەڭلىكى 20~25 سانتىمېتىرغىچە، ئېغىرلىقى 1200 گرامدىن 1600 گرامغىچە بولۇپ، بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ تەخمىنەن 1.5% تىنىنى ئىگىلەيدۇ. ئۆت بولسا جىگەرنىڭ ئاستىدا بولىدۇ.

2. جىگەرنىڭ تۈزۈلۈشى

جىگەر بولسا گۆشتىن تۈزۈلگەن يۇمشاق ماددىلىق بىر ئەزادۇر. بەزى ھۆكۈمالار بەدەندىكى چوڭ بەزلەر قاتارىدىمۇ سانىلىدۇ دەپ قارايدۇ. جىگەرنىڭ ئىچكى قىسمى ماددا، ئارتېرىيە (قىزىل

قان تومۇر ، ۋېنا (كۆك قان تومۇر) ھەم جىگەرنى تۇتۇپ تۇرىدىغان تورسىمان پەردىلەردىن تۈزۈلگەن بولۇپ ، ئۈستىدىن كۆكرەك پەردىسىگە ، سول تەرەپتىن ئاشقازان قورساق پەردىسىگە بېكىتىپ تۇرىدۇ .

3. جىگەرنىڭ بەدەندىكى رولى

جىگەرنىڭ ئىچكى تەرىپىدىن كەلگەن تومۇرلار ماسارىقىدىن سۇيۇقلۇقنى تارتىپ بۇنىڭدىن ماددىلارنى ھاسىل قىلىدۇ . جىگەردىكى تومۇرلار بىر قانچە خىل بولىدۇ . جىگەردىن چىققان بىر تومۇر بولۇپ ، بۇ تومۇر قاندىن سۇنى ئايرىدۇ . بۇ سۇنىڭ جىگەرگە بېرىپ قېلىشىنى توسىدۇ . يەنە بىر تومۇر بولۇپ بۇ رەكتىن قاننى تارتىپ سۇنى قالدۇرىدۇ . جىگەردە سۇيۇقلۇق ماددا ھاسىل بولغاندا پەيدا بولغان كۆپۈك قىسمى سەپرا دېيىلىدۇ . بۇ ئۆتكە بارىدىغان يول بىلەن ئۆتكە كېتىدۇ . سۈزۈك قىسمى جىگەر (قاپقا كۆك قان تومۇر) دىن چىقىپ ، كاۋاك ۋېنلار ئارقىلىق يۈرەككە بارىدۇ . تەبىئىي پىشقان بەلغەم خىلىتىنى ئۆپكە ۋە يۇلۇغا يوللايدۇ . تېگىدە قالغان قاننىڭ لېيىنى سەۋدا خىلىستى تالغا بارىدىغان تومۇر ئارقىلىق تالغا يوللايدۇ . پۈتۈن بەدەننىڭ ئوزۇقلۇققا بولغان ئېھتىياجىنى قامدايدۇ . جىگەر سەپىرانى ئۆتكە ئەۋەتمەي قانغا كېتىپ قالسا ، بەدەندە قىزىل قاپارتىما پەيدا قىلىدۇ ھەم جىگەردە قىزىش پەيدا قىلىنىدۇ . سەۋدانى تالغا ئەۋەتمەسە جىگەردە ئىششىق پەيدا بولىدۇ (يەنى سەرتان ، مالىخولىيا ، جوزام كېسەللىكلىرىنى پەيدا قىلىدۇ) ھەم

جىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى ۋە ئۇسۇلى

بەرەس سىياھ پەيدا قىلىندۇ بەلغەم ئۆپكە مېڭە يۇلۇنغا
بارماي بەدەنگە تاراپ كەتسە ھەر خىل بەز ئۆسۈملۈرى ئاقكېسەل
پەيدا بولىدۇ.

جىگەر — جىگەر ۋېنا تومۇرىنىڭ ۋاقىتلىق توسۇلۇشى تۈ-
پەيلىدىن قاننى يۈرەككە يوللىيالمىسا يۈرەككە قان يېتىشمەس-
لىكتىن بولىدىغان يۈرەك توقىلمىسىنى پەيدا قىلىدۇ
يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، جىگەر تۆت خىل ۋەزىپىنى ئۈستىگە
ئالغان بولىدۇ، يەنى:

- ① ماددا ھاسىل قىلىش ۋەزىپىسى
- ② بەدەندىكى ماددا ئالمىشىشنى تەڭشەش ۋەزىپىسى
- ③ زەھەر قايتۇرۇش ھەم زەھەر سىزىلەندۈرۈش ۋەزىپىسى
- ④ بەدەننىڭ ئېھتىياجىدىن ۋاقىتلىق ئاشقان قاننى ساقلى-
غۇچى ئامبارلىق ۋەزىپىسى

4. جىگەرنى ئاسراش ۋە جىگەر ياللۇغىنىڭ

ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى

(1) ساپ ھاۋالىق جايدا ياشاش لازىم چۈنكى ئىنسان ساپ ھاۋا
بىلەن نەپەس ئېلىپ بەدەندىكى ماددا ئالمىشىش جەريانىدا ھاسىل
بولغان بۇزۇق ماددىلارنى نەپەس ئارقىلىق سىرتقا چىقارغاندىلا
ئاندىن قان ساغلام تۇرىدۇ بۇ ئارقىلىق جىگەرنىڭ سالامەتلىكىنى
ئاسرىغىلى بولىدۇ

(2) ئۇزۇقلۇق جەھەتتە بەك چۈچۈمەل مايلىق نەرسىلەرنى بىر
قېتىمدىلا كۆپ يېمەسلىك، ھاراققا ئوخشاش زەھەرلىك

ئىچىملىكلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم. يېمەك - ئىچمەك جەھەتتە قالايمىقان ئوزۇقلانماسلىق، بۇزۇلغان يېمەكلىكلەرنى ۋە سۇلارنى ئىستېمال قىلماسلىق لازىم.

(3) نورمال جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىش لازىم. چۈنكى جىسمانىي ھەرىكەت تەبىئىي ھارارەتنى كۈچەيتىدۇ. تەبىئىي ھارارەت (ئىسسىقلىق) بولمىسا جىگەردە ماددىلارنىڭ ھاسىل بولۇشى، بەدەننى ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىشى يېتەرلىك بولماي جىگەر خىزمىتىگە تەسىر يېتىدۇ.

(4) جىگەر ياللۇغىغا گىرىپتار بولغۇچىلار بىلەن يېتىپ - قوپۇش، تاماق، تۇرمۇش، جىنسىي مۇئامىلە، تەرەخانا، يېقىن تۇرۇپ سۆزلەش قاتارلىق جەھەتلەردە تېببىي خادىملار ۋە باشقا كىشىلەر بىردەك دىققەت قىلىشى، كېسەل ساقايىغۇچە كېسەللەرنى ساق كىشىلەردىن ئايرىش، كېسەللەرنىمۇ تۈرى بويىچە ئايرىش لازىم.

(5) بەدەننىڭ كېسەلگە قارشى كۈچىنى ئاشۇرۇش لازىم. چۈنكى بۇ كېسەل ئىممۇنىتېت كۈچى ئاجىزلارغا تېز يۇقىدۇ.

(6) جىگەر ياللۇغىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ھەربىر كىشى تاماق يەيدىغان ۋاقىتتا قاچا قۇچا، چوكا، قوشۇقلارنى قايناق سۇ بىلەن يۇيۇپ يېيىش، بىر كىشى يەنە بىر كىشىنىڭ يوتقان - كۆرپىسىدە ياتماسلىق، لۆڭگە، سوپۇن، چىش چوتكىسى قاتارلىق بىر كىشىنىڭ ئىشلەتكەن تۇرمۇش بۇيۇمىنى يەنە بىر كىشى ئىشلەتمەسلىك لازىم. مۇمكىنقەدەر قول ئېلىشپ كۆرۈشمەسلىك، ھەر قېتىملىق تاماقتىن بۇرۇن قولىنى سوپۇنلاپ يۇيۇش لازىم.

(7) داۋالاش جەھەتتە چوقۇم دىئاگنوزنى مۇقىمداپ بولغاندىن كېيىن دورا ئىشلىتىش كېرەك. ئەگەر بەلغەمدىن (ھۆل سوغۇقتىن) بولغان زۇكامغا بىنەپشە، چىلان، ئەينۇلا، قارائۆرۈككە ئوخشاش دورىلار بېرىلىپ قالسا قاننى بىراقلا سوۋۇ-تۇپ بەلغەمدىن بولغان جىگەر ياللۇغى پەيدا قىلىپ قويىدۇ. سەپرادىن بولغان زۇكامغا بەرششە بېرىلسە قاننى كۆيدۈرۈپ، جىگەردە سەۋدائىي ئىششىق پەيدا قىلىدۇ.

5. جىگەر ساغلاملىقىنىڭ بەلگىسى

- (1) بەدەندىكى بارلىق ئەزالارنىڭ تۈزۈلۈشىنىڭ نورمال بولۇشى.
 - (2) ئەزالار خىزمىتىنىڭ نورمال بولۇشى (يەنى سەزگۈ ھەرىكەت ئەزالىرىنىڭ بەدەندىكى ماددا ئالمىشىشىنىڭ نورمال بولۇشى).
 - (3) بەدەندىكى قۇۋۋەتلەرنىڭ بولۇپمۇ، قۇۋۋىتى تەبىئىيىنىڭ نورمال بولۇشى جىگەر ساغلاملىقىنىڭ ئالامىتىدۇر.
- بۇنداق دېيىشىمىزدىكى سەۋەب، بارلىق جانلىقلاردا ھاياتلىق باشلانغان كۈندىن باشلاپ ئۇنىڭ ئۆسۈپ تەرەققىي قىلىشىغا جىگەر ئوزۇقلۇق يوللاپ بېرىدۇ. ئەگەر ئوزۇقلۇق مەلۇم ئەزاغا يېتىشمەسە ياكى ئوزۇقلۇق بارىدىغان يول توسالغۇغا ئۇچرىغان بولسا، شۇ ئەزا كەمتۈك ياكى يوق بولىدۇ. مەسىلەن: بەزى ئاياللاردا بالىياتقۇنىڭ يوق بولۇشى، تەرەققىي قىلماسلىقى، ئەرلەردە ئۇرۇقداننىڭ بىرى بولۇپ، يەنە بىرى بولماسلىق،

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى

بولغاندىمۇ ئۇزۇق ئىشلەش ئىقتىدارى بولماسلىققا ئوخشاش
 ئۇنىڭدىن باشقا بەدەندىكى ماددا ئالمىشىش نورمال بولغاندا ماددا
 (خىلىت) سەۋەبىدىن بولىدىغان كېسەللىكلەر پەيدا بولمايدۇ.
 ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، ئەزالارنىڭ كەمتۈك ياكى تەرەققىي
 قىلالماسلىقى ئىچكى سەۋەبتىن (يەنى ماددىلار ئۆزگىرىپ بۇزۇ-
 لۇشتىن) بولىدىغان ماددىلىق كېسەللەرنىڭ بولماسلىقى جىگەر
 ساغلاملىقىنىڭ بەلگىسىدۇر.

6. جىگەر كېسەللىكلىرىدە كۆرۈلىدىغان

ئورتاق ئالامەتلەر

قىزىش، باش ئاغرىش، گال ئاغرىش، دىماغ پۈتۈش،
 پۈتۈن بەدەن يېقىمسىزلىنىش، ھۆ بولۇش، ئېغىز قۇرۇش،
 مايلىق غىزالارنى كۆرگەندە ھۆ بولۇش، كۆڭلى غىزا تارتىماسلىق
 قاتارلىقلار جىگەر كېسەللىكلىرىنىڭ ئورتاق ئالامەتلىرى بولۇپ،
 جىگەر كېسەللىكلىرى ئىسسىقلىقتىن بولسا سېرىق سۇ ياندۇرىدۇ.
 چۈشتىن كېيىن ئېغىرلىشىدۇ، تېزلا سېرىقلىق چۈشىدۇ.
 ئەگەر بەلغەمدىن بولسا ئەتىگەندە ھۆ بولىدۇ. ماغزاپتەك شال
 ياندۇرىدۇ، قورساق كۆپىيدۇ، كۆپىنچە چۈشتىن كېيىن ئىس-
 لىپ قالىدۇ.

جىگەر ساھەسىدە تېلىپ، چىڭقىلىپ، ئېچىش-
 قادىلىپ ئاغرىشلار بولىدۇ. قورساق بوشلۇقىغا سۇ چۈشۈش
 جىگەر كېسەللىكىنىڭ ئالامەتلىرىنىڭ بىرىدۇر. تۈتۈپ كۆرگەندە
 جىگەر قولغا يۇمشاق بىلىنسە ئۆتكۈر جىگەر ياللۇغىنىڭ

چىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىپ بېرىش ۋە ئۆزگەرتىش ۋەقەسى

قاتتىق بىلىنسە سوزۇلما چىگەر ياللۇغىنىڭ، بەكرەك قاتتىق، چوڭ بىلىنسە چىگەر راكىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا پۈتۈن بەدەن ئاجىزلىشىش، قول پۇت تىترەش، پۈتۈن بەدەن مۇسكۇللىرى يىگىلەش، چىراي نۇرسىزلىنىپ قارىداپ قېلىش، ئاللىقان قىزىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، تاپان قىزىشىمۇ بەلغەمدىن بولغان چىگەر ياللۇغلىرىدا كۆرۈلىدۇ. ئۇندىن باشقا، ماغدۇرسىزلىنىش چىگەر كېسەللىكلىرىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئالامەتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، بۇنىڭ ئېغىر يېنىكلىكى ئوخشاش بولمايدۇ. يېنىكلىرىدە يەڭگىل ماغدۇرسىزلىق سېزىلىدۇ. ئېغىرلىرىدا پۇت قوللىرى بوشىشىپ پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىپ يېتىشىنلا خالايدىغان بولۇپ قالىدۇ. ئېغىر ھالدىكى چىگەر كېسەللىرى قاتتىق چارچىغانلىقتىن ھەرىكەت قىلالماي يېتىپ قالىدۇ. كېسەلنىڭ سۈيۈكى قېنىق چايدەك كېلىدۇ. سوزۇلما چىگەر ياللۇغلىرىدا تال چوڭىيىپ كېتىش بولۇپمۇ، قىل قان تومۇرلار كېڭىيىپ كېتىش، بۇرۇن ئۇچى، بويۇن ئەتراپىنىڭ تومۇرلىرى ئوچۇق كۆرۈنۈپ قېلىش ھەمدە يۈز، بويۇن، كۆكرەك ساھەسىدە، قول ئاللىقىنىدا ئۆمۈچۈك تورىدەك تورسىمان مەڭلەر پەيدا بولۇش بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ. بۇلار سوزۇلما خاراكتېرلىك چىگەر كېسەللىكلىرىدە كۆرۈلىدىغان بەلگىلەردۇر. سوزۇلما خاراكتېرلىك چىگەر كېسەللىكلىرىدە يەنە ئەمچەك بېزى چوڭىيىدۇ، ھەيز قالايمىقانلىشىدۇ.

7. چىگەر مىزاجىنىڭ بەلگىلىرى

چىگەر مىزاجى ئىسسىق بولسا، ئۇنىڭ ئالامىتى ئۇسسۇزلۇق كۆپ، ئىشتىھاسى كەم بولۇش، قىزىقلىق بولۇش،

سۈيىدۈكنىڭ سامان رەڭ بولۇشى، چىراينىڭ سېرىق ياكى قىزىل بولۇشى، تومۇرنىڭ ئىنچىكە، تېز سېلىشى، كۈچلۈك، توم سوقۇشى، تىلنىڭ قىزىل ياكى سېرىق بولۇشىدۇر.

چىگەر مىزاجى سوغۇق بولسا، ئۇنىڭ ئالامىتى: چىراي، لەۋلىرى، تىلى ئاق بولۇش، ئۇسسۇزلۇق بولماسلىق، سۈيىدۈكنىڭ ئاق بولۇشى، رەڭگىنىڭ نۇرسىز بولۇشى، تومۇرنىڭ سۇس سوقۇشى قاتارلىقلاردۇر. ئېغىزنىڭ قۇرۇق بولۇشى، تومۇرنىڭ قاتتىق سوقۇشى، ئۇيقۇنىڭ كەم بولۇشى قۇرۇقلۇقنىڭ ئالامىتىدۇر.

يۈزنىڭ كۆپۈپ قېلىشى، تىلنىڭ ھۆل تۇرۇشى، ئۈستىدە خاننىڭ بوش، روھى كەيپىياتنىڭ سۇس بولۇشى ھۆللۈكنىڭ ئالامىتىدۇر.

جىگەر كېسەللىكلىرىنى داۋالاش

1. جىگەر مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى

(1) جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشى
جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشى تۆۋەندىكىدەك
سەۋەبلەردىن بولىدۇ.

(1) سەپرا سەۋەبلىك بۇزۇلۇش

ئالامىتى: قىزىش، كۆپ ئۇسساش، ئېغىز قۇرۇش، ئوڭ
تەرەپ جىگەر ساھەسى ئېچىشىش، ئاغرىش، ھۆ بولۇش، تىلى
سېرىق يىرىك، ئاچچىق بولۇش، ئۇيقۇ قېچىش، ئاغرىقىمىز
ئىچى سۈرۈش، تومۇرى تېز سوقۇش، ئىشتىھاسى بولماسلىق
قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: تامىقى ئۈچۈن ئارپا ئېشى، چۈجە گۆشى
بېرىش، ئۇسسۇزلۇقى ئۈچۈن ئاچچىق ۋە تاتلىق ئانار سۈيى،
لىمون شەرىپىتى، ئەينۇلا شەرىپىتى، ئىسپىغۇل، سىركەزە
جىۋىل ساددە بېرىلسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

(2) قان سەۋەبلىك بۇزۇلۇش

ئالامىتى: چىرايى قىزىل بولۇش، جىگەر ساھەسىدە

ئېغىرلىق بولۇش، تېلىش، قىزىش، ئېغىز تەمى تاتلىق بولۇش، يۈزلىرىگە دانخورەك، چىققان كۆپ چىقىش، بەدەن ئېغىرلىشىش، چوڭ ۋە كىچىك تەرەت گۆش يۇغان سۈدەك بولۇش، ئۈجمە پورىدەك بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. داۋالاش ئۇسۇلى: ئوڭ باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش، ئۈندىن كېيىن ئارقى سەندەل، ئارقى گۈل، ئارقى شاھتەررە، ئىترىفىل سەغىر، جاۋارش تاباشىر، ئارقى قىيمىقۇ قاتارلىق تەبىئىي قۇرۇق سوغۇق دورىلار بېرىلىدۇ. غىزاسىغا قارىئورۇك سېلىنغان گۈرۈچ ئېشى، مېۋىلەردىن غۈنچە ئۈزۈم، نەشپۈت، ئامۇت، بېھى قاتارلىق مېۋىلەر بېرىلىدۇ. قەنت، شېكەر، گۆشلەردىن بىر مەزگىل پەرھىز قىلىنىدۇ.

(2) جىگەر مىزاجىنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇشى

(1) بەلغەمدىن بۇزۇلۇش

ئالامىتى: چىرايى ئاق، بەدەن بوش بولۇش، مەيدە ئېسىلىش، ئېغىزدىن شال ئېقىش، تاماقتىن كېيىن جىگەر سالىمەن بەلغەمدە ئېغىرلىق ھېس قىلىش، تەرەت بوش، كۆپ كېلىش، ئاقۇش كېلىش، تېز ئورۇقلاش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. داۋالاش ئۇسۇلى: شارابى بۇزۇرى ھار، داۋانگىل كۆركەم، جاۋارش جالىنىۋس، پىننە گۈلقەنت، قىزىلگۈل گۈلقەنتى، رۇم بەدىيان بىلەن بېرىلسە ھەمدە شارابى دارچىن بېرىلسە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. جاۋارش شەھرىيانمۇ ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

(2) چىگەرەك مىزاجى سەۋەبىدىن بۇزۇلۇش

ئالامىتى: رەڭگى روھى كۆكۈش، نۇرسىز بولۇپ قالىدۇ. دىماغ، ئېغىز قۇرۇش، چۈچۈمەل بولۇش، غەم ئەندىشە قىلىش، بەدەن سوغۇق بولۇش، قەۋزىيەت بولۇش قاتارلىق ئالاھىدە مەتلەر كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: مەتبۇخى ئەفتمۇن، شارابى دىنار، شارابى رەيھان، شارابى بۇزۇرى مۆتىدىل بېرىش، غىزاسىغا پاقىلان گۆشى، سۈت، شېكەر، تۇخۇم سېرىقى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم.

2. چىگەرەك ئاغرىقى

سەۋەبى: مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى، چىگەرەك تومۇرىنىڭ توسۇلۇشى ياكى چىگەرەكنىڭ كۆپۈشۈپ قېلىشىدىن بولسا، بۇنىڭ داۋاسى يۇقىرىدا بايان قىلىندى. سوغۇق سۇنى بىراقلا كۆپ ئىچكەندىن بولۇپمۇ ناشتىدا، مۇنچىدىن چىقىپلا ياكى كۈچلۈك جىسمانىي ھەرىكەت قىلىپ بەك قىزىپ كەتكەندە، سوغۇق سۇنى بىراقلا كۆپ ئىچكەنلىكتىن، چىگەرەككە تەڭشەلمەي بېرىپ قېلىش سەۋەبلىك چىگەرەك قاتتىق ئاغرىپ كېتىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: لۆڭگىنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ سىقىۋېتىپ چىگەرەك ساھەسىگە قويۇپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، سىرتتىن سۈمبۇل، مەستىكى رۇمى، ئىزخىر بىلەن زىمات تەييارلاپ

ئىسسىق ھالەتتە چېپىش، كەپتەر، قۇشقاچ گۆشىنى
نوقۇت، زىرە، دارچىن بىلەن قوشۇپ پىشۇرۇپ نان بىلەن
ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك.

3. جىگەر ئاجىزلىقى

(1) سەپرا خىلىتىدىن بولغان جىگەر ئاجىزلىقى:

ئالامىتى: ئۇسسۇزلۇق كۆپ بولۇش، ئىشتىھا كەم بولۇش،
ئېغىزى ئاچچىق بولۇش، ئاغرىقسىز ئىچى سۈرۈپ كۈندىن
كۈنگە ئورۇقلاش، تىلى، چىرايى سېرىق بولۇش قاتارلىق ئالا-
مەتلەر كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ھالۋائى خەشخەش، جاۋارش ئۇدۇتۇرۇش،
ئانار شەرىبىتى، ئەينۇلا مۇرابباسى قاتارلىق ھۆل سوغۇق تەبىئە-
ئەتلىك دورا ۋە ئوزۇقلۇقلار بىلەن داۋالاش لازىم.

(2) بەلغەمدىن بولغان جىگەر ئاجىزلىقى

ئالامىتى: يۈز، كۆز، قاپاقلىرى ئېسىلىپ ئىششىپ قال-
غاندەك بولىدۇ. ئېغىر بولغاندا سۇلۇق ئىششىقلار پەيدا بولىدۇ.
ئېغىرلاشقانسېرى ئىستىسقىغا (سۇلۇق ئىششىقلارغا) ئۆزگە-
رىدۇ. بۇ قۇۋۋىتى داپئە (ھەيدىگۈچى كۈچ) نىڭ زەئىپلەش-
كەنلىكىدىن بولىدۇ.

سەۋەبى: سوغۇق ھۆللۈك جايلاردا كۆپ يۈرۈش، جىسمانىي ھەرىكەت قىلماسلىق، غىزالاردىن سۇيۇقئاش، قېتىق، بېلىق شاپتۇل، تاۋۇز، سوغۇق سۇ قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلغانلىقتىن بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن 10 گرام سېرىقچىچەكنى 500 گرام تۇرۇپ سۈيىدە 300 گرام قالغۇچە قاينىتىپ سۈزۈپ سۈيىگە 30 گرام ھەسەل قوشۇپ ئىچۈرۈلىدۇ. بۇ ئارقىلىق ئاشقازان، جىگەر ساھەسى تازىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئارپىبەدىيان، رۇم بەدىيان، كەرەپشە ئۇرۇقى، سېرىقئوت ئۇرۇقى، ھەربىرى 10 گرامدىن قىزىلگۈل گۈلچەنتى 100 گرام يۇقىرىقىلارنى 750 گرام قايناق سۇ بىلەن دەملەپ گۈلچەنت قوشۇپ ئىچىدۇ. ئاخىرىدا شەرىپتى بۈزۈرى جاۋارش كۈمۈنى، داۋائىل كۆركەم مەجۈنى ئەمرۇسىيا قاتارلىق دورىلار ئەھۋالىغا قاراپ بېرىلىدۇ. كېسەللىك كۆپ ھەرىكەت قىلىشقا ئازراق ئۇخلاشقا بۇيرۇلىدۇ. ئوزۇقلۇق جەھەتتە كەكلىك، قۇشقاچ گۆشلىرىنى كاۋاپ قىلىپ يېيىشكە ھەمدە نوقۇت بىلەن ئاش قىلىپ ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھەسەل پىننە گۈلچەنتلىرىنى نان بىلەن ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

3) سەۋادىن بولغان جىگەر ئاجىزلىقى

ئالامىتى: بەدەن ئورۇق، سوغۇق، دىماغ قۇرۇش، باش قېيىش، قۇرۇق ھۆبولۇش، كۈندىن كۈنگە ئورۇقلاش، چىرايى كۆكسىرىش، ئەزاىغا ئاق مودۇرلار پەيدا بولۇش قاتارلىق

ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

دەۋالاش ئۇسۇلى: ئەۋرىشىم شەرىبىتى، رەيھان شەرىبىتى، ئەفتىمۇن شەرىبىتى، ئەنجۈر شەرىبىتى قاتارلىق ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلار ۋە غىزالار بىلەن قۇۋۋەتلەش لازىم. مەجۇنلاردىن لوبوبى كەبىر، ئىترىفىل جالىنىۋىس، جاۋارش زەر ئۇنى قاتارلىق دورىلار بېرىلسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

4. جىگەردە توسالغۇ پەيدا بولۇش

ئالامىتى: چوڭ تەرەت كۆپ، يۇمشاق بولۇش، بەزىدە ئىچ سۈرۈش، ئوڭ تەرەپ جىگەر ساھەسىدە ئېغىرلىق ھەم تېلىش بولۇش، چىرايى ئاقىرىپ ئورۇقلاش جىگەر توسالغۇسىنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىدۇر. ئەگەر ئېغىرلىق كۈچەيسە جىگەر ئىششىقلىقنىڭ ئالامىتىدۇر.

توسالغۇ مۇقىم بىر جايدا بولسا قىزىتما پەيدا بولىدۇ. توسالغۇ جىگەرنىڭ ئۈستى تەرىپىدە بولسا ئېغىرلىق ماسارىقىلاردا بولىدۇ. ئەگەر جىگەر چۆرىسىدە بولسا ياكى ئۈستىدە بولسا ئېغىرلىق بالا جىگەردە بولىدۇ. يەنى ئاشقازانغا يېقىن بولىدۇ. سەۋەبى: ① ياغلىق غىزالار مەسىلىدىن گۆش سېلىپ ئېتىلگەن پۇلۇ، گۆشلۈك سەيلەر، مانتا، خوشاڭ، سامسغا ئوخشاش كۈچلۈك، ئاسان سىڭمەيدىغان غىزالارنى يەپ كەينىدىن قەنتلىك چاي، قەنت ھالۋىسى قاتارلىق ئاسان سىڭىدىغان نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندىن كېيىن ياكى شىرنىلىك،

يەللىك نەرسىلەرنى يەنى قوغۇن ، ئۈزۈمگە ئوخشاش يېمەكلىكلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلغانلىقتىن بولىدۇ . چۈنكى شىرنىلىك نەرسىلەرنى چىگەر ئۆزىگە تېز تارتىدۇ . بۇنىڭ بىلەن ئالدىدا يېيىلگەن ھەم تەستە ھەزىم بولىدىغان غىزالار مەيدە ما- سارىقىسىدە پارچىلىنىپ سۈمۈرۈلۈپ بولغۇچە ، چىگەرگە كى- رىش يولىدىكى قويۇق سۇيۇقلۇق چىگەرگە كىرىدىغان يولنى تو- سۇپ قويىدۇ .

② تاماق يەپلا ئېغىر ھەرىكەتلەر بىلەن مەشغۇل بولۇش تو- سالغۇ پەيدا قىلىدۇ .

③ تاماقنى قالايمىقان يېيىش ، تاماق سىڭمەي تۇرۇپ ئۈس- تىگە يەنە تاماق يېيىش ، ھاراققا ئوخشاش مەست قىلىدىغان ئى- چىملىكلەرنى كۆپ ئىچىش ، چىگەرنىڭ ئىچكى قىسمىدا تو- سالغۇ پەيدا بولۇشقا سەۋەبچى بولىدۇ .

داۋالاش ئۇسۇلى : توسالغۇ چىگەرنىڭ ئاستى تەرىپىدە ياكى ئىچكى قىسمىدا بولسا توسالغۇنى ئاچقۇچى ، سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ . مەسىلەن بىخ بەدىيان ، بىخ كەرەپشە (كەرەپشە يىل- تىزى) ، كاسىن ئۇرۇقى ، كاسىن يىلتىزى ، ئارپىبەدىيان ، رۇم بەدىيان قاتارلىقلارنى بېرىپ كەينىدىن ھەببى رەۋەن ، ھەببى سەبىرگە ئوخشاش سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ . ئەگەر توسالغۇ چىگەرنىڭ ئۈستى تەرىپىدە ياكى ياقىسىدا بولسا سۈيۈك ھەيدى- گۈچى ، توسالغۇنى ئاچقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ . يەنى شارابى بۈزۈرى مۆتىدىل ، سىركەنجىۋىل بۈزۈرى ، ئەرقى كاسىن ، ئەرقى بەدىيان ، قۇرسى ئەنەبەرىس قاتارلىق دورىلارنى بېرىش لازىم . ئۇنىڭدىن كېيىن داۋائىل كۆركەم بېرىش لازىم .

تامىقىغا سەۋزە، تۇرۇپ، كەرەپشە، يېسىۋىلەك،
ئاسماق، ئاشكۆكى سېلىپ بېرىش، تاماقنى ئازايتىش، بىر
قانچە كۈن گۆش بەرمەسلىك لازىم. ئەگەر ئىچى سۈرۈش بولسا،
بېھى ھەم تۇرۇنچى شەربەتلىرىنى بېرىشكە بولىدۇ. بىرقەدەر
ياخشىلانغاندا قوشقاچ، كەپتەر، كەكلىك گۆشلىرى، سەۋزە،
دارچىن، زىرە، قارىمۇچلار بىلەن قوشۇپ بېرىلسە بولىدۇ.

5. جىگەر ئىششىقى (جىگەر ياللۇغى)

جىگەر ئىششىقى بولسا، جىگەرنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەردىدە
ياكى جىگەرنىڭ ئۆزىدە پەيدا بولىدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئالتە
تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

- (1) قاندىن بولغان جىگەر ئىششىقى.
 - (2) سەپرادىن بولغان جىگەر ئىششىقى.
 - (3) بەلغەمدىن بولغان جىگەر ئىششىقى.
 - (4) سەۋدادىن بولغان جىگەر ئىششىقى.
 - (5) يەلدىن بولغان جىگەر ئىششىقى.
 - (6) ئۇرۇلۇش زەخمىلىنىشتىن بولغان جىگەر ئىششىقى.
- ئەسكەرتىش: ھازىرقى زامان غەرب تېبابىتىدە A تىپلىق، B
تىپلىق، C تىپلىق، F تىپلىق، D تىپلىق دەپ ئايرىلىدۇ.
A تىپلىق سەپرادىن بولغىنىنى، C تىپلىق قاندىن بولغى-
نىنى، B تىپلىق بەلغەمدىن بولغىنىنى، D تىپلىق سەۋدادىن
بولغىنىنى، F تىپلىق يەلدىن بولغىنىنى كۆرسىتىدۇ.

جىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ۋە تېبابىيەت داۋالاش

ئىششىق جىگەر پەردىسىدە بولسا ئادەتتە جىگەر خىزمىتىگە تەسىر يەتمەيدۇ.

(1) قاننىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان جىگەر ئىششىقى

ئالامىتى : كېسەلنىڭ جىگەر ساھەسىدە چىڭقىلىپ ئاغرىش، بىرئاز نەپەس قىستاش، سۈيدۈكى قىزىلغا مايىل كېلىش، بېشى چىڭقىلىش، تىلى قىزىرىش، قول پۇتلىرى ئېغىرلىشىش، قىزىش، قۇرۇق يۆتەل، ھۆ بولۇش، قۇسۇش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ئېغىزى تاتلىق بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. يۆتەلىدۇ، ئوڭ تەرەپنى بېسىپ ياتالمايدۇ. ئوڭ تاغاق مۇرە ساھەلىرىدىمۇ تېلىپ ئاغرىش بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى : قان ئېلىش، ئۇنىڭدىن كېيىن قارىئۆرۈك، تەمرى ھىندى، سىركەنجۈل ساددە، ئەرقى شاھتەررە، ئەرقى شوخلا بېرىش، تامىقىغا قارىئۆرۈك، كۆك يۇمىاقسۇت، غورا سېلىنغان گۈرۈچ تامىقى بېرىش لازىم.

(2) غەيرىي سەپرادىن بولغان جىگەر ئىششىقى

ئالامىتى : ئۇسسۇزلۇقى كۆپ بولۇش، جىگەر ساھەسى ئېچىشىپ ئاغرىش، قىزىتما، جۇغ جۇغ بولۇش، چىرايى، كۆز ئېقى، تىلى، سۈيدۈكى سېرىق بولۇش، تومۇرى ئىندىچىكە تېز سوقۇش، غەم ئەندىشە ھەم ئاچچىقى يامان بولۇش، كېسەللىكنىڭ ئاخىرىدا بىمارنىڭ تىلى قارا گەز باغلاش

قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

سەۋەبى: سەپرا خىلىتىنىڭ جىگەردىن ئۆتكە ئۆتۈشى راۋان

بولماي، جىگەردە توپلىنىپ قېلىشىدىن ياكى سەپرانى كۆپەيتىدىغان ئوزۇقلۇقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن، كۈچلۈك جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن كۆپ شۇغۇللىنىشتىن، ھاۋا كىلىماتى بەك ئىسسىق، قۇرۇق جايلاردا ئۇزاق مۇددەت ياشاش قاتارلىق سەۋەبلەردىن بۇخىل كېسەللىك كۆپرەك پەيدا بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: بىمارنى ھاۋاسى سوغۇق، سالىقىن جايلاردا دەم ئالدۇرۇش، كۆپ ھەرىكەت قىلدۇرماستىن، تامىقىغا ئارپا ئېشىغا چۈجە گۆشى، پالەك، تۇرۇپ، ئاش كۆكى سېلىپ بېرىش، تاۋۇز سۈيى ئىچكۈزۈش لازىم.

دورىلاردىن سىركەنچىۋىل ساددە، دىنار شەرىبىتى، تەمرى ھىندى شەرىبىتى، ئىرقى شوخلا، ئىرقى كاسىن، بىنەشە شەرىبىتى، ئەينۇلا مۇرابباسى، قاپاق شەرىبىتى قاتارلىقلار ئوبدان تەسىر قىلىدۇ.

(3) غەيرىي بەلغەمدىن بولغان جىگەر ئىششىقى

ئالامىتى: چىرايى، تىلى، سۈيدۈكى ئاق بولىدۇ. بىمار ناھايىتى بوشاڭ، روھسىز، ئۇيقۇسى كۆپ، ئېغىزىنىڭ تەمى بەتتەم (تېتىقسىز)، ئىشتىھاسى كەم، جىگەر ساھەسىدە ئېغىرلىق بولۇش، تۇتقاقلىق، تېلىپ ئاغرىش، لەۋلىرى ئاق گەز بولۇش، ئالىقان ھەم پۈتۈن بەدەن سوغۇق تەرلەپ تۇرۇش،

ئەتىگەندە قۇرۇق ھۆ بولۇش، بەزىدە ئاق مازغاپ ياندۇرۇش، يۈرەك ھەرىكىتى ئاستا بولۇش، بەدەن سوۋۇش، تاپان قىزىش، ئاخىرىدا كۆزدىن باشلاپ پۈتۈن بەدەن ساغىرىش، بەدەن قىچىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

سەۋەبى: جىگەر مىزاجىنىڭ ھۆلىك ۋە سوغۇقلىقى ئېشىپ، جىگەر خىزمىتىنىڭ زەئىپلىشىشى نەتىجىسىدە، جىگەردىكى ماددىلارنىڭ قويۇلۇپ بۇزۇلۇشى بىلەن غەيرىي سەپرا-لىق ئۆزگىرىپ، جىگەرنىڭ چوڭىيىپ كېتىشىدىن بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن سىركەنجىۋىل بۇزۇرى مۆتىدىل بېرىپ، جىگەر تومۇرلىرىدىكى شىلىمىش قۇيۇق بەلغەملەرنى سۈيۈلدۈرۈش لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن شەرىپىتى بۇزۇرى ھارنى بەش كۈن بېرىپ جىگەرنى قىزىتىش ئارقىلىق جىگەر ئىقتىدا-رىنى كۈچەيتىش ھەمدە مائۇل ئۇسۇل ھار بېرىش، ياتار ۋاقتىدا كۈن ئارىلاپ جاۋارش شەھرىيان بېرىش ئۇندىن كېيىن مەجۈنى ئەمرۇسىيا، داۋائىل كۆركەم، داۋائى جىنتىيانا، مەجۈنى دە-بىدىل ۋەرد لەرنى بېرىش، سىرتتىن زەپەر، سۈمبۈل، ئەف-سەنتىنلەرنى گۈلى سەۋسەن يېغى بىلەن چېپىش لازىم.

تامىقىغا نوقۇت سۈيىگە كەكلىك، قۇشقاق، كەپتەر گۆشلىرىنى سېلىپ بېرىش. قوي گۆشىنى سەۋزە، دارچىن، قارىمۇچ، كاۋاۋىچىن، زىرە سېلىپ پىشۇرۇپ زاغرا نان بىلەن يېسە ھەمدە زىخ كاۋىپى قىلىپ قارىمۇچ، زىرە سېپىپ ئىستې-مال قىلسا، قۇرۇق ئۈزۈم، ياڭاق مېخىزلىرىنى يېسە بولىدۇ.

پەرھىزلىرى: سوغۇق تەبىئەتلىك غىزا، يەل-يېمىشلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. جىسمانىي جەھەتتە نورمال ھەرىكەت

جىگەر كېسەللىكىنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى ۋە داۋالاش
قىلىش داۋاملاشتۇرۇلىدۇ، كۆپ ئۇخلاش، ھۆلۈك
ۋە سوغۇق ھاۋالىق جايلاردا ئولتۇرۇش مەنى قىلىنىدۇ.

4 (غەيرىي سەۋادىن بولغان جىگەر ئىششىقى

ئالامىتى: كېسەلنىڭ چىرايى، تىلى، سۈيدۈكى سارغۇچ
كۆكۈش بولۇپ قالىدۇ. دىماغ قۇرۇيدۇ. ئېغىز تەمى چۈچمەل،
ئويۇقۇسى كەم، تومۇرى ئاستا، قاتتىق بولىدۇ. جىگەر ساھە-
سىدە قاتتىقلىق بولىدۇ. كېسەل قول پۇتىنىڭ ئاغرىۋاتقانلى-
قىدىن ھەمدە ئىسسىمايدىغان بولۇپ قالغانلىقىدىن شىكايەت قى-
لىدۇ. ئىشتىھاس بولمايدۇ. قەۋزىيەت بولىدۇ. كېسەل كۈندىن
كۈنگە ئورۇقلاپ كېتىدۇ. كۆپىنچە كەچتە ھۆپەيدا بولىدۇ،
مەيدە ئېسىلىدۇ، كۆكۈش سۇ ياندۇرىدۇ.

سەۋەبى: سەۋدا خىلىتىنىڭ جىگەردە يىغىلىپ قېلىشىدىن
بولىدۇ. يەنى جىگەر ئاجىزلىقىدىن سەۋدانى تالغا يەتكۈزەلمەيدۇ
ياكى جىگەر بىلەن تال ئوتتۇرىسىدىكى ياكى تال بىلەن ئاشقازان
ئوتتۇرىسىدىكى تومۇرلاردا توسالغۇ پەيدا بولغاندىن بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: جىگەرنىڭ ئاجىزلىقىدىن بولسا جىگەرنى
كۈچەيتىش ئۈچۈن شارابى بۇزۇرى مۆتىدىل ياكى سىركەنجىۋىل
ئەفتىمۇن بېرىش، تامىقىغا كەپتەر گۆشىنى سەۋزە بىلەن شورپا
قىلىپ بېرىش، تۇخۇم سېرىقى، قايماق، ھەسەل بىلەن چاي
بېرىش، پاقلان گۆشىنى سەۋزە، تۇرۇپ بىلەن شورپا قىلىپ
بېرىش لازىم. توسالغۇ سەۋەبىدىن بولسا، توسالغۇنى ئاچقۇچى
مائۇل ئۇسۇل شەربەتلىرىنى بېرىش، ھەببى غاپەس، ھەببى

جىگەر كىسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى
بېرىش لازىم. شارابى زەبىب، شارابى دىنار كەبىرى

ياخشى ئونۇم بېرىدۇ.

5 (جىگەرنىڭ يەللىك ئىششىقى

ئالامىتى: جىگەر ساھەسىدە تېلىپ، چىڭقىلىپ ئاغرىش بولىدۇ ھەم ئېغىرلىق ھېس قىلىدۇ. قىزىتما بولمايدۇ. بۇ ئاغرىق جىگەردە ھەم جىگەرنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەردىدە يۆتكىلىپ تۇرىدۇ. تومۇرى بوش، ئاستا، سۆيىدۈكى سارغۇچ، كۆپۈكلۈك بولىدۇ.

سەۋەبى: جىگەر ھارارىتىنىڭ تۆۋەنلىشى بىلەن جىگەرنىڭ ھەزىم كۈچى ئاجىزلاشقانلىقىدىن ھەمدە يەللىك تاماقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلغاندىن، جىگەردە ھەم پەردىلىرىدە شىلىم-شىقى خىلىتلارنىڭ پەيدا بولۇپ تارقاپ كېتەلمەسلىكىدىن جىگەر كۆپۈپ قالىدۇ. شۇڭلاشقا جىگەرنىڭ يەللىك ئىششىقى دەپ ئاتىلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: شارابى بۇزۇرى ھارنى كۈندە ئۈچ ۋاخ تاماق-تەن بۇرۇن 50 گرامنى 100 گرام قايناق سۇ بىلەن بېرىش لازىم. تاماقتىن كېيىن ئەتىگەندە جاۋارش دارچىن، چۈشتە تاماقتىن كېيىن جاۋارش كۈمۈنى، كەچتە تاماقتىن كېيىن ھەبىبى كۈرسىنگى بېرىش لازىم.

ئوزۇقلۇق جەھەتتە پىننە گۈلقەنت بىلەن نان بېرىش، ئۇچار قاناتلار گۆشىنى كاۋاپ، شورپا قىلىپ بېرىش؛ شورپىغا

دارچىن ، قارىمۇچ ، زىرە قاتارلىق يەل تارقاتقۇچى دورىلارنى سېلىپ بېرىش كېرەك .
پەرھىزى : بىر مەزگىل قورۇلغان ، ھوردا پىشۇرۇلغان ، قىيمىلىق غىزالاردىن ، يەل يېمىشلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ .

6 (ئۇرۇلغان ياكى يىقىلغاندىن بولغان

جىگەر ئىششىقى

ئالامىتى : ئۇرۇلغان ياكى يىقىلغاندا زەخمىلەنگەن ئورۇن كۆكۈش ، قاتتىق ئىششىق پەيدا بولۇش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ .
داۋالاش ئۇسۇلى : ئالدى بىلەن قان ئېلىنىدۇ ، ئۇندىن كېيىن ئۇيۇغان ، توختاپ قالغان قانلارنى يوقىتىش ئۈچۈن قان تىپەر ، رەۋەن ، قارىمۇچلارنى ئاز ئازدىن ياش پاققان ياكى ياش توخۇ شورپىسى بىلەن بېرىش لازىم . ئۇنىڭدىن كېيىن زىغ شەرىپىتى ئىچكۈزۈش ، سىرتتىن ئىسپىغۇل ، گىل ئەرمىنى ، ھەببۇلئاس ، سۇمبۇللارنى سوقۇپ گۈل يېغى بىلەن چېپىش لازىم .

6 . جىگەر قېتىش (يىگلەش)

ئالامىتى : ئىشتىھا كەم بولىدۇ ، كۆڭۈل ئاينىمايدۇ ، قۇسىدۇ ، كۆپىنچە چۈشتىن كېيىن قورساق ئېسىلىدۇ ، كۆپ ئۇسسايدۇ ، ئېغىز قۇرۇيدۇ ، بىر ئاز قىزىتما پەيدا بولىدۇ ،

كۆز ئېقى ، چىرايى سارغىيدۇ ، بەدەن تېرىسى كېپەكلىشىدۇ . مويلىرى ئارىلاپ چۈشۈپ شالاڭلىشىدۇ ، يۈزىدە ، كۆكسىدە ئۆمۈچۈك تۈرىدەك قىزىل تومۇرلار كۆرۈنۈپ قالىدۇ . كۈندىن كۈنگە ئورۇقلايدۇ ، قورساق بوشلۇقىغا سۇ يىغىلىدۇ .

سەۋەبى : ھاراقنى كۆپ ئىچكەن ، ئاچچىق چۈچۈك نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلغاندىن ، ئۇزۇن مۇددەت كېسەل بولغاندىن ، ئۇزۇن مۇددەت ئىچى سۈرگەندىن ، قان كېمىسىپ جىگەر زەئىپلەشكەندىن پەيدا بولىدۇ .

داۋالاش ئۇسۇلى : ئۆزى تاتلىق ، يۇمشاققۇچى شەربەتلەردىن دىنار شەربىتى ، ئەۋرىشم شەربىتى ، ئەينۇلا شەربىتى ، ئۈزۈم شەربىتى بېرىش بىلەن بىرگە سەۋەبىگە قاراپ ئىلاجىنى قىلىش لازىم . مەسىلەن ئىچىملىكنى كۆپ ئىچكەن بولسا ، ئىچىملىك ئىچىشنى قەتئىي توختىتىش ، ئۇزۇن مۇددەت كېسەل تارتىپ ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن بولغان بولسا ، ئۆزى لەتىپ ، سىڭىشلىك غىزالار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش . ئەگەر ئىچى سۈرگەن بولسا ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش چارىلىرىنى قىلىش لازىم .

7 . جىگەردە قۇرت پەيدا بولۇش

ئالامىتى : لەۋلىرى قۇرۇپ ئاق گەز باغلاپ تۇرىدۇ . كۆز ئېقى نۇرسىز ، كالتە يۆتەل قاتتىق بولىدۇ . بەلغەم كەلمەيدۇ ، يۆتەلگەندە جىگەر ساھەسى ئاغرىيدۇ ھەمدە جىگەر ساھەسىدە بىر نەرسە

ماڭغاندەك سېزىدۇ. ئىككى مەڭزىدە ئۆمۈچۈك تورىدەك قىزىل تومۇرلار كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. جىگەردە پەيدا بولىدىغان قۇرت ياپىلاق مەدەدە شەكىلدە بولىدۇ. بۇ ئادەتتە بېغىر قۇرتى دېيىلىدۇ.

سەۋەبى: بۇ كېسەل كۆپىنچە جىگەرنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەردە گۆشتە پەيدا بولىدىغان يىرىڭلىق جاراھەتتىن ياكى كۆكرەك بوشلۇقىغا سۇ چۈشكەندىن سۇنىڭ بۇزۇلۇپ يىرىڭغا ئۆزگىرىدىغانىدىن يىرىڭداش پەيدا بولۇپ، جىگەر ساھەسىگە بۆسۈپ كىرىدۇ ياكى ئۈچەيدە پەيدا بولغان مەدەدە قۇرتلار ماسارىقا تومۇرى ئارقىلىق جىگەرگە كىرىشتىن پەيدا بولىدۇ. بۇ قۇرت پەيدا بولۇشنىڭ ماددىسى غەيرىي بەلغەمدۇر.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن قىزىل پىياز سۈيى 500 گرام، سىپارى جوز 15 گرام تەييارلىنىپ، بېھى ئۇرۇقى 5 گرام، سىپارى جوز بىلەن بېھى ئۇرۇقىنى پىياز سۈيىدە قاينىتىپ سۇ-زۇپ 30 گرام پىننە گۈل قەنت سېلىپ چۈشتە ۋە كەچتە تاماقتىن بۇرۇن 250 گرامدىن ئىچۈرۈلىدۇ. 4 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن ھەبى قەنىلىدىن 7 دانە بېرىلىدۇ. 3 كۈن مۇشۇ بويىچە داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. بۇ ئارقىلىق قۇسۇش بىلەن قۇرت ئاشقازاندىن ياندىۇ ياكى ئىچىنى سۈرۈش ئارقىلىق تەرەت بىلەن ھەيدىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن جىگەرنى كۈچلەندۈرۈش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش ئۈچۈن قىزىلگۈل گۈل قەنتى، ھەسەل، پىننە گۈل قەنتى، ئامىلە نۇشدارى، جاۋارش ئەنبەر قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ. ئۈزۈقلۈك جەھەتتە ئۇچار قۇش كاۋاپلىرى، نان بېرىلىدۇ.

يېمىشلەردىن قۇرۇق ئۈزۈم، ياڭاق، بېھى، ئاپپىلىسىن

جىگەر كېسەللىكىنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى (جۈيزە) قاتارلىق مېۋىلەرنى ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. پەرھىزى: بىر ئايدىن ئۈچ ئايغىچە سۈت، قېتىق، بۇغداي ئۈنىدا ئېتىلگەن سۇيۇق ئاشلار بېرىلمەيدۇ.

8. جىگەر كېسەللىكى سەۋەبىدىن بولغان سېرىقكېسەل (يارقان كېسەلى)

1) سېرىق يارقان كېسەلى

ئالامىتى: يارقان سېرىق، قارا، سېرىق بىلەن قارىنىڭ بىرلىشىشىدىن ئىبارەت ئۈچ خىل بولۇپ، يارقاندا پۈتۈن بەدەن سارغىيىش، باش ئاغرىش، كۆپ ئۇسساش، قىزىتما بولۇش، بەدەن قىچىشىش، قۇرۇق ھۆ بولۇش، قورساق ئېسىلىش، يۈرەك ھەرىكىتى تېز بولۇش، سۈيدۈك سېرىق بولۇش، تاماق يېگۈسى كەلمەسلىك، ئۇيقۇسى كەلمەسلىك قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ ھەمدە جىگەردە ئېچىشىش بولىدۇ.

سەۋەبى: جىگەر بىلەن ئۆت ئوتتۇرىسىدىكى تومۇرغا توسالغۇ چۈشكەندىن ياكى ئۆت ئىشىشىدىن، ئۆتتە تاش پەيدا بولغان سەۋەبتىن سەپرانى ئۆت قوبۇل قىلمىغاندىن ياكى جىگەردىن ئۆتكە سەپرا بارىدىغان تومۇر تارايغان ياكى سەپرا خىلىتى قوپۇلۇپ ئۆتكە بارالماي قانغا تارىلىپ كەتكەنلىكتىن پەيدا بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن كېسەلگە ئۈچ كۈنگىچە تاماق بەرمەي سىركەنجىۋىل ساددە، قىزىتما يۇقىرى بولسا

سىركەنجىۋىل بارىد، ئەرقى كاسىن، قىزىلگۈل
ئەرقى بېرىش ئارقىلىق، قىزىتما، ئۈسۈزلۈقى پەسەيتىپ
ئۇندىن كېيىن ئۆت ياللۇغى بولسا ھەببى شىپا، ھەببى ئەف-
سەنتىن، ئەرقى بەدىيان، ئەرقى شوخلا بېرىش، ئەگەر ئۆتتە
تاش بولسا شارابى بۇزۇرى بارىد، ھەببى رەۋەن بېرىش لازىم.
غىزاسىغا 3 كۈندىن كېيىن ئارپا ئېشىغا تۇرۇپ، پالەك، كۆك
يۇمىلاقسۇت سېلىپ بېرىلىدۇ ھەم چۈجە گۆشى بىلەن تۇرۇپ
سېلىپ ئېتىلگەن شويلا بېرىلىدۇ. قارىئۇرۇك، ئەينۇلا،
چىلان، دىنار شەربەتلىرى بېرىلسە بولىدۇ.

(2) قارا يارقان كېسەلى

ئالامىتى: چىرايى، پۈتۈن بەدەن قارامتۇل رەڭگە كىرىپ،
مۇزلاپ كۆكۈرۈپ كەتكەن ئادەمنىڭ چىرايىغا ئوخشاپ قالىدۇ.
توخۇت پەيدا بولۇپ، تىلىمۇ، سۈيدۈكىمۇ كۆكۈشكە مايىل
قارامتۇل بولىدۇ. دىماغ قۇرۇيدۇ، ئۈسۈزلۈق بولمايدۇ. بەدەن
تېمپېراتۇرىسى تۆۋەن، يۈرەك ھەرىكىتى ئاستا، تومۇرى قاتتىق
سوقىدۇ. جىگەر ساھەسى سانجىقسىمان ئاغرىيدۇ، ھۆ بولىدۇ،
قۇسىدۇ، كۆك سۇ ياندۇرىدۇ، ئىشتىھاسى بولمايدۇ.

سەۋەبى: سەۋدا جىگەردىن تالغا بارىدىغان تومۇردا قويۇق قان
توختاپ توسالغۇ پەيدا بولغاندىن ياكى تال ئىششىغاندىن سەۋدانى
تال قوبۇل قىلماي، جىگەردىن قانغا ئارىلىشىپ بەدەنگە تاراپ
كېتىشىدىن ياكى تال بىلەن ئاشقازان ئوتتۇرىسىدىكى تومۇر

توسۇلۇپ تال ئىششىغان سەۋەبتىن بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: چىگەر بىلەن تال ئوتتۇرىسىدىكى تومۇر توسۇلۇشتىن بولسا سىركەنجىۋىل ئەفتمۇن بېرىش لازىم. ئەگەر تال ئىششىغاندىن بولسا شارابى بىخ كەبىر، ھەببى غاپەس بېرىش، ئاشقازان بىلەن تال ئوتتۇرىسىدىكى تومۇر توسۇلۇپ قېلىشتىن بولسا ئاشقازاننى پاكلاش ئۈچۈن شارابى دارچىن، جاۋارش ئۇد شېرىن بېرىش لازىم. غىزاسىغا نوقۇت، سەۋزە، باچكا گۆشى بىلەن شورپا قىلىپ قارىمۇچ، زىرە، جۇۋنا سېلىپ بېرىش لازىم.

3) سېرىق بىلەن قارىنىڭ بىرلىشىشىدىن

بولغان يارقان

ئالامىتى: سېرىقمۇ، قارىمۇ دېڭىلى بولمايدۇ، ئىككىسىنىڭ قوشۇلۇپ كېلىشىدىن بولىدۇ. سەۋەبى: ئۆت، تال يوللىرىنىڭ توسۇلۇشى بىلەن سەپرا ۋە سەۋدانىڭ ئۆت، تالغا بارماي بەدەنگە تاراپ كېتىشىدىن پەيدا بولىدۇ. بۇ ئېغىر ئۆتىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن كېسەلدە ھارارەت بار يوقلۇقىغا قاراش لازىم. ئەگەر ھارارەت (قىزىتما) يۇقىمىرى بولسا ئالدى بىلەن ئۆتنى راۋانلاشتۇرۇشقا تىرىشىش لازىم. ئەگەر سەۋدانىڭ ئالامەتلىرى يۇقىرى بولسا ئالدى بىلەن چىگەر بىلەن تالنىڭ تومۇرلىرىدىكى توسالغۇنى ئېچىشنى ئاساس

قىلىش لازىم. دورىلىرى يۇقىرىدا بايان قىلىندى. ئوزۇقلۇق جەھەتتە تاماقنى مۇمكىنقەدەر بەرمەسلىك، يۇقىرىقى شەرىپەتلەرنى بېرىش، كۆڭلى تاماق خالىغاندا بېرىش لازىم.

9. جىگەر راکى

ئالامىتى: تاماق يېگۈسى كەلمەسلىك، يېسە ئاشقازان ئېسىلىش، قۇسۇش، جىگەر ساھەسىدە سانجىق، ئېچىش بولۇش، يەڭگىل باش ئاغرىش، بەدەن سارغىيىش، بەدەن قىچىش، جىگەر ساھەسى چىڭقىلىپ كېتىش، چوڭ كىچىك تەرەت خىرەلىنىش، قورساق ساھەسىگە سۇ يىغىلىش، ئاخرىقى باسقۇچتا ئۇيقۇ قېچىش، نەپەس قىستاش قاتارلىق ئالاھىدەلەر كۆرۈلۈپ كېسەل كۈندىن كۈنگە ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. سەۋەبى: جىگەردە پەيدا بولغان سەۋدائىي سەپرائىي ئىشقىلار تەرەققىي قىلىپ راکنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: مۇمكىنقەدەر جىگەردە پەيدا بولغان سەۋدائىي، سەپرائىي ئىشقىللارنى بالدۇر بايقاپ بالدۇر داۋالاشقا تىرىشىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن شارابى دىنار، شارابى ئەفتمۇن، ھەببى تەرياق قاتارلىق دورىلارنى بېرىش، يۇقىرىدا بايان قىلىنغان جىگەردىكى سەۋدائىي، سەپرائىي ئىشقىقلارغا قىلىنغان چارىلەرنى ئەھۋالغا قاراپ قىلىش لازىم.

10. جىگەر قورۇلۇش ۋە قۇرۇش كېسەللىكى

ئالامىتى : ئىچى كۆپ سۈرگەن تارىخى بولىدۇ ھەمدە چوڭ تەرەت گۆش يۇغان سۈدەك كېلىدۇ. بەدەن كۈندىن كۈنگە ئورۇقلايدۇ. كۆز خىرەلىشىدۇ. پېشانە، كۆكرەك، قول دۈمبىلىرىدە قاراداغ چالاشقانداك تېرىلەر قورۇلىدۇ. بۇ چالاش كېسىلىمۇ دېيىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن جىگەر قورۇلۇپ، يىگىلەپ قۇرۇشقا قاراپ ماڭىدۇ.

سەۋەبى : ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەينىڭ ھەزىمىدىن پەيدا بولغان ئوزۇقلۇقنى جىگەرنىڭ سۈمۈرىدىغان ماسارىقا تومۇرى تارتالمىغاندىن ياكى تومۇرى توسالغۇغا ئۇچرىغاندىن ئوزۇقلۇق ماددىلار جىگەرگە بارالماي تەرەت بىلەن چىقىپ كەتكەچكە، بەدەن كۈندىن كۈنگە ئورۇقلاپ جىگەر قېتىپ ئىستىسىقىغا ئۆزگىرىپ، قورساققا سۇ چۈشۈش بىلەن ھايانقا خەۋپ يېتىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى : ماسارىقىنىڭ توسالغۇسىنى ئېچىش ئۈچۈن شارابى ئىزخىر بېرىش، جىگەرنىڭ زەئىپلىكىدىن بولسا بېھى شەرىپىتى، ئۈزۈم شەرىپىتى (شەرىپىتى زەئىپ)، داۋائىل كۆركەم، ئامىلە نۇشدارى بېرىش لازىم.

11. جىگەر مەنبەلىك ئىچى سۈرۈش

ئالامىتى : ① چوڭ تەرەت گۆش يۇغان سۈدەك ئاغرىقىسىز

كېلىدۇ. بۇ قاندىن بولغان جىگەر مەنبەلىك ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالامىتىدۇر؛ ② سەپرانىڭ جىگەردە كۆيۈشى نەتىجىسىدىن تەرەت سېرىققا مايىل، بەزىدە قان ئارىلاش كېلىدۇ؛ ③ جىگەردە يەلنىڭ كۆپلۈكىدىن ماددىلارنىڭ ئۈچەيگە تۈگۈلىشى سەۋەبىدىن بولسا تەرەتنىڭ رەڭگى بىر نەرسىنىڭ پېسىپىگە ئوخشاش كۆپ ھەم كۆپۈكلۈك كېلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. سەۋەبى: جىگەردە ماددىلارنىڭ كۆپلۈكىدىن ماسارىقا ئارقىلىق جىگەرگە بارغان ماددىلارنى ئۈچەيگە ھەيدىۋەتكەندىن، ئۆت سۈيۈقلۈكنىڭ ئۈچەيگە كۆپ بېرىپ قالغانلىقىدىن، ماسارىقا تومۇرىغا يەللىك توسالغۇ پەيدا بولغاندىن بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: قاندىن بولغىنىغا جاۋارش تاباشمىر، ئەرقى قىيمىقۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. سەپرادىن بولغىنىغا بېھى شەرىبىتى، زىخ شەرىبىتى، ئاچچىق ئانار سۈيى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. يەلدىن بولغىنىغا جاۋارش ئەنەبەر، جاۋارش پۇدىنە، ئامىلە نۇشدارى، جاۋارش قانسە، جاۋارش ئۇدۇتۇرۇش بېرىش ياخشىدۇر. تامىقىغا گۈرۈچ بىلەن ياش مالىنىڭ تال، جىگەر، ئۈچەيلىرىنى توغراپ ئاش قىلىپ بېرىش لازىم.

12. جىگەر سانجىقى (جىگەر - ئۆت

تاش كېسەللىكى)

سەۋەبى: جىگەر بىلەن ئۆت يولى ئوتتۇرىسىغا توسالغۇ پەيدا بولۇشتىن، جىگەردە غەيرىي سەپرا خىلىتى قېتىپ تاش

جىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان داۋالاش
 جىگەر پەيدا بولسا، جىگەر ئىچى ئۆت تېشى كېسەلى دېيىلىدۇ.
 جىگەر ئۆت خالتىسىدىكى غەيرىي سەپرا خىلىتىنىڭ قۇيۇقلىشىپ
 قېتىشىدىن ئۆتتە تاش پەيدا بولسا ئۆت تېشى كېسەلى دېيى-
 لىدۇ. بۇ تاشلار پەيدا بولۇشنىڭ سەۋەبلىرى مائىلىق گۆش،
 تۇخۇملارنى قورۇپ يېيىشتىن ياكى ھوردا پىشۇرۇپ يېيىش،
 ھاراقنى كۆپ ئىچىش، جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن كۆپ شۇ-
 غۇللانماسلىقتىن پەيدا بولىدۇ. بۇ تاشلارنىڭ بەزىلىرى چوڭ،
 بەزىلىرى كىچىك، رەڭگى قارا، يېشىل، كۈلرەڭ ۋە داشقال
 رەڭ بولىدۇ.

ئالامىتى: ئوڭ تەرەپ قوۋۇرغىلار ئارىسىدا تۇيۇقسىز ئاغ-
 رىش پەيدا بولۇپ، ئاغرىق ئاشقازان ئۇدۇلىغا ھەم ئوڭ تەرەپ تاغاق
 ساھەسىگە تارايىدۇ. كېسەل ھەرىكەت قىلالمايدۇ، كۆڭلى ئاي-
 نىدۇ، ھۆ نۇتىدۇ، بەزىدە سېرىق سۇ ياندۇرىدۇ. قورساق
 ئېسىلىدۇ، ھېق تۇتىدۇ، زەردە قاينايدۇ. قەۋزىيەت بولىدۇ،
 ئېغىز قۇرۇپ، ئاچچىق بولۇپ كېتىدۇ. تاش ئۆت يولىغا كەپ-
 لىشىپ قالسا، كېسەل قاتتىق بىئارام بولۇپ ئايلىنىپ كېتىد-
 ىغان ئەھۋال مۇ بولىدۇ. تاش جىگەرنىڭ ئۆزىدە بولسا تۇتقاقلىق
 بولمايدۇ. جىگەر ساھەسىدە ئېغىرلىق، تېلىش، يەڭگىل
 زىڭىلداش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئۆتتىكى تاش ئۆتنىڭ غول
 نەچچىسىدە تۇرۇپ قالسا كېسەلنىڭ بەدىنىگە سېرىقلىق پەيدا
 قىلىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال ئېغىرراق ئۆتىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن ئاغرىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن

ھەببى شىپا ياكى ھەببى تەرياق بېرىش، سىرتتىن خەشخاش

پوستىنى سوقۇپ جىگەر ساھەسىگە چېپىش كېرەك. ئاغرىق پەسەيگەندىن كېيىن تاش ئېرىتىدىغان دورىلارنى بېرىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن مەجۇنى ۋەرد، شارابى بۇزۇرى، ئەرقى بەدىيان، ئەرقى شوخلا، ئەرقى پۇدىنە بېرىش، جاۋارش جا-لىنىۋس، ھەببى رەۋەن، سۇفۇپى ھەجرۈلىيەھۇت بېرىش، يەنە سىركەنجىۋىل ئۇنناپ، سىركەنجىۋىل بۇزۇرى بەرسىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئەگەر تاش جىگەردە بولسا جاۋارش نانخا، سۇ-فۇپى ھەجرۈلىيەھۇت، سىركەنجىۋىل، ئەفسەتتىن، مۇرەككەپ ئەرقى كاسىن، جاۋارش زەر ئۇنى بېرىلسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئوزۇقلىنىش جەھەتتە غەيرىي سەپرا خىلىتىنى تەڭشىگۈچى تاماقلاردىن كەپتەر گۆشى، سەۋزە، تۇرۇپ، كەرەپشە، موگۇ سېلىنغان شورپا بېرىلىدۇ. قوي گۆشى، تۇخۇم، كالا گۆش-لىرىدىن پەرھىز قىلىنىدۇ. مېۋىلەردىن ئاپېلىس (جۈيزە)، ئەينۇلا، تاۋۇز قاتارلىق-لارنى يېسە بولىدۇ.

13. جىگەر يىرىڭلىق ئىششىقى

سەۋەبى: جىگەرنىڭ قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىششىقلىرى-نىڭ يۇقۇملىنىپ يىرىڭ پەيدا قىلىشىدىن يەنى ھاۋا كىلىماتى ئىسسىق جايلاردا ئۇزۇن ياشاش، جىگەردە ئىششىق بار تۇرۇپ گۆش ياغنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، ھاراق ئىچىش، چۈچۈمەل نەرسىلەرنى كۆپ يەپ جىگەرنى قاتتىق غىدىقلاش تەسىرىدىن

چىگەرەتچىلىك ۋە ئىگىلىك ۋەزىيەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋەزىيەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى
ياكى ئۆزىنىڭ ئۆزى سۈيۈقلۈقنى قوبۇل قىلالىغانلىقىدىن
سەپرا خىلىتىنىڭ جىگەردە توپلىشىپ قېلىشىدىن ، يۈرەك دا-
لانچىسىنىڭ جىگەردىن كۆك قان تومۇر بىلەن بارغان قاننى قو-
بۇل قىلماسلىق سەۋەبىدىن ، جىگەردە زاپاس قاننىڭ ئېشىپ
كېتىشىدىن پەيدا بولىدۇ .

ئالامىتى : قىزىش ، جۇغ جۇغ بولۇش ، تولا ئۇسساش ،
جىگەر ساھەسى ئاغرىش ، ئېچىشىش ، ئىشتىھا بولماسلىق
ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ ، ئاغرىق ئوڭ تاغاق ساھەسىگە قەدەر تار-
قايدۇ . قورساق ئېسىلىدۇ . كېسەلدە قۇرۇق ھۆ بولۇش ، بەدەن
سارغىيىپ كېتىش بولىدۇ . بەزىدە قەۋزىيەت بولىدۇ ، كېسەل
ئورۇقلاپ ماغدۇرسىزلىنىدۇ ، كېسەلدە سىلىنىڭ ئالامەتلىرى
كۆرۈلىدۇ ، يىرىڭلىق ئىششىق بارچاي ئېگىز بولىدۇ ھەم باسسا
ئاغرىيدۇ . جاراھەت چوڭراق بولسا 3 ئايدىن 6 ئايغىچە سوزۇلۇپ
داۋانى قوبۇل قىلىدۇ . لېكىن جاراھەتلىر كىچىك ، كۆپ بولسا
خەتەرلىك . ئەمما ئېغىز ئېلىپ ئاشقازان ئۈچەيگە چۈشسە ئاق-
ۋىتى ياخشىدۇر . قورساق ، يۈرەك ، ئۆپكە پەردىلىرىگە چۈشسە
ياخشى ئەمەس .

داۋالاش ئۇسۇلى : ئالدى بىلەن يىرىڭنى يوقىتىش ، يۈ-
قۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەقسىتىدە ھەببى شىپا ، ھەببى
تەرياق ، قۇرسى كەھرىۋا ، ئەرقى گۈل ، ئەرقى شاھتەررە بېرىش
لازىم . جۇغ جۇغ بولۇش ، قىزىپ سوۋۇش ، ئۇسسۇزلۇق پە-
سەيگەندىن كېيىن ئىششىق ياندۇرۇش ئۈچۈن ئەرقى شوخلا ،
ئەرقى كاسىن ، ئەرقى بەدىيانلارنى شارابى ئەفسەنتىن بىلەن بەرسە
ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ . ئىششىق يانغاندىن كېيىن جاۋارش

ئامىلە، مەجۇنى ۋەرد، شارابى دىنار، بېھى شەربەتلىرىنى بېرىپ جىگەرنى قۇۋۋەتلەش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

تامىقىغا كېسەللىكنىڭ دەسلەپىدە ئارپا ئېشىغا قارىئورۇك، ئەينۇلا، چىلان سېلىپ ياكى تۇرۇپ، پالەك، يۇمغاقسۇت سېلىپ ئاش قىلىپ بېرىلىدۇ. كۈچلۈك غىزا بېرىلمەيدۇ. بەدەننى قۇۋۋەتلەشكە كېسەللىكنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ سەپرا كۈچلۈك بولسا ئەينۇلا مۇرابباسى، قان كۈچلۈك بولسا بېھى، ئامۇت شەربەتلىرى بېرىلسە بولىدۇ.

14. جىگەرنىڭ يەللىك كۆپۈشۈپ قېلىشى

ئالامىتى: ئوڭ تەرەپ قۇۋۇرغا ئاستىدا تارتىشىش بىلەن ئاغرىش بولىدۇ، ئېغىرلىق، قىزىتما بولمايدۇ، تاماق سىڭىپ بولغاندا جىگەر ۋە ئاشقازان ساھەسىدە بىرئاز كۆپۈشۈش پەيدا بولىدۇ. ئېغىز قۇرۇيدۇ، ئېغىز تەمى ئاچچىق بولۇپ، شىلىم-شىق بولۇپ قالىدۇ. باش چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: جاۋارش كۈمۈنى، دىنار شەربەتلىرى بېرىلىدۇ (تامماقتىن بۇرۇن دىنار شەربىتى)، تامماقتىن كېيىن جاۋارش كۈمۈنى بېرىلىدۇ. دورىلاردىن بەلغەم خىلىتىنىڭ غاپىللىقىدىن بولسا، جاۋارش شەھرىيان، سەۋدا خىلىستى غالىب بولسا، مەتبۇخى ئەفتىمۇن بىلەن سۈرگۈ بېرىلىدۇ. تاماققا زىرە، پىننە، قارىمۇچ، دارچىن سېلىپ بېرىلسە ھەم كەپتەر، قوي گۆشلىرىنىڭ كاۋاپلىرى بېرىلسە بولىدۇ.

15. جىگەر ئۆسمىسى

جىگەر ئۆسمىسى ياخشى سۈپەتلىك ئۆسمە، يامان سۈپەتلىك ئۆسمە (راك) دىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ.

سەۋەبى: غەيرىي سەپرا، غەيرىي سەۋدا ماددىلىرى ۋە غەيرىي بەلغەم ماددىلىرىنىڭ جىگەر توقۇلمىلىرىدا پەيدا بولۇشىدىن بو-
لىدۇ. ياخشى سۈپەتلىك ئۆسمە — جىگەر ئۆستىدە پەيدا بولى-
دىغان سۇلۇق خالتىلىق ئۆسمە، جىگەر قان تومۇرلىرى ئىچىدە
پەيدا بولىدىغان كىچىك ئۆسمىلەر، جىگەرنى تۇتۇپ تۇرغۇچى
پەردە ۋە كىرگەتلەردە پەيدا بولىدىغان مۇنەكچە ئۆسمىدىن ئىبارەت
ئۈچكە بۆلۈنىدۇ.

ئالامىتى: سۇلۇق ئۆسمە قايسى جايدا پەيدا بولسا شۇ جايدا
ئېغىرلىق، سوغۇقلۇق بىلىنىدۇ. تومۇر ئىچىدىكى ئۆسمىدە
بەزىدە چىم چىم قىلغاندەك زىگىلداش ئالامەتلىرى بولىدۇ.
جىگەرنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەردىدە پەيدا بولىدىغان ئۆسمە بەزىسىمان
چوڭ بولۇپ چوڭىيىپ ماڭغاندا چىڭقىلىش، يېقىمىسىزلىق
ھېس قىلىش، تاماقتىن كېيىن قورساق ئېسىلىش، ئىشتىھا
تۇتۇلۇش، قۇسۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ۋاقتىدا داۋا-
لانمىسا، يامان سۈپەتلىككە ئۆزگىرىپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋالاش ئۇسۇلى: سۇلۇق ئۆسمىنى داۋالاشتا بەلغەمنى
پىشۇرغۇچى مۇنزىج يېرىپ ئۇندىن كېيىن جاۋارش شەھرىيان

نى بىر قانچە كۈن بېرىپ ئارقىدىن داۋاملىق كۆركەم،
ئىسارابى دارچىن، شارابى سۈمبۈل بېرىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
قان تومۇردا پەيدا بولغان ئۆسمىگە سەۋدانىڭ مونزىجىنى 15 كۈن
بېرىپ ئۇندىن كېيىن مەجۇنى بايادىدۇس نى كەچتە بىر ۋاخ بې-
رىش، ئەتىگەندە ئىترىفىل جالىنىۋس، چۈشتە جاۋارش ئۇد-
شېرىن بېرىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. شەربەتلەردىن شەرىبتى
زەبىب، ئەۋرىشم شەرىبتى، رەيھان شەرىبتى قاتارلىقلار بې-
رىلسە بولىدۇ.

تامىقىغا نوقۇت شورپىسى، توخۇ، كەپتەر گۆشى-
لىرى، بۇغداي نېنى، كۆكتاتلاردىن سەۋزە، يېپىسىمۋىلىك،
تۈرۈپ، پالەك، ئوسۇك، سامساقلىرى بېرىلسە بولىدۇ. مېۋە-
لەردىن ئۈزۈم، ئاپپىلىسىن (جۈيزە)، ئۈزۈمە مۇۋاپىقتۇر.

16. بەدەن كۆپۈپ ئىششىشىش (سوئۇلقونىيە)

سەۋەبى: بەدەننىڭ بولۇپمۇ، چىگەردىكى تەبىئىي ئىس-
سىقلىقنىڭ ئاجىزلىشىشىدىن چىگەرنىڭ ھەزىم كۈچى
ئاجىزلاپ، ماددا ئالماشتۇرۇشنىڭ سۈرئىتىدىن ۋېنا (كۆك قان
تومۇر) لاردىكى قانلارنىڭ قىل قان تومۇرلار ئارقىلىق، ئارتىپ-
رىيە (قىزىل قان تومۇر) لەرگە ئۆتۈشنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىشى
چوڭ كىچىك تەرەت، ئاياللاردا ھەيزنىڭ توختاپ قېلىشى ياكى
خىرەلىشىشى قاتارلىقلار سەۋەب بولىدۇ.

ئالامىتى: كېسەل كىشىنىڭ چىرايى ۋە قول - پۇت

بەدەنلىرى ئېسىلىپ قالىدۇ. بۇ كېسەل سۇلۇق ئىششۇق يەنى، ئىستىسقىرنىڭ باشلىنىشى بولۇپ، سۈيىدۈك، چوڭ تەرەت خىرە، بىر ئاز نەپەس قىستاپ بەدەنلىرى كۆپىيۈپ ئىششۇپ قالغاندەك كۆرۈنىدۇ. ئەمما بەدەنلىرىنى بېسىپ كۆرسە ئويمانلىشىش ئەھۋالى بولمايدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: بۇ كېسەللىك ئاساسەن سۇلۇق ئىششۇقنى داۋالىغاندەك داۋالىنىدۇ. ئەمما بۇ كېسەل سۇلۇق ئىششۇقتىن بولغاچقا، كۈچلۈك دورا ئىشلەتمەسلىك لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن مائۇل ئۇسۇل بۇزۇرى بېرىش ياخشىدۇر.

تەركىبى: ئىزخىر، قوۋزاق دارچىن، بىخ بەدىيان، بىخ كەرەپشە، بىخ كەبىر، تۇخۇمى كىشۇش، تۇخۇمى كەرەپشە ھەربىرى 30 گرامدىن، تۇخۇمى كاسىن، ئارپىبەدىيان، رۇم بەدىيان، ئوردان، رەۋەن، سۈمبۇل، يوپقا زەنجىۋىل ھەربىرى 15 گرامدىن، قۇرۇق ئۈزۈم 150 گرام.

ياساش ئۇسۇلى: دورىلارنى چالا سوقۇپ ئۈزۈمنى سېلىپ، 2 كىلوگرام سۇغا بىر سوتكا چىلاپ ئۇنىڭدىن كېيىن 1 كىلوگرام قالغۇچە قاينىتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈندە 3 قېتىم تاماقتىن بۇرۇن 100 گرامدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. مۇشۇ بويىچە 3 قېتىم تەييارلاپ بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن جىگەرنى كۈچەيتىش ئۈچۈن، داۋائى ۋائىل كۆركەم، جاۋارش ئەنپەر، شارابى دارچىن، داۋائى جىنتيانا، مەجۈنى دەبىدلىۋەرد بېرىلىدۇ. ئىسكەنجىبىل بۇ.

زۇرى بېرىش جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق. تامىقىغا تۆگە، ئۆچكە سۈتلىرى، كەپتەر، قۇشقاچ،

كەكلىك گۆشىنى نوقتۇ بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش ، تەبىئىي قۇرۇق ئىسسىق غىزالارنى بېرىش لازىم . غىزاسىغا ، دارچىن ، قارىمۇچ ، پىننە ، زىرە سېلىپ بېرىش لازىم . كېسەلنى كۆپ ھەرىكەت قىلىشقا بۇيرۇش ، كۆپ ئۇخلىماسلىق ، كۆپ يۇيۇنماسلىق ، ئىسسىقراق يۈرۈشكە دەۋەت قىلىش زۆرۈر . دۇر .

پەرھىزى : سوغۇق سۇ ، قېتىق ، بېلىق ، بۇغداي ئۈنىدا ئېتىلگەن تاماقلار ، تاۋۇز ، شاپتۇل ، نەشپۈت قاتارلىق ھۆل يېمىشلەردىن ، كالا گۆشلىرىدىن پەرھىز قىلىنىدۇ .

17 . سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا)

سۇلۇق ئىششىق — گۆش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقا ئىلھىمى) ، قورساققا سۇ چۈشۈش (ئىستىسقا ئىلھىمى زىققە) ، قورساققا يەل ۋە سۇ يىغىلىش (ئىستىسقا ئىلھىمى تەبىئىي) دىن ئىبارەت ئۈچكە بۆلۈنىدۇ . ئىستىسقا كېسىلى بولسا ، بەدەندە تەبىئىي ئىسسىقلىقنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىدىن يەنى يۈرەكنىڭ زەئىپلىشىشى بىلەن جىگەردە ماددا ئالمىشىشنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بەدەن توقۇلمىلىرىغا سۇ چۈشۈش ئارقىلىق ئىپادىلىنىدىغان ئېغىر ۋە مۇرەككەپ كېسەللىكنىڭ بىرىدۇر .

1 (گۆش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقا ئىلھىمى))

ئالامىتى : بۇ تۈردىكى ئىششىقنىڭ ئاساسىي ماددىسى

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە تېبابىتى

غەيرىي ھۆللۈك بولۇپ ، ئۇ بەدەندىكى گۆشلەرنىڭ ئارىسىدا توختاپ قالغانلىقتىن ، بەدەننى باسقاندا ئىز قالىدىغان ئىششىق پەيدا قىلىدۇ . نەپەس قىستايدۇ ، كالىپۇكلىرى كۆكسىرىدۇ .

سەۋەبى : جىگەر مىزاجىنىڭ سوغۇقلىقتىن بۇزۇلۇپ جىگەر ھارارىتىنىڭ (ئىسسىقلىقنىڭ) تۆۋەنلەپ كېتىشى نەتىجىسىدە ، جىگەرنىڭ ماددىلارنى ئۆزلەشتۈرۈش ، پىشۇرۇش خىزمەتلىرى تۆۋەنلەپ بۇ خىل پىشماغان خام ماددىلار بەدەندە تارقىلىپ قان ئايلىنىش ئارقىلىق ، توقۇلمىلاردا توختاپ قېلىشقا سەۋەبچى بولىدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا ، جىگەرنىڭ ھەرخىل كېسەللىكلەرگە ئۇچرىشى بۇ كېسەلنى پەيدا قىلغۇچى ئاساسلىق سەۋەب بولۇپ ھېسابلىنىدۇ . جىگەر بىلەن مۇناسىۋىتى بولغان ئۆت ، 12 بارماق ئۈچەي ، تال ، بۆرەك ، ئاشقازان ، بالىياتقۇ ، ئۈچەي ئىسھاللىرى ، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن بولغان قان ئازلىق كېسەللىكلىرىمۇ سەۋەب بولىدۇ .

جىگەر ئاجىزلىقتىن بولغان سۇلۇق ئىششىقنىڭ ئالامىتى ئىششىقنىڭ پەيدا بولۇشى ، تەرەققىي قىلىشى ئاستىراق بولىدۇ ، كۆپىنچە ھالدا قورساققا سۇ چۈشۈش (ئىستىسقا ئىزىقە) تە روئەنرەك بولىدۇ . شۇڭلاشقا ئاۋۋال قورساق ، پۇت ئىششىق ئاندىن باشقا ئەزالار ئىششىيدۇ . جىگەر كىچىكلەپ قېتىش ۋە ئۇنىڭ زەئىپلەشكەنلىكىگە ئائىت ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ . مەسىلەن ئۇسسۇزلۇقنىڭ كۆپ ، سۈيدۈكنىڭ ئاز بولۇشىغا

ئوخشاش.

بۆرەك سەۋەبىدىن بولغان سۇلۇق ئىششىقنىڭ ئالامىتى بەل ئاغرىش، غول تېلىش، قاپاقلار ئىششىش، باش ساھەسى ئىسسىش، قىسقا ۋاقىت ئىچىدە سۈيۈك ئازلاپ كېتىش بىلەن سۇلۇق ئىششىق پۈتۈن بەدەنگە تارايىدۇ. بۇنىڭ بىلەن نەپەس قىستاش، قورساق ئېسىلىش، يۆتىلىش، سۈيۈك توختاش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

سەۋەبى: ئۆتكۈر بۆرەك ياللۇغى ياكى يۈرەك، جىگەرنىڭ زەئىپلىشىشى سەۋەبى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، بەدەندە ئو-زۇقلۇق ماددا يېتىشمەسلىك، كەم قانلىق، ھامىلىدارلىق ۋا-قتىكى سۇلۇق ئىششىقلار سەۋەبى بولۇپ، بۇنىڭ ئالامىتى تۆۋەندىكىچە

(1) ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن بولسا ئالدى بىلەن ئاياغ تەرەپ ئۇنىڭدىن كېيىن، تېز ۋاقىت ئىچىدە پۈتۈن بەدەن ئىش-شىيدۇ. كېسەلنىڭ چىرايى سارغىيىدۇ، قول ۋە پۇتلىرى ئې-غىرلىشىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ ئالاھىدىلىكى ئوزۇقلانمىش ياخشىلانسا ئاسانلا ئوڭشىلىپ قالىدۇ.

(2) كەم قانلىقتىن بولغان سۇلۇق ئىششىقتا، كېسەلدە قان يوقاقلانلىق ياكى قان يوقىتىشقا سەۋەبى ئامىللار تېپىلىدۇ. كېسەلنىڭ چىرايى تاتىرىدۇ، پۇت قوللىرى جانسىزلىنىدۇ، ئورۇقلايدۇ، نەپىسى قىستايىدۇ، ئىشتىھاسى تۆۋەنلەيدۇ، قور-سىقى تۇتقاقلىق مۇجۇپ ئاغرىيدۇ.

(3) ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى سۇلۇق ئىششىق. كۆپىنچە

چىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى (داۋالاش)
تىز ئاستىدا، بەزى قېنى ئاز ئاياللاردا پۈتۈن بەدەنلىك
ئىششىشمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ قاننىڭ ئازلىقى ھەم قانغا قويۇق يەل
ئارىلاشقانلىقتىن بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئىستىسقا ئىلھامىنى (گۆش سۇلۇق ئىش-
شىقى) داۋالاشتا ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاپ چىقىش،
ئاندىن كېيىن داۋالاشقا قول سېلىش لازىم. بۇ خىل كېسەلگە
تۈز سېلىنغان غىزالارنى بېرىشنى توختىتىش، تاماقنى تۈزسىز
قىلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىش لازىم. دورىلاردىن توسالغۇ-
لارنى ئاچقۇچى، سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىش، بەزىدە
سۈرگە دورىلىرىنى، تەرلەتكۈچى دورىلارنى بېرىش لازىم. مە-
سىلەن كېسەلدە قىزىتما بولسا ئىرقى كاسىن، ئىرقى گۈل،
ئىرقى شوخلا بېرىش، ئەگەر قىزىتما بولمىسا دىنار شەرىپىتى،
ئەفسەنتىن شەرىپىتى، مۈرەككەپ قىزىلگۈل شەرىپىتى، شارابى
دىنار، ئىرقى بەدىيان، سۈرگە ئۈچۈن جاۋارش چىلاپا، ئايارەج
پەيقىرا، جاۋارش شەرىپىتىدىن قايسى مۇۋاپىق كەلسە شۇنى بې-
رىش كېرەك. سۇلۇق ئىششىقنى داۋالاشتا، شۇنى ئەستە تۇتۇش
لازىمكى، ئىچىنى كۆپ سۈرۈش ياكى كۈچلۈك سۈرگە بېرىشتىن
ساقلىنىش لازىم. داۋالاش جەريانىدا يۈرەك، جىگەر، بۆرەكنىڭ
مىزاجىنى تەڭشەش، قۇۋۋەتلەشنى ئۈنۈملۈك لازىم. جىگەر
مىزاجىنىڭ سوغۇقلۇقىنى تەڭشەشتە مەجۈنى داۋائىل كۆركەم،
تەرياقى ئىربەئە بېرىش، كېسەلدە يۆتەل قوشۇلۇپ كەلسە زۇپا
شەرىپىتى، ھەببى غارقۇن بېرىپ تۇرۇش بىلەن بىرگە شارابى
بۇزۇرى بېرىش لازىم. سىرتتىن دورا ئىشلىتىش توغرا كەلسە
تۆۋەندىكى دورىلا چېپىلسا بولىدۇ. توغرىغا، بابۇنە،

سوزاپ ياغلىرى سىرتتىن چېپىلسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا دارچىن، بىخ سەۋسەن يېغى بىلەن ياغلاش پايدىلىق. شۇمىش ئالقىنى، كالا تېزىكى، كەپتەر مايىقى، كۆپىكى دەريا، توغرىغۇنى ئوبدان سوقۇپ سىركە بىلەن خېمىردەك قىلىپ بەدەنگە چاپسا بولىدۇ.

تەرلىتىش تەدبىرلىرى جەھەتتە قىزىقراق قۇمغا كۆمۈش، مۇنچىدا تەرلىتىش (ھوردا تەرلىتىش)، گۈڭگۈرتلۈك ئارشاڭ-لارغا چۈشۈش ئارقىلىق بەدەندە يىغىلىپ قالغان سۇلارنى چىقىرىپ تاشلاش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش لازىم.

تاماق جەھەتتە توخۇ، كەپتەر، پاقلان، ئوغلاق گۆشلىرىنى زىخ كاۋىپى قىلىپ بېرىش ھەمدە نوقۇت بىلەن شورپا سېلىپ بېرىش، تۈزلۈك غىزا بەرمەسلىك كېرەك. ئىستىسقا تالىنىڭ ئاجىزلىقىدىن سەۋدا خىلىتىنى چىگەردىن تارتالمىغاچقا، سەۋدا خىلىتى قانغا ئارىلىشىپ بەدەنگە بېرىپ ماددىلارنى قويۇلدۇرۇپ، توسالغۇ پەيدا قىلىشىدىن بولغان چىگەر، تالىنىڭ توسالغۇسىنى ئاچقۇچى دورىلاردىن شارابى ئەفسەنتىن، شارابى زەبىب بېرىش، غىزاسىغا تۇخۇم سېرىقىنى شېكەر بىلەن قوشۇپ بېرىش، گۆشلەردىن كەپتەر، توخۇ، كەكلىك، پاقلان گۆشلىرىنى كاۋاپ قىلىپ بېرىش لازىم.

(2) قورساققا سۇ چۈشۈش (ئىستىسقائى زىققە)

ئالامىتى: ئىستىسقائى زىققىدا كۆكرەك بوشلۇقى، قورساق

چىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ئىپادىسى داۋالاش
بوشلۇقى ۋە ئۈچەي بوشلۇقلىرىغا سۇ چۈشۈپ، نەپەسنى
سىقىدۇ، كىچىك تەرەتنىڭ رەڭگى سۇسلىشىدۇ، قورساق سا-
ھەسىنىڭ ئىششىقى باشقا جايلارنىڭ ئىششىقىدىن ئېغىرراق ئۆ-
تىدۇ. قىزىتما پەيدا بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: سەۋەبىگە قارىتا داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.
قاننى جانلاندۇرۇش، قىزىتىش، بەدەنگە ھۆللۈك سۈيۈقلۈك
بېرىشنى ئىچكى تاشقى جەھەتتە توختىتىش ئارقىلىق بەدەننىڭ
ھەيدەپ چىقىرىش كۈچىنى ئاشۇرۇش تەدبىرلىرى قوللىنىلىدۇ.
ئەگەر قىزىتما پەيدا بولۇپ قالسا، ھەببى شىپا سوفۇپى، رەۋەن
بېرىش، ئۇسسۇزلۇق كۆپەيسە ئانار شەربىتى بېرىش ياخشىدۇر.
شۇنى بىلىش لازىمكى، ئىستىسقىنىڭ ھەممىسى سوغۇق-
تىن بولمايدۇ، بەلكى جىگەر، يۈرەك، بۆرەك مىزاجىنىڭ
ئىستىسقىلىقتىن بۇزۇلۇشىدىنمۇ بولىدۇ. بەدەننىڭ رەڭگى ئاق،
تىلى، كۆز ئېقى، سۈيدۈكى ئاق بولسا، بەدەندە قىزىتما بول-
مىسا، ئۇسسۇزلۇق بولمىسا سوغۇقتىن دەپ قارىلىدۇ. ئەگەر
قىزىتما بولۇپ ئۇسسۇزلۇق بولسا، چىرايى، تىلى، كۆز
ئېقى، چوڭ كىچىك تەرەتلىرى سېرىق ياكى قىزىل بولمىسا
ئىستىسقىتىن بولغان دەپ قارىلىدۇ. ئىستىسقىتىن بولغان ئىس-
تىسقىنى داۋالاشتا ئىرقى شوخلا، ئىرقى گۈل، ئاچچىق ئانار
شەربىتى، قىزىلگۈل شەربىتى، قۇرسى ئەنبرى بارىس، ئىرقى
شاھتەررە، مەتبۇخى ھېلىلە، مەتبۇخى تەمىرى ھىندى،
سىركەنجىۋىل ساددە، تەرخەمەك، سېمىز ئوت ئۇرۇقىنىڭ
شىرنىسى بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

چىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى

تامىقىغا ئارپا ئېشىغا تۇرۇپ ، كۆك يۇمغاقسۇت ،
كەرەپشە ، ياش خوراز گۆشى سېلىپ بېرىش پايدىلىق . ئىسسىق
ئىسقا ئىسسىقلىقتىن بولسا سۈيدۈك ھەم چوڭ تەرەتنى ھەيدىگۈچى
سوغۇقلۇق دورىلارنى بېرىش ، سوغۇقلۇقنىڭ ئالامەتلىرى كۆ-
رۈلسە ، سۈيدۈك ھەم چوڭ تەرەتنى ھەيدىگۈچى ئىسسىقلىق دو-
رىلارنى بېرىش لازىم .

(3) قورساققا يەل ۋە سۇ يىغىلىش (ئىسسىقلىق تەبىلى)

سەۋەبى: بۇ جىگەر ، ئاشقازان ، ئۈچەينىڭ مىزاجىنىڭ بەك
ئىسسىق ياكى بەك سوغۇقلۇقتىن بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ .
دىغان مۇرەككەپ كېسەللىكنىڭ بىرىدۇر . ئىسسىقلىقتىن
بولۇشتا ، بەك قۇرۇق ئىسسىق غىزا ياكى دورىلار جىگەر ، ئاش-
قازان ، ئۈچەي ماسارىقا تومۇرلىرىنى قۇرۇتۇپ ، تومۇرلارنىڭ
ئېلاستىكىلىقىنى تۆۋەنلىتىپ ، قاننىڭ قويۇلۇشىدىن ئوزۇقلۇق
ماددىلار جىگەرگە تولۇق سۈمۈرۈلمەي خام ھالىتىدە يەل پەيدا قى-
لىپ قويغانلىقتىن ياكى ھەددىدىن زىيادە ھۆل سوغۇق ئاشقازان ،
جىگەر ، ئۈچەيلەرنىڭ ھارارىتىنى تۆۋەنلىتىپ يەلگە ئايلاندۇرۇپ ،
قورساق بوشلۇقىغا سۇ يىغىپ قويغانلىقىدىن بولىدۇ .

ئالامىتى: قورساق تېرىسى پۇۋلىگەن تۈلۈمدەك چوڭىيىپ
كېتىدۇ . قورساقنى چەكسە خۇددى ناغرا ئاۋازىدەك ئاۋاز چىقىدۇ .
ھەتتا كىندىك پولىتىيىپ چىقىپ قالىدۇ . چوڭ تەرەت سۈرۈپ

تۈزۈش مۇ يەنىلا قورساق ئېسىلىدۇ.

دىۋالاش ئۇسۇلى: سەۋەبىنى ئېنىقلاپ سەۋەبكە قارىتا دىۋالاش

لازىم. مىزاننىڭ ئىسسىقلىقىنى بۇزۇلۇشىدىن بولسا، سىركەدە جىۋىل زىرىق تەييارلاپ بېرىلىدۇ. بۇ دورا ئىسسىق سۈرۈشنى توختىتىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ. تەركىبى زىخ 100 گرام، سۇ 3 كىلوگرام، سىركە 200 گرام، شېكەر 300 گرام. قائىدە بويىچە تەييارلاپ ئۇسسۇزلۇقىغا 50 گرامدىن بېرىلىدۇ. بەدەن تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن زىرە، كۈندۈر با-راۋەر مىقداردىكى شېكەر بىلەن سوقۇپ قىلىنىپ بېرىلسە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. سوغۇقتىن بولغان ئىسسىقلىق تەبىئىيەتكە ھەببى رەۋەن شارابى بۇزۇرى بېرىپ، ئۇندىن كېيىن مەجۋىنى كاسىرىياخ، مەجۋىنى ئەنسىيۇن، جاۋارش ناخا بېرىش لازىم. تامىقى ئۈچۈن نوقۇت ئېشىغا كەپتەر، قۇشقاچ گۆشلىرىنى سېلىپ پىشۇرۇپ دارچىن، قارىمۇچ، زىرە، سېرىقچىچەك سېلىپ پىشۇرۇپ بېرىش كېرەك. ئۇزۇقلۇق جەھەتتە تۆگە سۈتى، ئۆچكە سۈتى، ئانار سۈيى سۇلۇق ئىششىق كېسەللىككە ناھايىتى مەنپەئەتلىكتۇر.

جىگەر كېسەللىكلىرى سەۋەبىدىن پەيدا بولغان بىر قىسىم كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارنى داۋالاش

جىگەر بولسا باشتا سۆزلەپ ئۆتكەندەك ، بەدەندىكى خىمىيەلىك زاپاس زاپۇت بولۇپ ، بەدەنگە كېرەكلىك بولغان بارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنى پىششىقلاپ ئىشلەپ ئۇنى بەدەنگە يەتكۈزۈپ ، بەدەننى ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەشنىڭ سىرتىدا ئوزۇقلۇق ماددىلارنى زاپاس ساقلاش رولى بار . ئۇ بەدەندىن جىگەرگە سۈمۈرۈلگەن ئوزۇقلۇقلارنى زەھەرسىزلەندۈرۈپ ، قان تەركىبىدىكى زەھەرلىك ماددىلارنى تازىلايدۇ . ئەگەر جىگەرنىڭ يۇقىرىقىدەك فۇنكسىيەلىرىدە ئاجىزلاش ، بۇزۇلۇش كېلىپ چىقسا ، بەدەندىكى مەلۇم بىر قىسىم كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا سەۋەبچى بولىدۇ . شۇنى ئەستە تۇتۇش لازىمكى ، بارلىق ماددىلىق كېسەللىكلەر جىگەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . ئۆۋەندە جىگەر سەۋەبىدىن كېلىپ چىقىدىغان بىر قىسىم كېسەللىكلەر ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز .

1. ئۆتكۈر ئۆت ياللۇغى

سەۋەبى : كۈچلۈك سەپرا خىلىتى پەيدا قىلىدىغان قورۇلغان

چىگەر كىسەللىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بەك كۆپلىگەن كىشىلەر غىزالارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، بەك كۆپلىگەن كىشىلەر ھاۋادا كۆپ چارچاپ ئىشلەش، ئاچچىق دەملەنگەن چايلارنى ئىچىشتىن بولىدۇ.

ئالامىتى: قىزىتما، جۇغ جۇغ بولۇش، ئېغىز تەمى ئاچچىق، تىلى يىرىك بولۇش، ھۆ بولۇش، قورساق ئېسىلىش، ئىشتىھا بولماسلىق قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ. داۋالاش ئۇسۇلى: سىركەنجىۋىل ساددە، تەمى ھىندى، قارىئورۇك، چىلان، بېھى ئورۇقى، ئىسپىغۇللارنى چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچكۈزۈش، مۇرەككەپ دورىلاردىن قۇرسى ئەنبىرى بارس، قۇرسى كافور، ئەرقى شاھتەررە، ئەرقى شوخلا بېرىش لازىم.

2. سوزۇلما ئۆت ياللوغى

سەۋەبى: غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنىڭ ئۆت سۇيۇقلۇقىغا ئارىلىشىپ ئۆت خالىتىسىغا كىرىپ قېلىشىدىن، ئۆت سۇيۇقلۇقى قويۇلۇپ 12 بارماق ئۈچەيگە كېلەلمەسلىكىدىن ئاشقان قازان ھەم ئۆت يەڭگىل دەرىجىدە ياللوغلىنىدۇ.

ئالامىتى: قورساق ئاچماسلىق، ئاشقازان، جىگەر ساھەسى بىرئاز كۆپۈشكەندەك بولۇش، ئېغىز قۇرۇش، ئاچچىق، ئۆس-سۈزلۈك، قىزىتما بولماسلىق، چوڭ تەرەت خىرە بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: سىركەنجىۋىل بۇزۇرى، پىننە، گۈلقەنت،

چىگەرەننىڭ خالىتىسىنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ خالىتىسىنى ئۆزگەرتىش
 جاۋارش كۈمۈنى، ھەببى كۈرسۈنگى، جاۋارش نانخا
 قاتارلىق بەلغەم ھەم سەپرانى تەڭشىگۈچى، سۈرگۈچى دورىلار
 بېرىلىدۇ.

تامىقىغا كەپتەر، قۇشقاچ، پاختەك گۆشلىرى شورپىسىغا
 سەۋزە، سامساق، زىرە، قارىمۇچ سېلىپ بېرىلسە بولىدۇ.
 پەرھىزى: تۇخۇم، قوي مېيى، قورۇلغان ۋە قىيمىلىق
 تاماقلاردىن ھەمدە قېتىق، يېلىق، كالا گۆشىدەك سوغۇق ماي-
 لىق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

3. چىگەرەن مەنبەلىك ئۆت خالىتىسى يىگلەش

سەۋەبى: (1) چىگەرەننىڭ ئۆت سۈيۈقلۈقىنى ئىشلىشى
 ئاجىزلاشتىن بولىدۇ؛ (2) ئوت سۈيۈقلۈقىنىڭ ئۆت خالىتىسىغا
 بارىدىغان ئۆت نەيچىلىرىدە توسۇلۇش كۆرۈلۈپ ئۆت خالىتىسىغا
 سەپرا خىلىتىنىڭ كېلەلمەسلىكىدىن بولىدۇ؛ (3) ئۆت خال-
 تىسىدا تاش پەيدا بولۇپ قېلىشتىن ئۆت خالىتىسىنىڭ قىسقى-
 رىش، كېڭىيىش خىزمىتى سۈسلىشىش سەۋەبلىك ئۆت خال-
 تىسى يىگلەپ قۇرۇپ قېلىشنى پەيدا قىلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: چىگەرەننىڭ ئۆت سۈيۈقلۈقىنى ئىشلىشەش
 ئىقتىدارى ئاجىزلاشقان بولسا، چىگەرەننى قىزىتىش ئۈچۈن داۋا-
 ئىل كۆركەم، جاۋارش جالىنىۋس، ماددە تۇلھايات، جاۋارش
 ئەنەر بېرىش، تامىقىغا كەپتەر، كەكلىك گۆشلىرى، ياش
 ئەركەك قوينىڭ كاۋاپلىرىغا قارىمۇچ، زەنجىۋىل، قوۋزاق

جىگەر جىگەرلىكلىرىنى كۆرۈشۈرۈپ قىياپىتىدە داۋالاش

دارچىن، قاقىلە كاۋاۋچىن سېلىپ بېرىش لازىم.

جىگەر بىلەن ئۆت سۇيۇقلۇقى قويۇلۇشتىن بولغان يىگىلەشكە سىركەنجىۋىل بۇزۇرى ھارنى تاماقتىن بۇرۇن بېرىش تاماقتىن كېيىن ھەببى ئەفسەنتىن، مائۇل ئۇسۇل ھار، شارابى بۇزۇرى ھار بېرىلسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. ئۆتتىكى تاشنىڭ تەسىرىدىن يىگىلەش بولسا، ئۆت خالتىسىدىكى سۇيۇقلۇق قويۇقلىشىپ تاشتەك قاتتىقلىشىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ ئالامەتلىرىدە كۆڭلى تاماققا تارتىماسلىق، ئېغىزى داۋاملىق قۇرۇق، ئاچچىق بولۇش، كۆپ ئۇسساش، قورساق بوشلۇقىغا سۇ يىغىلىشىپ سۇلۇق ئىششىق پەيدا قىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى جىگەر خىزمىتىنىڭ ئاجىزلىشىش سەۋەبىدىن، جىگەردىكى ماددىلار تولۇق پىشماي ھاسىل بولغان غەيرىي سەپرانىڭ جىگەردە قېتىشما پەيدا قىلىشىدىن بولىدۇ. داۋالاشتا، ئۆتتە تاش پەيدا بولۇش كېسىملىگە ھەم جىگەرنى قۇۋۋەتلەشتە قوللىنىلغان چارلەر قىلىنسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سىركەنجىۋىل بۇزۇرى، سىركەنجىۋىل رەۋەن، شارابى بۇزۇرى، ھەببى مۇددىرات سەنگى بېرىلسە ياخشىدۇر.

تەسقىغا ئوقۇت، قوناق ئۇماچلىرىغا كەپتەر، كەكلىك، پاختەك گۆشلىرىنى ھەمدە سەۋزە، قارىمۇچ، زىرە، پىسىنىغە سېلىپ بېرىش ياخشىدۇر. تۇخۇم، جىگەر، تال، مايلىق گۆشلەردىن ھەمدە قوغۇن، شاپتۇل، ھۆل ئۈزۈمگە ئوخشاش سوغۇق ھەمدە يەللىك نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

4. جىگەر سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان تالغا قان ئۇيۇش كېسەللىكى

سەۋەبى: جىگەر مىزاجىنىڭ سوۋۇپ كېتىشى سەۋەبىدىن، جىگەردە سەۋدا خىلىتى كۆپ ئىشلىنىپ، تالغا كۆپ مىقداردا يىغىلىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى: تال ساھەسىدە چىققىلىش، چىرايى قارىداپ، ئېغىز، دىماغ قۇرۇپ، كۆپ خىيال قىلىدىغان، قالايمىقان سۆزلەيدىغان بولۇپ قالىدۇ. كۆپىنچە كېچىدە قىزىتما پەيدا بولىدۇ. قان تومۇرلار كۆيۈپ قالىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن تۇرۇپ سۈيى بىلەن سىركەندە جىۋىلىنى قوشۇپ ئىچۈرۈپ قۇستۇرۇلىدۇ. بۇ ئارقىلىق ئاشقازان بىلەن تال ئوتتۇرىسىدىكى توسالغۇ ئېچىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن جىگەر يىرىڭلىق ئىششىقىغا قوللىنىلغان دورىلار قوللىنىلسا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.

5. جىگەر سەۋەبىدىن بولغان تال چوڭىيىش كېسەللىكى

سەۋەبى: جىگەرنىڭ تال سۈيۈقلۈقىنى چىقىرىشنىڭ

جىگەر كېسەللىكىنىڭ ئۆزگىرىش ۋە تەبىئىيەتلىك داۋالاش
تۈۋەنلەپ كېتىشىدىن، تالدا سۇيۇقلۇق ئازلاپ كەتكەندىن
كېيىن، ئاشقازاندىكى گازنىڭ ئۆرلەپ تالغا قوشۇلۇپ قېلىشى-
دىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى: كېسەلنىڭ تال ساھەسىنى تۇتۇپ تەكشۈرگەندە،
ئورنى چوڭايغان ئەمما، تال ساھەسى بوش بولۇپ، بەزىدە كۆك
سۇ ياندۇرىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئاشقازاننى قىزىتىدىغان ھەم جىگەر
خىزمىتىنى كۈچەيتىدىغان دورىلارنى بېرىش لازىم. مەسىلەن
جاۋارش ئۇدشېرىن، شارابى تۇرۇنچى قاتارلىق قۇرۇق ئىسسىق
تەبىئەتلىك دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم. تامىقىغا
جىگەرنى قىزىتقۇچى ھەم يەل ھەيدىگۈچى تەبىئىي سەۋدا خىلىتى
پەيدا قىلغۇچى غىزالارنى بېرىش لازىم. مەسىلەن ئۈگرىگە
ئۆچكە گۆشى، پىدىگەن، كالىكەسەي، دانلىق پۇرچاقلاردىن
سېلىپ بېرىش لازىم.

6. دورا بىلەن زەھەرلىنىشتىن بولغان

جىگەر كېسەللىكى

سەۋەبى: ئۆتكۈر غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە بولغان پىلىپىل،
كاۋاۋىچىن، ئاقىرقەرھا، پارپىغا ئوخشاش دورىلارنى كۆپ ئىس-
تېمال قىلىشتىن، ئۇنىڭدىن باشقا جىگەر مىزاجىنىڭ ئەۋا-
لىغا قارىماي قالايمىقان دورا ئىستېمال قىلىش مەسىلىسى-
سىنىق

جىگەر كىشىلەر ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى سوغۇق مىزاج كىشىلەر ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى: ئىسسىق مىزاج كىشىلەر ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى ئىستېمال قىلغان بولسا، جىگەر ساھەسىدە ئاغرىش ئېچىشىش، كۆپ ئۇسشاش، تىلى قۇرۇپ ئېچىشىپ كېتىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. سوغۇق مىزاج كىشىلەر سوغۇق تەبىئەتلىك دورىلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن بولغان بولسا، جىگەر ساھەسىدە ئېغىرلىق ھەم تېلىپ ئاغرىش بىلەن باش چىڭقىلىپ پۈتۈن بەدەن تېلىپ ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: سەۋەبىگە قارىتا چارە قىلىنىدۇ. ئەگەر ياخشىسى سوغۇق دورىلار بىلەن زەھەرلەنگەن بولسا قاراجايغا رۇم بەدىيان، قارىمۇچ، شېكەر سېلىپ دەملەپ ئىسچۇرۇلىدۇ. سۈيدۈك ھەيدەش ئارقىلىق زەھەر تازىلىنىدۇ ۋە پەسەيتىلىدۇ. ئۆتكۈر غىدىقلىغۇچى دورىلار بىلەن زەھەرلەنگەن بولسا تۇخۇمى بالەنگۈ، تۇخۇمى كاسىن، تەرخەمەك ئۇرۇقلىرى دەملەپ ئىسچىشكە بېرىلسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئىسسىقلىق دورىلار بىلەن زەھەرلەنگەن بولسا سوغۇقلىق دورىلاردىن سېمىز ئوت ئۇرۇقى، يۇمغاقسۇت، ئەينۇلا، تۇخۇمى كاسىن، تەمرى ھىندى دەملەپ ئىسچىش بېرىش، دىنار شەرىپىتى، ئەرقى كاسىن بېرىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

7. چىگەر ئاجىزلىقتىن پەيدا بولغان

مېڭە كېسەللىكى

سەۋەبى: چىگەر خىزمىتىنىڭ ناچارلىقىدىن قان ئازلىق يۈز بېرىپ مېڭىگە قان يېتىشمەي مېڭە ئاغرىقىنى پەيدا قىلىدۇ. ئالامىتى: بەزىدە ھوشسىزلىنىپ يىقىلىپ يېتىپ قالىدۇ. غان ئەھۋاللار ھەمدە كۆپ گەپ خالىمايدىغان، بىردەم ئويلىنسا مېڭە ئاغرىپ كېتىدىغان ئالامەتلەر بىلەن بىرگە، كەيپىياتى بىراقلا ئۆرلەپ كۆپ سۆزلەيدىغان، سەۋەبىسىز كۈلىدىغان، سەۋەبىسىز خۇشاللىنىدىغان، بەزىدە ئەستە تۇتۇش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەپ، ئۇنتۇغاق بولۇپ قالىدىغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. بىمار ئۆزىنىڭ بەدىنىدە يۆتكىلىپ تۇرىدىغان ئېچىشىپ ئاغرىش بارلىقىنى، ئىچىنىڭ تىت تىت بولۇپ روھىي جەھەتتە جىددىيلىشىپ قالىدىغانلىقىدىن، بەدەنلىرىدە يەڭگىل سانجىق بارلىقىدىن شىكايەت قىلىدۇ. بۇ ئەھۋاللارنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى يەنە بىر سەۋەب چىگەردە ۋە چىگەرنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەردىلىرىگە ئورۇنلاشقان يەلدۇر. كېسەلدە كۆرۈلىدىغان يەنە بىر ئالامەت قول بارماقلىرىنى تۈزلىگەندە بارماقنىڭ تىترىگەنلىكى مەلۇم بولىدۇ. كېسەلدە يۇقىرىقىدىن باشقا يەنە قالايمىقان سۆزلەيدىغان، ئۆزىنى ئۇيان - بۇيان تاشلايدىغان، ئەتراپىدىكىلەرنى تونۇمايدىغان،

سورىغان سوئاللارغا قالايمىقان جاۋاب بېرىدىغان روھىي ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئاخىرقى دەۋرىگە كەلگەندە كېسەل پۈتۈنلەي ھوشىنى يوقىتىدۇ، چاقىرسا جاۋاب بەرمەيدۇ، نەپەس ئاستا، چوڭقۇر بولىدۇ. يۈرەك ھەرىكىتى بەزىدە ئاستا، بەزىدە تېز بولىدۇ. بۇلار مېڭىگە قان يېتىشمەسلىك ھەمدە قاننىڭ قويۇلۇپ توسالغۇ پەيدا قىلىشى بىلەن مېڭە توقۇلمىلىرىغا ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن مېڭە يىگىلەش دەۋرىگە ئۆتۈپ كېتىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: كېسەللىكنىڭ باشلانغۇچ دەۋرىدە بولسا، سەۋدانىڭ مونزىجىنى 15 كۈن بېرىش، غىزاسىغا ماددىنى پىشۇرۇش جەريانىدا توخۇ گۆشى شورپىسىغا نۇقۇت سېلىپ، پاقلان گۆشى، سەۋزە سېلىپ شويلا ياكى ئۇماچ ئېتىپ بېرىش لازىم. سەۋدا ماددىسى پىشقاندىن كېيىن مەتبۇخى ئەفتمۇن بىلەن لوغازىيا بېرىپ ماددىنى تازىلاش ئېلىپ بېرىش، ئۇنىڭدىن كېيىن سەۋدانىڭ غالىپلىق ئالامەتلىرى بولسا مۇپەررەھ ياقۇت، مۇپەررەھ قەلىب، جەۋھىرى رەيھان، مەجۇنى زەبىب، خېمىرى گاۋزىيان ئەننىرى، خېمىرى ئەۋرىشم بېرىش، تامىقىغا قايماق، تۇخۇم سېرىقنى سېرىق شېكەر بىلەن چاي قىلىپ بېرىش لازىم. ئەگەر سەپراغا ئائىت ئالامەتلەر كۆرۈلسە، مالد خولىيا مارقىغا قارىتا داۋالاش ئېلىپ بېرىش، بۇنىڭ ئۈچۈن مەتبۇخى سانائى مەككى، شارابى دىنار، مەجۇنى مىراقى، مەجۇنى راھەت، ئەرقى كاسىن، ئەرقى بېدە مىشكى بېرىش ياخشى.

8. جىگەر ۋە ئۆت تېشى كېسەللىكى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان غەيشى (بىھۇشلۇق) ، يۈرەك رىتمىسىزلىقى

سەۋەبى : جىگەردە ھاسىل بولغان قاننى جىگەرنىڭ يۈرەككە يوللاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەشكەندە قان ئازلىق ، قان سوۋۇپ قو- يۇلۇپ قېلىش ياكى يۈرەك دالانچىلىرىغا قان يېتىشمەسلىكتىن يۈرەك زەئىپلىشىش نەتىجىسىدە ، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى پەيدا بولۇشتىن ئايلىنىپ كېتىش كېلىپ چىقىدۇ . بۇ يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى دېيىلىدۇ . بۇنداق ۋاقىتتا يۈرەك ھەرىكىتى ئاستا ، رىتمىسىز بولىدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا ئۆت تېشى كېسەل- لىكى ، ئۆت ياللۇغلىرى سەۋەبىدىنمۇ يۈرەكتە قالايمىقان سوقۇش پەيدا بولىدۇ .

داۋالاش ئۇسۇلى : ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاش لازىم . سەۋەبىنى ئېنىقلاپ بولغاندىن كېيىن ، سەۋەبىگە قاراپ قان ئازلىقتىن بولسا قان تولۇقلاش ئۈچۈن شارابى زەپىمىب ، ئانار شەربەتلىرى ، تۇخۇم سېرىقى ، گۆش شورپىلىرى بېرىش ئار- قىلىق جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاش لازىم . قاننىڭ سوۋۇپ قويۇقلىشىشىدىن بولسا داۋا ئىشكى ھار ، شارابى ئەۋرىشىم ھار ، داۋا ئى دارچىن قاتارلىق قاننى قىزىتقۇچى دورىلار بېرىلسە

ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئەگەر يۈرەك دالانچىلىرىنىڭ قاننى قوبۇل قىلىشىنىڭ ياخشى بولماسلىقىدىن بولسا بۇ ئىككى خىل سەۋەبتىن بولىدۇ. بىرىنچىسى، رېماتىزم خاراكتېرلىك يۈرەك كىلاپانلىرىنىڭ ئېچىلىشىنىڭ تولۇق بولماسلىقىدىن بولىدۇ. ئىككىنچىسى، يۈرەكنىڭ قىسقىرىش كېڭىيىش كۈچىنىڭ زەئىپلىشىشىدىن بولىدۇ. بۇنى داۋالاشتا رېماتىزمغا قارىتا داۋالاش ئېلىپ بېرىش لازىم. ئوزۇقلۇق جەھەتتە گۈلچەنت ھەسلى، ئالما شەرىپىتىگە پىننە گۈلچەنتىنى ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش، مۇرەككەپ دورىلاردىن داۋالى مىشكى مۆتىدىل، خېمىرى مەرۋايىت، مۇپەرىھە ياقۇت، مەجۈنى ئۆشپە، تەرياقى پارۇق، شارابى ھورمەل بېرىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئەگەر يۈرەك رېتىمىسىزلىقى پەيدا بولسا ھەببى تەرياق، مەجۈنى سوم، خېمىرى گاۋزىبانلارنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بېرىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

سوغۇقلۇق، يەللىك غىزالاردىن ھەمدە مايلىق غىزالاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. ئۆزى سىڭىشلىك، ياخشى قان پەيدا قىلىدىغان كەپتەر، ياش توخۇ شورپىلىرى بېرىش مۇۋاپىقتۇر.

9. جىگەر خىزمىتىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن

پەيدا بولغان ئاقكېسەل

سەۋەبى: جىگەرنىڭ بەلغەم خىلىتىنى مېڭە، ئۆپكە ۋە بەزلەرگە يوللاش خىزمىتىنىڭ ناچارلىشىشىدىن غەيرىي بەلغەم خىلىتلىرى قان تەركىبىگە ئارىلىشىپ قان ئارقىلىق تېرە

توقۇلما بوشلۇقلىرىغا سىرغىپ چىقىپ تېرە ئۈستىدە ئاق داغلارنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ بەھەق سەيلە (ئاقكېسەل) ، بەھەق سىياھ (بۇ خىلدا مويلار ئاقىرىپ ماڭىدۇ) لارغا بۆلۈنىدۇ. ئاق بەھەق تېرە بىلەن ئەت ئوتتۇرىسىدا شىلىمىشىق ئاق سۇيۇق-لۇقنىڭ پەيدا بولغىنىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنى قولدا باسساقان كېلىدۇ. بۇ ئاسان ئوڭشىلىدۇ. باسسا قىزارمىسا، يىمىڭنىە سانجىسا قان كەلمىسە بۇ پەرەس دېيىلىدۇ.

ئالامىتى: قانغا غەيرىي بەلغەم ئارىلاشقان بولسا، كېسەل-نىڭ بەدىنى سېمىز، رەڭگى قىزىل، ئەمما تېرىلىرىدە ئاق داغلار پەيدا بولغان بولىدۇ، ئەگەر كېسەلنىڭ مىزاجى ئەسلى سەپرا تەرەپتە بولغان بولسا بەدەن ئورۇق، رەڭگى سېرىق بولغان بولسىمۇ، ئاق داغلار بەدەندە پەيدا بولىدۇ. بۇ سەپراغا غەيرىي بەلغەم ئارىلاشقان ئاقكېسەل دەپ ئاتىلىدۇ. بەلغەمگە غەيرىي بەلغەمنىڭ ئارىلىشىشىدىن بولغان ئاقكېسەللىكتە بولسا كېسەلنىڭ بەدەن رەڭگى ئاق، سېمىز، سوغۇق بولغان بولىدۇ. ئەگەر سەۋداغا بەلغەم ئارىلاشقان بولسا كېسەلنىڭ بەدەن رەڭگى چەيزرەڭ، ئورۇق، سوغۇق بولۇش بىلەن بىرگە بەدەندە ئاق داغ پەيدا بولىدۇ.

داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن كېسەلنىڭ خاراكتېرىنى ئېنىق ئايرىپ قانغا غەيرىي بەلغەم ئارىلاشقان بولسا بەلغەمنىڭ موزىجىنى بېرىپ ئۇنىڭدىن كېيىن سۈرگە بېرىش ئارقىلىق بەدەننى تازىلاپ قاننى جانلاندۇرغۇچى ماددە تۈلھايات، مەجۈنى ئات-رىلال، مەجۈنى ھوماما، ئىتىرىفىل ھامان قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. تامىقىغا ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەنت، پىننە گۈلقەنت،

نان بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كەپتەر، قۇشقاچ گۆشلىرىنىڭ كاۋاپلىرى بېرىلىدۇ. قۇرۇق يېمىشلىرىدىن قۇرۇق ئۈزۈم، ياڭاق مېغىزى بېرىلسە بولىدۇ.

سەپراغا غەيرىي بەلغەمنىڭ ئارىلىشىشىدىن بولسا بەلغەم بىلەن سەپرانىڭ موزىجىنى 9 كۈن بېرىپ ئۇنىڭدىن كېيىن بەلغەمنى سۈرۈشكە مەجۇنى بايادتۇس بېرىش، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىترىفىل كەبىر، نار پىننە شەرىپتى، شارابى ئوتروچ بېرىش ھەسەل بىلەن تەييارلانغان ئەنجۈر مۇرايىياسى، بېھى مۇرايىياسى مۇۋاپىق كېلىدۇ. ئەگەر سەۋداغا غەيرىي بەلغەمنىڭ ئارىلىشىشىدىن بولسا بەلغەم بىلەن سەۋدانىڭ موزىجىنى بېرىپ ماددا پىشقاندىن كېيىن مەتبۇخى ئەفتمۇن بىلەن ئايارەج پەيىقىمىرا ياكى ئايارەج لوغانزىيا بېرىپ غەيرىي بەلغەمنى سۈرۈپ تومۇرنى پاكلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن قاننى كۆپەيتىش، قاننى قىزىتىش ئۈچۈن ئەۋرىشىم شەرىپتى، شارابى زەبىب، رەيھان شەرىپتى، ماددەتۇلھايات، ئىترىفىل جا-لىنۇس، ھالۋائى بەيزە، لوپۇبى كەبىر بېرىش، تامىقىغا ياش مالىنىڭ گۆشلىرىنى كاۋاپ قىلىپ بېرىش ھەمدە شورپا قىلىپ بېرىش، ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى بېرىش لازىم. قاننى قىزىتقۇچى، قاننى كۆپەيتكۈچى ئوزۇقلۇقلار مۇۋاپىق كېلىدۇ. مۈرەككەپ دورىلاردىن شارابى زەبىب، ئانار شەرىپتى، رەيھان شەرىپتى، شارابى بۇزۇرى ھارنى كېسەلنىڭ مىزاجى ھەمدە كېسەلنىڭ تەبىئىتىگە قاراپ تاماقتىن بۇرۇن ئىچىشكە بۇيرۇش، تاماقتىن كېيىن ئىستېمال قىلىش ئۈچۈن ئايارەج لوغانزىيا، ئايارەج بايادىدۇس، مەجۇنى پەرفىيۇن، مەجۇنى ھەببى نىل،

چىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان داۋالاش
 مەجۇنى سوقرات، مەجۇنى تۇربۇت، جاۋارش جالىمىنۇس،
 شارابى نانخا، سىركەنجىۋىل بۇزۇرى ھار، شارابى مائۇل
 ئۇسۇل، شارابى مائۇل ھەسەل، مەجۇنى ئەفتمۇن، ئىترىفىل
 ئۇستقۇددۇس، داۋائى ھىندى، ماددە تۇلھايات، مەجۇنى بەرەس،
 ھەببى ئىستەمخۇن، ھەببى ئىبنى ھار، ھەببى ئەنزەل،
 ھەببى مەنتىن، ھەببى پەرفىيۇن، ھەببى سائىئى مەككى،
 ھەببى غارىقۇن قاتارلىق دورىلار كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ بىر-
 بىرىگە بولىدۇ. سىرتتىن ياغلاشقا پەرفىيۇن يېغى، سىيادان
 يېغى، تۇخۇم سېرىقى يېغى، نۆشۈدۈر مەلھىمى قاتارلىقلار
 كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ بېرىلىشى لازىم. ئاپتاپقا قاقلىنىش
 كۆپ جىسمانىي ھەرىكەت قىلىش پايدىلىق.

10. چىگەر كېسەللىكى سەۋەبىدىن پەيدا بولغان دىئابت كېسەللىكى

سەۋەبى: چىگەرنىڭ ماسارىقا تومۇرى توسالغۇغا ئۇچىراش
 سەۋەبىدىن ئوزۇقلۇق ماددىلار چىگەرگە كىرەلمەي، ئوزۇقلۇق
 بىلەن كەلگەن سۇيۇقلۇق بۆرەككە يەتكۈزۈلۈش بىلەن چىگەردە
 سۈمۈرۈلمىگەن قەنتنىڭ سۈيۈك بىلەن چىقىپ كېتىشى ئار-
 قىلىق كۆپ ئۇسساشنى پەيدا قىلىدۇ.

ئالامىتى: ئېغىز قۇرۇش، كۆپ ئۇسساش، سۈنى كۆپ
 ئىچىش، سۈيۈك كۆپىيىش، كۆپ يېمىش، بەدەن كۈندىن-
 كۈنگە ئورۇقلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ ھەمدە كۆز خىرەلىشىش،

بەل ، ئىككى يوتا ھەم پۈتۈن بەدەن تېلىپ ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ .

داۋالاش ئۇسۇلى : سوفۇپى زىياپىت ، قۇرسى زىياپىت ، ئاچچىق ئانار ، بېھى ، غورا ، تەمرى ھىندى سۇلىرىنى بېرىش ئارقىلىق چىگەرنىڭ سۈمۈرۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ ، چىگەر بىلەن ماسارىقا ئوتتۇرىسىدىكى توسالغۇلارنى ئېچىپ ، ئۇسسۇز-لۇقنى پەسەيتىش ، ئۇسسۇزلۇق پەسەيگەندىن كېيىن ماددەتۈل-ھايات ، مەجۇنى مەسھى ، مەجۇنى مەسەيرىتۇس ، ئىتىرىغىل جالىنىۇس ، بەرشىشا ، مەجۇنى كۈندۈر ، خېمىرى ئەۋرىشىم ، ئامىلە نۇشدارى قاتارلىق دورىلارنى تاللاپ ئىشلىتىش لازىم . بەزىدە ھەببى ئىمساكىمۇ بېرىلسە بولىدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا ئۇس-سۇزلۇقنى پەسەيتىش ئۈچۈن سېمىز ئوت ئۇرۇقى 30 گرام ، شاقاقۇل ، قىزىلگۈل ، پوستى تۇرۇنجى ، يوپقا زەنجىۋىل ھەر-بىرى 10 گرامدىن ئېلىپ دەملەپ بېرىلىدۇ . ئېغىزدا شۈمۈشكە تەمرى ھىندى ، قارىئۇرۇك بېرىلسە تەشنىلىقنى پەسەيتىدۇ .

تامىقىغا چىگەر ، بۆرەكنى كاۋاپ قىلىپ بېرىش ، قوي گۆشىنى پالەك ، سېمىز ئوت ، قاپاق قوشۇپ پىشۇرۇپ بېرىش ، ئارپا ئېشى قىلىپ بەرسىمۇ بولىدۇ . نېنىغا كېپىكى ئايرىلمى-غان ئۇندا ياققان نان بېرىش ، ئۇسسۇزلۇق پەسەيگەندىن كېيىن سۈيىۋىكىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن قوي گۆشىگە نوقۇت ، زەنجىۋىل ، قاقىلە ، يۇمىغاقسۇت ئۇرۇقى ياكى كۆكنى ئاز مىقداردا ئارىلاش-تۇرۇپ بەرسە بولىدۇ . ئۇسسۇزلۇق ھەم سۈيىۋىك نورماللاشقاندىن كېيىن تۇخۇم ، ياغاچ ، قوي گۆشىنىڭ زىخ كاۋاپلىرى بېرىلسە بولىدۇ .

چىڭگەن كىيىملىكلىرىنى ئۆزگەرتىپ قىياپىتىنى داۋالاش
 پەرھىزى: بەك ئىسسىق جايدا تۇرۇشتىن، قىزىق تاماق،
 قىزىق چاي ئىچىشتىن، كۆپ ئۇخلاش، سوغۇقتا توڭلاشتىن،
 جىنسىي مۇناسىۋەتتىن، كۆپ سۆزلەشتىن ساقلىنىش، ئاچ-
 چىقلانماسلىق كېرەك.

جىگەر كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ئۇسۇللىرى

يۇقىرىدا ھەربىر كېسەللىك قىسمىدا بىر قاتار داۋالاش ئۇسۇللىرى بايان قىلىپ ئۆتۈلدى، تۆۋەندە ئورتاقلىققا ئىگە بولغان بىر يۈرۈش داۋالاش تەرتىپى توغرىسىدىكى كۆز قاراشلىرىمىزنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز.

1. روھىي جەھەتتىن داۋالاش

ھەممىمىزگە مەلۇمكى، روھىي جەھەتتىن داۋالاش كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇ ئىككى خۇسۇسىيەتكە ئىگە. بىرىنچى، كېسەللەردە ساقىيىش ئىشەنچىسىنى پەيدا قىلىش ئارقىلىق نېرۋا سىستېمىسىنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ ئىككىنچى، خاتىرجەملىك، ئۈمىدۋارلىق روھىي ھايۋاننى كۈچەيتكۈچى بولغاچقا، بەدەننىڭ تەبىئىي ھارارىتىنى كۈچەيتىپ، جىگەرنىڭ ماددا ئالمىشىش ۋە خىلىتەلارنىڭ ھاسىل بولۇش، بەدەننى ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. شۇڭلاشقا، جىگەر كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغۇچىلارنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى ۋە تېبابىتى داۋالاش
ساقىيىپ كېتىش ئىشەنچىسىگە ئىگە قىلىش لازىم.

2. ئوزۇقلۇق بىلەن داۋالاش

جىگەر كېسەللىكلىرى قان، سەپرا، بەلغەم، سەۋدا خىمىيەلىكلىرىنىڭ غەيرىي ئۆزگىرىشىدىن، يەلدىن ۋە يۇقۇشتىن بولغان غەيرىي تىپلىق دەپ ئالتە تۈرگە ئايرىلغاچقا، ھەر قايسى تىپتىكى كېسەللىكلەرگە مۇۋاپىق ئوزۇقلۇق بەلگىلەش داۋالاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. مەسىلەن قاندىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە گۈرۈچ بىلەن قارىئورۇك، تۇرۇپ، كۆك يۇمىغاقسۇت سېلىنغان قۇرۇق سوغۇق تەبىئەتلىك ئوزۇقلۇق بېرىش، سەپرادىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئارپا ئېشىغا پالەك، چۆچە گۆشى ياكى ئەينۇلا، غورا سېلىنغان ئاش بېرىش؛ بەلغەمدىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە نوقۇت، ئۇچار قانات گۆشلىرى بىلەن نوقۇت ئېشى قىلىپ بېرىش، سەۋزە، سامساق، كەرەپشە، ياش قوي گۆشى بىلەن دارچىن، زىرە، قارىمۇچ سېلىپ شورپا بېرىش؛ سەۋدادىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە ياش پاقىلان گۆشىنى سەۋزە بىلەن شورپا قىلىپ بېرىش ياكى ئۇماچ ئېتىپ بېرىش، ئاساسەن ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك ئوزۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش؛ يەلدىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە بەلغەمدىن ھەم سەۋدادىن بولغان كېسەللەرگە بېرىلگەن غىزالارنى تەڭ شەپ بېرىش؛ يۇقۇملانغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە دەسلەپتە يەڭگىل، ئاسان سىڭىدىغان غىزالارنى بېرىش،

كېيىن كېسەللىك مىزاجىغا قاراپ ئوزۇقلۇق بەلگىلىنىدۇ، بەدەننى كۈچەيتىش تەدبىرلىرى قوللىنىلىدۇ. يۇقۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، جىگەر كېسەللىكلىرى بار ئۆيدە سامساق، ئىگىر، موزا قاتارلىقلارنى ئۈزۈم سىركىسىگە چىلاپ قويۇپ، غىزالىرىغا ئاز ئازدىن قويۇپ ئىستېمال قىلىش ھەم پۇراپ تۇرۇش لازىم.

3. دەم ئالدۇرۇش ۋە ھەرىكەت قىلدۇرۇش

ئارقىلىق داۋالاش

كۆپرەك دەم ئېلىشقا بۇيرۇلىدىغان جىگەر كېسەللىكلىرى قان ۋە سەپرادىن بولغانلىرى، بەدەن تېمپېراتۇرىسى يۇقىرىلار، بەلغەم، سەۋدادىن بەدەن بەك ئاجىزلاپ كەتكەنلەر دەم ئېلىشقا بۇيرۇلىدۇ، بەلغەم، سەۋدادىن ھەم يەلدىن بولغان بەدەن زەئىپ-لەشمىگەن كېسەللەرنى نورمال جىسمانىي ھەرىكەت قىلدۇرۇش پايدىلىق. ھەرىكەت ئارقىلىق قان قىزسا، جىگەر ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشقا پايدىلىق.

4. دورا بىلەن داۋالاش

قان بېسىمىدىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە سوغۇق-لۇق دورىلارنى بېرىش ئارقىلىق جىگەرنى سوۋۇتۇپ، داۋالاش پرىنسىپىنى قوللىنىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. بەلغەم،

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش قىياپىتىدە داۋالاش
سەۋدا، يەلدىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە قارىتا
قاننى قىزىتقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، جىگەر ھا-
رارىتىنى ئاشۇرۇپ داۋالاش ئېلىپ بېرىش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

5. قوشۇمچە داۋالاش ئۇسۇللىرى

- (1) سىركە پۇرىتىش، بۇرۇنغا، كۆزگە تامدۇرۇش؛
- (2) داسقا سۇ ئېلىپ سۇغا قارىتىپ داۋالاش؛
- (3) بېلىققا قارىتىپ ئولتۇرغۇزۇش؛
- (4) سوغۇقتىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىمپار،
زەپەر، ئەتىرگۈل، خولىنجان پۇرىتىش.

جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان يەككە ۋە مۇرەككەپ دورىلار

جىگەردە پەيدا بولىدىغان ھەرقايسى كېسەللىكلەر ماددىلارنىڭ غەيرىي ئۆزگىرىشى سەۋەبىدىن بولغاچقا، ماددىلارنى پىشۇرغۇچى، سۈرگۈچى، تەڭشىگۈچى، قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بېرىشكە توغرا كېلىدۇ.

1. پىشۇرغۇچى دورىلار (مۇنزىج)

پىشۇرغۇچى دېگەنلىك خىلىتلارنىڭ قويۇق يەنى بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتىدىن قاننىڭ قويۇلۇپ قالغان قىسمىنى سۈۋۈتۈش، غەيرىي سەپرا ۋە سۈيۈق بەلغەمنىڭ سۈيۈق قىسمىنى مۇنزىج ئارقىلىق يوقىتىپ قويۇق تەرەپكە مايىلاشتۇرۇش ئارقىلىق، خىلىتلارنىڭ قىيامىنى تەڭشەشنى كۆرسىتىدۇ. قان خىلىتىدىن بولغان كېسەللەرگە نىسبەتەن قان ئېلىش چارىسى قوللىنىلىدۇ. ئۇندىن باشقا، ئارىلاشقان خىلىتىغا قاراپ قانغا سەپرا ئارىلاشقان بولسا بەلغەمنىڭ، سەۋدا ئارىلاشقان بولسا، سەۋدانىڭ مۇنزىج ۋە مۇسەپپىلىرىنى بېرىپ ماددىلارنى پىشۇرۇش، سۈرۈش ئارقىلىق يەنە تازىلىنىدۇ.

2. نورمالسىز سەپرانى پىشۇرغۇچى دورىلار

چىلان يەتتە دانە، گۈل بىنەپشە، نېلۇپەر، شاھتەررە ھەربىرى 7 گرامدىن، تۇخۇمى كاسىن، بىخ كاسىن ھەربىرى 10 گرامدىن، قىزىلگۈل 5 گرام، تەرەنجىۋىل 100 گرام، دورىلارنى چالا سوقۇپ 1.5 كىلوگرام سوغۇق سۇغا بىر سوتكا چىلاپ ئۇندىن كېيىن 1 كىلو قالغۇچە قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيىگە تەرەنجىۋىل سېلىپ 2 سائەت تۇرغۇزۇپ پاكىز سۈزۈپ تەييارلىنىپ، كۈندە ئۈچ ۋاخ تاماقتىن بۇرۇن 70 گرامدىن، ئەگەر 5 كۈندە ماددىسى پىششىق سەپراغا ئارىلاشقان خىلىتىنى كۆزدە تۇتۇپ يەنە قايتا ماددىسى پىششىقچە بېرىلىدۇ. كېسەلنىڭ تەبىئىيىتى بەك قۇرۇق ئىسسىق بولسا دورىلارنى قايناتماي قايناق سۇغا چىلاپ يەنى دەملەپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

3. سەپرا خىلىتىنىڭ سۈرگۈسى (مۇسھىل)

سېرىق ھېلىلە پوستى، تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىل، بىنەپشە، ئەمەن، مەھمۇدە، ھەشقىپچەك، ئەينۇلا، شاھتەررە، سەبەرە سۇقۇتىرى، قىزىلگۈل قاتارلىقلار. بۇلاردىن بەزىلىرى تەسىر جەھەتتە كۈچلۈك، بەزىلىرىنىڭ تەسىرى ئاجىز بولۇپ، ئۇلاردىن قايسى بىرىنى يالپۇز ياكى بىر قانچە دورىنى

بىرلەشتۈرۈپ، كېسەلنىڭ بەدەن قۇۋۋىتى ئېھتىياجىغا مۇۋاپىق بېرىلىدۇ. مەھمۇدەنى پىشۇرۇپ بېرىشكە بولمايدۇ.

4. مۇرەككەپ سەپرا مۇسھىلى

سېرىق ھېلىلە پوستى 12 گرام، ئەينۇلا 5 دانە، سەرپىستان 20 دانە، شاھتەررە، سانايى مەككى ھەرىسىرى 10 گرامدىن، چىلان 9 دانە، تۇخۇمى كاسىن 7 گرام، سېرىق ئوت ئۇرۇقى 5 گرام، تەرەنجىۋىل 36 گرام، قىزىلگۈل، بادام يېغى 3 گرامدىن دورىلارنى ئۆلچەم بويىچە ئېلىپ 250. 1 كىلو سۇغا 8 سائەت چىلاپ ئۇنىڭدىن كېيىن 750 گرام قالغۇچە قاينىتىپ سۈزۈپ تەييارلاپ، كۈندە چۈش، كەچ تاماقتىن بۇرۇن 150 گرامدىن 3 كۈن ئىچىلىدۇ.

5. غەيرىي بەلغەم خىلىتىنى پىشۇرغۇچى

دورىلار

ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 13 دانە، ئارپىبەدىيان 7 گرام، رۇم بەدىيان 3 گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى پوستى 30 گرام، خوخا 5. 7 گرام، پىرسىياۋشان 18 گرام، ئەنجۈر مونكى 5 دانە، قىزىلگۈل 10 گرام، دورىلار قائىدە بويىچە يۇقىرىقىدەك تەييارلىنىدۇ. ئاخىرىدا گۈلقەنت ھەسلىدىن 50 گرام سېلىپ ئۈچ كۈن

ئىچىلىدۇ. مۇشۇ بويىچە ئۈچ قېتىم بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئوزۇقلۇق جەھەتتە نوقۇت سۈيى بەلغەم سەۋدات خىلىتلىرىنى پىشۇرۇشتا ناھايىتى ياخشى. ئەمما كېسەلدە يۈ-قىرى قىزىتما بولسا بېرىشكە بولمايدۇ.

6. غەيرىي بەلغەمنى سۈرگۈچى دورىلار

سەبرى سۇقۇتىرى، ئاق تۇربۇت، ھەشقىپچەك ئۇرۇقى ھەر بىرى 9 گرامدىن، غارىقۇن، روم بەدىيان ھەر بىرى 2.5 گرامدىن، ئاچچىقتاۋۇز، نەمەك ھىندى ھەر بىرى 12 گرامدىن تەييارلاپ ھەممە دورىلارنى سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، بەدىيان سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ، نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلاپ ياشلارغا بىر دانىدىن كۈندە ئۈچ ۋاخ، قېرىلارغا ئۈچتىن بەش دانىغىچە بېرىلىدۇ.

غەيرىي بەلغەمنىڭ يەڭگىل سۈرگىسى: سەپرا سەۋداغا ئارد-لاشقان بەلغەمنى سۈرگۈچى چىلان، سەرىپىستان ھەر بىرى 20 دانىدىن، قۇرۇق زۇپا، پىرسىياۋشان، ئارپا بىلەن رۇم بەدىيان ھەر بىرى 10 گرامدىن، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 45 گرام، ئەنجۈر مۈنكى يەتتە دانە، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى پوستى 15 گرام، خىيار شەنبەر، گۈلقەنت، تەرەنجىۋىل ھەر بىرى 45 گرامدىن قائىدە

بويىچە تەييارلاپ، ئۈچ كۈن تاماقتىن بۇرۇن 100 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

7. غەيرىي سەۋدا خىلىتىنىڭ پىشۇرغۇچىسى

سەرپىستان، چىلان ھەر بىرى 21 دانىدىن، گاۋزبان يەتتە گرام، بادىرنەجى بۇيا، ئۈستقۇددۇس، پىرسىياۋشان، ئارپىبە-دىيان، شاھتەررە ھەر بىرى 7 گرامدىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 10 گرام، تەرنەنجىۋىل ياكى گۈلقەنت 100 گرام قائىدە بويىچە تەييارلىنىپ، مۇشۇ بويىچە ئۈچ كۈندە بەش قېتىمدىن 15 كۈن بېرىلىدۇ. بۇ غەيرىي سەۋداغا مۇۋاپىق، ئەگەر كۆيگەن سەپرا، بەلغەم، سەۋدانىڭ غەيرىي قىسىملىرى ئارىلاشقان بولسا، خىلىت ئېتىبارى بىلەن دورا قوشۇلسا بولىدۇ. مەسىلەن كۆيگەن سەپرا بولسا تۇخۇمى كاسىن، كۆيگەن بەلغەم بولسا رۇم بەدىيان بىلەن غارىقۇن، كۆيگەن سەۋدا بولسا كۈنجۈت بىلەن كامادىريوس قوشۇپ تەييارلاپ بېرىلىدۇ. مۇنزىج مۇسھىل بېرىشتە كېسەلنىڭ ماددىلىق ياكى ماددىسىز ئىكەنلىكىنى ئايرىپ، ماددىلىق كېسەللەرگە بېرىش لازىم. ماددىسى پىشماي تۇرۇپ، سۈرگە بېرىشكە بولمايدۇ. ماددا پىشقانلىقىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە ئاندىن مۇسھىل بېرىش لازىم.

ۋاقتى جەھەتتە: كېسەل تەگكەن كۈندىن باشلاپ ھېسابلىغاندا سەپرا ئۈچ كۈندىن بەش كۈنگىچە، بەلغەم يەتتە كۈندىن توققۇز كۈنگىچە، سەۋدا 15 كۈندىن 41 كۈنگىچە پىشىدۇ دەپ

قارىلىدۇ. شۇ ۋاقىت ئىچىدە مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ماددا پىششىق موزىجىنى يەنە بېرىش، مۇسھىلنى بىر كۈندىن ئۈچ كۈنگىچە بېرىش لازىم. بۇلارنى بېرىشتە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قارىلىدۇ.

ماددىسى پىشقانلىقىنىڭ ئۆلچىمى: شۇ خىلىت ئۆزگىرىدىشىدىن مىزاجلارنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى بەلگە ۋە ئالامەتلەرنىڭ 80% نىڭ نورماللىشىشى ماددا پىشقانلىقىنىڭ ئالامىتىدۇر. مەسىلەن: بەدىنىدە بەلغەم خىلىتى ئېشىپ كەتكەن بولسا خىلىتنىڭ ئۆزگىرىشى بەش تۈرلۈك، مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشى 10 تۈرلۈك بولىدۇ. يەنى رەڭگىروينىڭ ئاق بولۇشى، تىلىمىدا ئاق گەزنىڭ قېلىن بولۇشى، ئۇيقۇنىڭ كۆپ بولۇشى، ئۈنتۈ-غاقلىق، قورساق ئېسىلىش، زەردە قايناش، بەدەن يۇمشاق، سوغۇق بولۇش، باش قېيىش، يۆتەل ھەم ھۆ بولۇش، ئېغىز زىدىن شال، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش، ئېغىز تەمى تۈزلۈك، بەدەن بولۇش، بەدەن كۆپۈشۈپ قېلىش قاتارلىقلار ياخشىلىنىپ نورماللىشىشقا يۈزلەنگەن بولسا ماددا پىشقان بولىدۇ.

8. چىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان

يەككە ۋە مۇرەككەپ دورىلار

ئىسسىقلىقتىن يەنى قان سەپرادىن بولغان چىگەر كېسەللىكلىرىگە بىخ كاسىن، تۇخۇمى كاسىن، قىزىلگۈل، زىخ، ئىت ئۈزۈمى، سېمىز ئوت، تەرخەمەك ئۇرۇقى، ئالقات،

قارىتۇرۇك، ئەينۇلا، تەمرى ھىندى، ئامۇت، بىيە،
سەندەل، تاباشىر، كاپۇر، سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە،
ئامىلە مۇقەششەر، ئاچچىق ئانار، لىمون، تاۋۇز، ئارپا، ئاق
لەيلى ئۇرۇقى، ئىسپىغۇل، قىمقۇ، پالەك، كىشىمىش
ئۈزۈم، ئۈزۈم، سىركە قاتارلىق تەبىئىي ھۆل سوغۇق ۋە قۇ-
رۇق سوغۇق دورىلار بېرىلىدۇ.

مۇرەككەپ دورىلاردىن: سىركەنجىشۇل ساددە، بېيى
شەرىپتى، ئەينۇلا مۇرابباسى، ئەينۇلا، تۈرۈنجى، ئامۇت،
دىنار شەرىپەتلىرى، قۇرسى زىرىشكە، قۇرسى كاپۇر، جاۋارش
تاباشىر، ئىرقى كاسىن، ئىرقى شوخلا، ئىرقى شاھتەررە قا-
تارلىقلار بېرىلىدۇ.

9. جىگەرنىڭ سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلە-

رىگە بۇيرۇلىدىغان دورىلار

يەككە دورىلار: زەپەر، سۇمبۇل، ئىسزخىس، قوۋزاق
دارچىن، زىرە، پىننە، يالپۇز، ئۈزۈم، جوز، كاۋاۋىچىن،
جىنتىيانا، رۇم بەدىيان، ئارپىبەدىيان، ئەمەن، سېرىق ئوت،
كەرەپشە ئورۇقى، رەۋەن، غاپەس، سوزاپ، ياقۇت، ئەنەبەر،
ئىپار، زەنجىۋىل، بىخ كەبىر قاتارلىق قۇرۇق ئىسسىق ۋە ھۆل
ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلار بېرىلىدۇ.

مۇرەككەپ دورىلار: مەجۇنى ئەمرۇسىيا، ئاسان سىپاكېر،
ئامىلە نۇشدارى، تەرياقى پارۇق، بايادىدۇس، ئايارەج لوغا

نەزىيا، داۋائىل كۆركەم، داۋائىل كىبرىت، داۋائى
جىنتىيانا، جاۋارش جالىنۇس، جاۋارش ئەنەبەر، مەجۈنى
سوم، تەرياقى ئەربەئە، جاۋارش شەھرىيان، جاۋارش نارەش
كى، مەجۈنى مىشكى، ماددەتۈلھايات، جاۋارش نانخا، جاۋا-
رش دارچىن، شارابى بۇزۇرى ھار، سىركەنجىۋىل بۇزۇرى،
سىركەنجىۋىل رەۋەن، سىركەنجىۋىل ئەنسىلى، سىركەنجىۋىل
ئەفتىمۇن، شارابى ئەفسەتتىن، شارابى ئەۋرىشىم، قۇرسى
سۈمبۇل، قۇرسى رەۋەن، قۇرسى ئەنسىيۇن، ھەببى غاپەس،
ھەببى رەۋەن، ھەببى ئەنەبەر، ھەببى سەبەر، ھەببى
غارىقۇن، ھەببى لوك، ئەرقى پودىنە، ئەرقى بەدىيان، ئەرقى
زەپران، ئەرقى سۈمبۇل، مۇرەككەپ ئەرقى زەبىب
قاتارلىقلاردۇر.

10. چىگەرەكچىلەك مۆتىدىل دورىلىرى

مەجۈنى دەپىدلىۋەرد، سىركەنجىۋىل بۇزۇرى مۆتىدىل،
شەرىپىتى فەۋاكى، نار پىننە، قىزىلگۈل، شارابى ئوتروچ قا-
تارلىقلاردۇر.

جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىپ ئەمەلىي ئۈنۈم بەرگەن بىر قىسىم دورا نۇسخىلىرى

1 - نۇسخا ئابى فەۋاكى (مېۋىلەر سۈيى)

تەركىبى: ئەينۇلا، چىلان، سەرپىستان، قارىئۆرۈك، ھەر-
بىرى 30 دانىدىن، بېھى، ئالما، ئاچچىق ۋە تاتلىق ئانار ھەر بىرى
ئۈچ دانىدىن، تەمىرى ھىندى 30 گرام، غۇنچە ئۈزۈم 250 گرام،
قەنت 360 گرام.

تەييارلىنىشى: مېۋىلەرنى پاكىز يۇيۇپ، قۇرۇقلىرىنى تى-
تىپ، ھۆللىرىنى ئېزىپ مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇغا سەككىز-
سائەت چىلاپ، ئۇنىڭدىن كېيىن قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيىگە
قەنتنى سېلىپ قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقىنى بولغان بارلىق كېسەل-
لىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە چۈشتە ۋە كەچتە تاماقتىن
بۇرۇن 30 گرامدىن 75 گرامغىچە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ
بېرىلىدۇ.

2 - نۇسخا ئايارەنج لوغانزىيا

تەركىبى : ئاچچىقتاۋۇز (شەھمە ئەنزەل) ، تاغ پىيىزى (ئەندىسىل) ، غارىقۇن ، سوقمۇنىيا ، خەربەق سىياھ ، ئوشەق ، ئوسقوردىيۇن ھەر بىرى 16 گرامدىن ئەفتمۇن ، كاماردىيۇس ، مۇقەل ، سەبرە سۇقۇترى ھەر بىرى 10 گرامدىن ، يالپۇز ، سازەنج ھىندى ، كۈدە ئۇرۇقى ، جۇندە ، قارىمۇچ ، ئاقمۇچ ، ھۇپارىقون ، پىلىپىل ، زەپەر ، دارچىن ، بىستىپايەج ، سەككىنەج ، جاۋاشىر ، قۇندۇز قەھرى ، مۇرمەككى ، پىتىرسالىيۇن ، زىراۋەندە ، ئەفسەندىتىن ، پەرفىيۇن ، ھوماما ، سۇمبۇل ، زەنجىۋىل ھەر بىرى 6 گرامدىن ، جىنتىيانا ، ئۇستقۇددۇس ھەر بىرى 3 گرامدىن ، ھەسەل پۈتۈن دورىلار مىقدارىدا ئۈچ ھەسسە .

تەييارلىنىشى : دورىلارنى ئوبدان سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلاپ 40 كۈندىن كېيىن ، بولسا ئالتە ئايدىن كېيىن ، ئىستېمال قىلىنسا ياخشى .

تەبىئىتى : قۇرۇق ئىسسىق .

تەسىرى : بەدەندىكى بارلىق بۇزۇق خىلىتلارنى سۈرۈش ئارقىلىق قاننى پاكىزلايدۇ ، ئۇنىڭدىن باشقا باش قېيىش ، مالىخولىيا (خىيالپەرەسلىك) ، جۈنۇن (ساراڭلىق) ، تۇتقاقلىق (سەرئى) ، پالەج ، ئىستىرخا ، لەقۇا ، قول پۇت تىترەش ، پەيلەر تارتىشىپ قېلىش ، سەكتە (بىھوشلۇق) ، كۆز قۇلاق ئاغرىقى ،

يۈرەك ئاغرىقى، نەپەس قىستاش، جىگەر توسۇلۇش، ئۆت ياللۇغى ھەم ئۆتكە تاش چۈشۈش، بەلغەم سەۋدادىن بولغان قىزىتما كېسەللىكلىرىگە ھەمدە قولىنجى، يەل تولغاق كېسەللىكلىرىگە، نىقرىس، مۇپاسىل، ئەرقۇننىسا، قىچىشقا، تەمرەتكە، قارا داغ، سەپكۈن، چاچ - ساقالنىڭ چۈشۈپ كەتكەنىگە، پىل پۇت كېسەلى، خانازىر (لىمفا بەز تۇبېركۇلىوز)، ئاقكېسەل، جوزام، كونا جاراھەت، ئىششىق، بۆرەك ۋە دوۋساققا چۈشكەن تاشلارنى ئېرىتىپ چۈشۈرۈش، راك ئاغرىقىنى پەسەيتىش، تەرەققىي قىلىشنى تىزگىنلەش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە كەچتە 1 گرامدىن ئالتە گرامغىچە يەپ، ئارقىسىدىن قان مىزاجلار ئەرقى شاھتەررە، سەپرا مىزاجلار ئەرقى كاسىن، سەۋدا مىزاجلار ئەرقى گاۋزىبان ياكى ئەرقى ئەفتىمۇن، بەلغەم مىزاجلار ئەرقى بەدىيان ياكى مائۇل ئۇسۇل شەرىپىتى ئىچىسە تېخىمۇ ياخشى.

3 - نۇسخا ئامىلە نۇشدارى

تەركىبى: قىزىلگۈل 36 گرام، سەئدە كۇفى، ئاق بەھمەن، بىلىيىلە پوستى، گاۋزىبان ھىندى ھەر بىرى 30 گرامدىن، قەلەمپۇر، سۈمبۇل، ئاسارۇن، بادىرەنجى بۇيا، قىزىل بەھمەن ھەر بىرى 20 گرامدىن، گۈلدارچىن، زەرەنپ، مەستىكى، قاقىلە، ئاق تودەرى، قىزىل تودەرى، خولىنجان، مەرۋايىت ناسوختە،

يۇمىقاسۇت ئۇرۇقى، سازەنج ھىندى، پەرەنجىمىشكى
 ھەر بىرى 12 گرامدىن، بەسباسە، لاچىن دانە، جوزبەۋۋا، زەپەر
 ھەر بىرى 6 گرامدىن، ئامىلە مۇقەششەر 540 گرام، ئەنجەر
 ئەشەپ 4.5 گرام، ھەسەل 7 كىلوگرام، شېكەر 3 كىلوگرام.
 تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: مۆتىدىل

تەسىرى: مېڭە، يۈرەك، ئاشقازان، جىگەر، ئۈچەي ئاجىز-
 لىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. كۆڭۈلگە خۇشلۇق كەلتۈرىدۇ. بو-
 لۇپمۇ جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاپ، جىگەر سەۋەبىدىن بولغان
 مېڭە ئاغرىقىغا ھەمدە ھەرخىل نېرۋا كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت
 قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىمدىن ئىككى قېتىم-
 غىچە، 10 گرامدىن 15 گرامغىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

4 - نۇسخا ئاساناسسىيا كەبىر

تەركىبى: ئەپيۇن، زەپەر، قۇندۇز قەھرى، بەزرۇلبەنجى،
 قۇستەتەلخ، قىرەدەنە، خەشخاش، غاپەس، غارىقۇن، بۇغدا
 مۇڭگۈزى، بۆرە جىگىرى ھەر بىرى 10 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ
 ھەسسە.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئۈچ
 ھەسسە ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەر ئاجىزلىق، جىگەر قېتىش، جىگەر،

ئاشقازان، ئال ئاغرىقى، بەلغەمدىن بولغان ئىچ سۈرۈش،
يۈتەل، نەپەس قىستاش، ئۆت ياللۇغى، سوزۇلما خاراكتېرلىك
قەي قىلىش ھەم بۆرەك ئاجىزلىقى، ئاغرىقى ۋە تاش چۈشۈش،
بوۋاسىر قاتارلىق بارلىق سوغۇقتىن بولغان ئاغرىقلارغا مەنپەئەت
قىلىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 1.5 گرامدىن 3 گرامغىچە كەچتە يې-
يىلىدۇ.

5 - نۇسخا ئايارەج بايادىدۇس

تەركىبى: سەبرە سۇقۇترى 45 گرام، غارىقۇن 60 گرام،
زەپەر، دارچىن، ئىگىر، مەستىكى رۇمى، بىلسان يېغى ھەر
بىرى 10 گرامدىن، رەۋەنچىنى 4.5 گرام، ئۆدبىلسان، ھەببى
بىلسان، پەرفىيۇن، ئاقمۇچ، قارىمۇچ، جىنتىيانا رۇمى، دار-
پىلىپىل، ئىزخىر ھەر بىرى 6 گرامدىن، قۇستى تەلخ، كامادى-
رىيۇس، ئەفتىمۇن ھەر بىرى 12 گرامدىن، ئاسارۇن، سەلىخە،
سۇقمۇنىيا ھەر بىرى 24 گرامدىن، مۇرساپ، ھۇماما ھەر بىرى 3
گرامدىن، سۇمبۇل 10 گرام، ھەسەل ئۇچ ھەسسە.
تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە كەچ ياتار ۋاقتىدا 3 گرامدىن 12
گرامغىچە يېيىلىدۇ.

تەبىئىتى: ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: شەيخ رەئىس ئىبن سىناننىڭ يېزىشىچە بۇ دورا

بەدەندىكى بارلىق كېرەكسىز ھۆللۈك ۋە قۇيۇق خىلىتلارنى سۈرۈپ، ئۈتۈنغانلىق، كۆزگە قاراڭغۇلۇق بىلىنىش، نەپەس قىستاش، جىگەر، ئاشقازان، تال، بۆرەك، بالىياتقۇ ئاغرىقلىرىغا ھەمدە ئادەت (ھەيىز) توختاپ قالغانغا، يەل تولغىسىقى، بارلىق سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە، يەل كېسەللىكلىرىگە، توسالغۇلارنى ئېچىشقا، بولۇپمۇ جىگەر، تال، كۆكرەك پەردىسى ھەم كۆكرەك ئىششىقلىرىغا، يارقان، ئىستىمىسقا رەبۇ (تۇتاقلىق، تېرىكش)، جىگەر ئاجىزلىقىدىن بولغان پالەچ، لەقۇا، رەئشە، ئىستىرخا، جوزام، بەرەس، بەھەق، بۆرەك، دوۋساققا چۈشكەن تاشلارنى ئېرىتىش تەسىرىگە ئىگە ئىكەن.

6 - نۇسخا بەر شىمائى ئەبۇ بەراكات

تەركىبى: دارىپىلىپىل، جىنتىيانا، دارچىن، قۇندۇز قەھرى، گۈلدارچىن ھەربىرى 10 گرامدىن، سۈمبۇل تىپ، ئىزخىر، زىراۋەندە ھەر بىرى 30 گرامدىن، ئەپيۇن 4.5 گرام، زەپەر 3 گرام، رۇم بەدىيان، تۇخۇمى كەرەپشە، بەزرۇلبەنجى ھەر بىرى 45 گرامدىن، قارىمۇچ 66 گرام، قۇستى تەلخ، ئوردان، ئاسارۇن ھەر بىرى 30 گرامدىن، زەنجىۋىل، يالپۇز 21 گرامدىن، گۈل يېغى، بىلىسان يېغى ھەر بىرى 30 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: بارلىق ھايۋانات، ئۆسۈملۈك زەھەرلىرىنى

ياندۇرىدۇ. باش قېيىش، قاراڭغۇلۇق بىلىنىش، قۇلاق ئاغرىقى، زۇكام، نەزلە، پالەج، لەقۇا، ئېغىزدىن شال ئېقىش، ئۇيقۇ كەلمەسلىك، ئۆلۈكتەك ئۇخلاش، ئۈنتۇغاقلىق، سەرئى، ئويللىماسلىق كېسەللىكلىرىگە، ئاشقازان، جىگەر، ئۈچەينىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، ھۆللۈكتىن بولغان كېسەللىكلىرىنى يوقىتىش، جىگەر زەئىپلىشىشتىن بولغان ئىستىسقا، بۆرەك، دوۋساققا چۈشكەن تاشلارنى ئېرىتىش تەسىرىگە ئىگە. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 1.5 گرامدىن 3 گرامغىچە يەيدۇ.

7 - نۇسخا تەرياقى ئەرەبە

تەركىبى: جوفتە بەللوت، جىنتىيانا رۇمى، مۇرمەككى، ئۈزۈنچاق زىراۋەندە ھەر بىرى 30 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە. تەييارلىنىشى: قاننىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ. تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق. تەسىرى: زەھەر قايتۇرىدۇ. خىلىتلار ئوتتۇرىسىدىكى قالاي-مىقانلىشىشنى تەرتىپكە سالىدۇ ھەمدە جىگەردە ماددىلار بۇزۇ-لۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ھەمدە بۇزۇلغان خىلىتلارنى قۇرۇتۇپ يوق قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، 3 گرامدىن 10 گرامغىچە يېيىلىدۇ.

8 - نۇسخا جاۋارش شەھىرىيان

تەركىبى: گۈلدارچىن، قەلەمپۇر، قېلىن قوۋزاق دارچىن، قوۋزاق دارچىن، زەنجىۋىل، سۈمبۇل، جوزبەۋۋا، لاجىننىدەنە ھىندى، مەستىكى رۇمى، قاقىلە، ھەببى بىلسان، زەپەر ھەر- بىرى 24 گرامدىن، قەنت بىر ھەسسە، ھەسەل ئىككى ھەسسە. تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ. تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: ئاشقازان، جىگەرنى قۇۋۋەتلەپ، ئاشقازان، جىگەر ساھەسىدىكى بەلغەم سەۋدانىڭ بۇزۇق ماددىلىرىنى سۈرىدۇ، سۇ- قۇر ئۈچەي، يۈرەك، دوۋساقنىڭ يەللىك ئىششىقلىرىنى، مەزى بېزى ياللۇغىنى ياندۇرىدۇ. سۈيۈكنى راۋانلاشتۇرىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ، 3 گرام- دىن 10 گرامغىچە بېرىلىدۇ.

9 - نۇسخا جاۋارش نارمىشكى

تەركىبى: نارمىشكى 30 گرام، قاقىلە 20 گرام، قوۋزاق دارچىن 10 گرام، قارىمۇچ 45 گرام، قەنت 300 گرام. تەييارلىنىشى: قەنتنى قىيام قىلىپ يۇقىرىقى دورىلارنى

ئوبدان سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

نەسىرى: چىگەرە قېتىش، چىگەرە راكى، چىگەرە زەئىپلىكى، ئىستىسقا ئى تەبلى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 6 گرامدىن 15 گرامغىچە كۈندە ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ. دورىنىڭ كەينىدىن ئەرقى كاسىن، ئەرقى بەدىيان ئىچىلسە تېخىمۇ ياخشى.

10 - نۇسخا جاۋارش جالىنۇس

تەركىبى: ئاقمۇچ، لاچىندانە ھىندى 12 گرامدىن، قۇستى تەلخ، سۈمبۇل تىپ، ئۇدىلىسان، قەسپۈزەرىرە، نامازشام گۈل ئۇرۇقى، زەنجىۋىل، سەئدە كۇفى، خولىنجان، قەلەمپۇر، گۈلدارچىن، قوۋزاق دارچىن، ئاسارۇن، زەپەر، مەستىكى ھەر-بىرى 30 گرامدىن، قارىمۇچ، ھۇماما، سازەنج ھىندى، كەرەپشە ئۇرۇقى، رۇم بەدىيان، ئاقىرقەرھە، تۇخۇمى سوزاپ ھەر بىرى 15 گرامدىن، ھەسەل ئىككى ھەسسە، قەنت 1 ھەسسە.

تەييارلىنىشى: قاندىنە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

نەسىرى: چىگەرە، ئۆت، تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، چىگەرەنىڭ سوغۇقتىن، يەلدىن بولغان ئاغرىقلىرىنى، ئىششىق-لارنى ياندۇرىدۇ. ئۆت، يۈرەك، دوۋساققا چۈشكەن تاشلارنى چۈ-شۈرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ئەتىگەن، كەچ تاماقتىن كېيىن 6 گرامدىن 15 گرامغىچە بېرىلىدۇ.

11 - نۇسخا جاۋارلىق ئەنئەنىسى

تەركىبى: قاقلىق، لاپىندەنە ھىندى، بەسباسە، قوۋزاق
 دارچىن ھەر بىرى 10 گرامدىن، پىلىپ، زەنجىۋىل ھەر بىرى 30
 گرامدىن، ئۆشەنە، مەستىكى، ئەنئەنىسى ھەر بىرى 6 گ-
 رامدىن، زەپەر، قەلەمپۇر، گۈلدارچىن ھەر بىرى 8 گرامدىن،
 جوزبەۋۋا 15 گرام، ئىپار 3 گرام، ھەسەل 3 ھەسە.
 تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.
 تەسرى: مېڭە، يۈرەك، ئاشقازان، جىگەر، بۆرەكنى قۇۋ-
 ۋەتلەش، بولۇپمۇ قېرىلار ۋە ھۆل سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە
 ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.
 ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىمدىن ئىككى قېتىم-
 غىچە، 3 گرامدىن 10 گرامغىچە ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ.

12 - نۇسخا جاۋارلىق كۈمۈنى

تەركىبى: زىرە مۇدەپپەر 560 گرام، قارىمۇچ 66 گرام،
 زەنجىۋىل 100 گرام، يالپۇز ياكى پىننە 100 گرام، توغرىغۇ
 30 گرام، سۈمبۇل، قوۋزاق دارچىن ھەر بىرى 45 گرامدىن،
 كۈنجۈت، مۇقەششەر 50 گرام، ھەسەل 3 ھەسە.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، جىگەر، ئۈچەينىڭ يەلدىن بولغان

ئېسىلىشلىرىگە ۋە ئاغرىشىغا، زەردە قايناش، سېسىق كىك-
رىش، سۇ ياندۇرۇش، بۆرەك، بالىياتقۇ، ئۇرۇقدان سۈۋۈپ
كېتىش ھەم سۇ چۈشۈش، جىگەرگە پەيدا بولغان سۇلۇق
ئۆسمىلەرنى ياندۇرۇش، يەلدىن بولغان يۈرەك، ئۆت، بۆرەك
سانجىقى، غىزا سىڭدۇرۇش، جىگەر ۋە قان تەركىبىدىكى مايلىرى
ئېرىتىش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چوڭلارغا 5 گرامدىن كۈندە 2 ۋاخ
بېرىلىدۇ.

13 - نۇسخا جاۋارىش چىلپا

تەركىبى: چىلپا 30 گرام، خىيار شەنبەر 15 گرام، ئارپە-
جەدىيان، رۇم بەدىيان، كەرەپشە ئۇرۇقى، تەرەنجىۋىل، قىزىلگۈل
15 گرامدىن، شېكەر 360 گرام.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەر قېتىش سەۋەبىدىن بولغان سۇلۇق ئىش-
شىقلارنى ياندۇرىدۇ. دەم سىقىش، قولۇنچى، بوغۇم ئاغرىقلىرى،
جىگەر، ئۆت يولى توسۇلۇشتىن بولغان سىرتقى كېسەلگە مەنە-
پەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 3 گرامدىن 10 گرامغىچە كۈندە بىر

قېتىم يېيىلىدۇ.

14 - نۇسخا ھەببى شىپا

تەركىبى: ئىت ياغمى ئۇرۇقى (ۋاڭ ئۇرۇقى) 35 گرام،
جوزبەۋۋا، زەنجبۇل ھەربىرى 8 گرامدىن، رەۋەنچىنى
12 گرام، ھەسەل 60 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە ئېلىپ ۋاڭ ئۇرۇقىنى
زەھەرسىزلەندۈرۈپ، ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا دورىلار بىلەن قو-
شۇپ سوقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ،
نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: بارلىق كېسەللەردە ئوفۇنەتنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ،
ئاغرىق پەسەيتىدۇ، مېخە، يۈرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلىش ھەم
خىزمىتىنى نورماللاشتۇرۇش شۇنداقلا بارلىق ئىسسىق،
سوغۇق، ھۆل، قۇرۇقتىن بولغان قىزىتمىلارنى پەسەيتىش خۇ-
سۇسىيىتىگە ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم بىردىنبىر يەيدۇ.

15 - نۇسخا ھەببى غاپەس

تەركىبى: غاپەس، سەبرە سۇقۇترى، سېرىق ھېلىلە پوستى
ھەر بىرى 30 گرامدىن، قىزىلگۈل 5 گرام.
تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى

كەرەپشە سۈيىدە يۇغۇرۇپ، نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەر ئىششىقى، جىگەر بىلەن ئۆت ئوتتۇرىسىدا شەكىللەنگەن توسالغۇ سەۋەبىدىن بولغان بەدەننىڭ ساغرىپ كېتىشىگە مەنپەئەت قىلىدۇ، قىزىشنى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە كەچتە 1 گرامدىن 3 گرامغىچە بېرىلىدۇ.

16 - نۇسخا ھەببى رەۋەن

تەركىبى: رەۋەنچىنى، مۇقەل ھەر بىرى 30 گرامدىن، غا. رىقۇن 60 گرام، توربۇت سىپىد 120 گرام، زىراۋەندە مۇدەھىرەج 10 گرام، قىزىلگۈل 5 گرام.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب قىلىنىدۇ. تەسىرى: جىگەر ئاجىزلىقى، جىگەر توسالغۇلىرى سەۋەبىدىن بولغان جىگەر ئىششىقى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە كەچ ياتار ۋاقتىدا 2 گرامدىن 5 گرامغىچە پىيىلىدۇ.

17 - نۇسخا ھەببى سەبرە

سەبرە 30 گرام، مەھمۇدە 5 گرام، غارىقۇن

20 گرام، ئوسارە غاپەس 10 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، كاسىن سۈيىدە يۇغۇرۇپ، نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: چىگەر قېتىش، چىگەر ۋە ئۆت يوللىرىنىڭ تولىشىدىن بولغان يارقان كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە كەچ 1 گرامدىن 3 گرامغىچە بېرىلىدۇ.

18 - نۇسخا ھەببى ئەفسەنتىن

تەركىبى: ئەفسەنتىن رۇمى، پوستى ھېلىلىلە زەرد، لەكى مەغسۇل، مەستىكى، زەپەر، رەۋەنچىنى، رۇم بەدىيان، شاھتەررە، سەبرە ھەر بىرى 30 گرامدىن.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئەرقى شوخلا بىلەن يۇغۇرۇپ، نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: بارلىق سوغۇقتىن بولغان چىگەر ئاغرىقى، چىگەر كېسەللىكلىرى سەۋەبىدىن بولغان قىزىتمىلارنى پەسەيتىدۇ، چىگەر ئاجىزلىقىدىن بولغان پۈتۈن بەدەنلىك ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر ۋاخ، 3 گرامدىن 5 گرامغىچە بېرىلىدۇ.

19 - نۇسخا ھەببى غارىقۇن

تەركىبى: غارىقۇن سىپىد 12 گرام، ئەفتمۇن، سەبىرە سۇ-
قۇترى، ھەربىرى 18 گرامدىن، پىتىر سالىيون، تاغ سەۋزىسى
ئۇرۇقى، كەرەپشە ئۇرۇقى 6 گرامدىن، سوقمۇنىيا 3 گرام،
تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،
قايناق سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، نۇقۇت چوڭلىقىدا ھەب
تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: چىگەر، ئۆت، تال توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، بە-
دەندىكى ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر ۋاخ، 2 گرامدىن 5 گرام-
غىچە بېرىلىدۇ.

20 - نۇسخا داۋائىل كەبىر

تەركىبى: لەكى مەغسۇل، تاغ سەۋزىسى ئۇرۇقى، تاغ كە-
رەپشىسى ئۇرۇقى، زىرە، زەنجىۋىل ھەر بىرى 24 گرامدىن،
كامادىريوس، زۇپا ھىندى ھەر بىرى 12 گرامدىن، جىنتىيانا،
زىراۋەندە مۇدەھەرەج ھەر بىرى 3 گرامدىن، سەبىرە سۇقۇترى،
سۇمبۇل تىپ ھەر بىرى 36 گرامدىن، ئوردان 45 گرام، ھەببى
بىلسان، قوۋزاق دارچىن، مۇقەل، مەستىكى رۇمى،

جىگەر كېسەللىكلەرنى ئۆزگەرتىش ۋە تەييارلىنىش داۋالاش

قەسبۇزەرسە، ئاسارۇن ھەر بىرى 18 گرامدىن، كۈندۈر 12 گرام، دارىپىلىل، زىراۋەندە تىۋىل ھەر بىرى 10 گرامدىن، رەۋەنچىنى، ئىزخىر ھەر بىرى 6 گرامدىن، قارىمۇچ، قۇستى تەلخ 30 گرامدىن، رۇبىسۇس 84 گرام، سىيسالىيۇس 10 گرام، ھەسەل 3 ھەسسە.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، جىگەر سۈۋۈپ كېتىش، جىگەر، ئۆت، تال يوللىرى توسۇلۇش، جىگەر، تال قېتىش كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەم ئۆت، بۆرەك، دوۋساققا چۈشكەن تاشلارنى پارچىلاپ ئېرىتىپ چىقىرىش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ئەتىگەندە ۋە كەچتە تاماقتىن بۇرۇن 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

21 - نۇسخا داۋائىل كۆركەم

تەركىبى: زەپەر 36 گرام، ئاسارۇن، تاغ سەۋزىسى ئۇرۇقى، رۇم بەدىيان، پىتىر سالىيون، رەۋەنچىنى ھەر بىرى 12 گرامدىن، سۈمبۇل 18 گرام، قۇستى تەلخ، قوۋزاق دارچىن، ئىزخىر، ھەببى بىلىسان، ھەر بىرى 6 گرامدىن، ئوردان 12 گرام، رۇبىسۇس، جوئە، مەستىكى رۇمى، غاپەس ھەر بىرى 10 گرامدىن، بېلىسان يېغى 15 گرام، مۇرساپ 12 گرام، ھەسەل 3 ھەسسە.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ئىپادىسى

قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 3 گرامدىن 10 گرامغىچە كۈندە ئىككى قېتىم يەيدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، مەسارىقا، جىگەر، ئۆت، تالنىڭ سوغۇق تىنى بولغان توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، يەللىك ئىششىقلىرىنى ياندۇرىدۇ. جىگەر، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ، سۈيدۈك ھەيدەپ، سۇلۇق ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ.

22 - نۇسخا زىمادى سوزاپ

تەركىبى: بەرگى سوزاپ، توغرىغۇ، يالپۇز ھەر بىرى 10 گرامدىن، ئوشەق 21 گرام.

تەييارلىنىشى ۋە ئىشلىتىلىشى: دورىلارنى ئوبدان سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە بىلەن مەلھەم قىلىپ، جىگەر سەھەسىگە چېپىلىدۇ.

تەسىرى: تال ۋە جىگەر قانقان بولسا، كېسەللەرگە يۈمىشتىش مەقسىتىدە ئىشلىتىلىدۇ.

23 - نۇسخا زىمادى سۈمبۇل

تەركىبى: سۈمبۇل، مەستىكى، قەسبۇزەرىرە، زەپەر باراۋەر مىقداردا.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،
ئەرقى بەدىيان بىلەن خېمىر قىلىپ تەييارلىنىدۇ.
تەسىرى: چىگەرنىڭ بەلغەم، سەۋدادىن بولغان ئىششىق-
لىرىنى ياندۇرىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چىگەر ساھەسىگە چېپىلىدۇ.

24 - نۇسخا زىمادى گۈلسۈرۈخ

تەركىبى: قىزىلگۈل 30 گرام، گۈل بىنەپشە، ئاق لەيلى
گۈلى، ئارپا ئۇنى ھەر بىرى 21 گرامدىن، ئاق سەندەل، قىزىل
سەندەل، بابۇنە، ئىككىلىملىك، تۇخۇمى كاسىن، تۇخۇمى با-
لەنگۈ، نىلۇپەر ھەر بىرى 6 گرامدىن، رەۋەنچىنى 3 گرام،
سۈمبۇل 1.5 گرام.
تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ كاسىن سۈيى بىلەن يۇ-
غۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
تەسىرى: چىگەرنىڭ قان سەپرادىن بولغان ئاغرىقلىرىنى
توختىتىدۇ. ئىششىقلىرىنى ياندۇرىدۇ، قىزىتمىلىرىنى، ئې-
چىشنى پەسەيتىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چىگەر ساھەسىگە چېپىلىدۇ.

25 - نۇسخا زىمادى سەرتان

تەركىبى: ۋاڭنىڭ گۈلى (ئىتياڭقىنىڭ) 100 گرام، تاش

تۈز 50 گرام.

تەييارلىنىشى: ئوبدان سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،
قايناق سۇ بىلەن مەلھەم تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: چىگەرەت راكى ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. نوقتۇ سۈيى
بىلەن مەلھەم قىلىپ چېپىلسا نېخىمۇ ياخشى.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چىگەرەت ساھەسىگە چېپىلىدۇ.

26 - نۇسخا زىھادى بەرەس

تەركىبى: سىيادان، قىچا، ئۆشۈدۈر، جىن كېۋەزى
ئۇرۇقى، گۈڭگۈرت يېغى ھەر بىرى 30 گرامدىن، ھەسەل 3
ھەسە.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،
ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: ئاقكېسەلگە سىرتتىن چېپىپ ئاپتاپقا قاقلىنىپ
ئولتۇرسا ئاقكېسەلنى يوق قىلىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھاجەت مىقدارى
چېپىلىدۇ.

27 - نۇسخا رەۋغىنى بەرەس

تەركىبى: گۈل سەۋسەن، سىيادان، ئۆشۈدۈر ھەر بىرى 30

چىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى ۋە ئۇنىڭ ئىشلىتىلىشى

گرامدىن، قىچا يېغى 200 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
قىچا يېغىدا مەلھەم قىلىپ يەتتە كۈن ئاپتاپتا قويدۇپ
تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: بەھەق، بەرەس كېسەللىكلىرىگە سىرتتىن چې-
پىلسا مەنپەئەتلىك.

ئىشلىتىش مىقدارى: كۈندە بىر قېتىم، ھاجەت مىقدارى
چېپىلىدۇ.

28 - نۇسخا رەۋغىنى گۈلسۈرۈخ

تەركىبى: قىزىلگۈل 50 گرام، ۋاڭنىڭ گۈلى (ئىتياڭنىق-
نىڭ) 10 گرام، كۈنجۈت يېغى 250 گرام.

تەييارلىنىشى: ۋاڭنىڭ گۈلىنى كۈنجۈت يېغىغا چىلاپ ئاپ-
تا 30 كۈن تۇرغۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: چىگەرنىڭ سەپرادىن بولغان ئاغرىقلىرىنى، ئې-
چىشىنى پەسەيتىدۇ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: سىرتتىن چىگەر ساھەسىگە چېپىلىدۇ.

29 - نۇسخا رەۋغىنى سۈمبۇل

تەركىبى: سۈمبۇل تىپ، ئىزخىر ھەر بىرى 30 گرامدىن،

رەۋەن 10 گرام، زەپەر 3 گرام، كۈنجۈت يېغى 300 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ كۈنجۈت يېغىغا چىلاپ يەتتە كۈن ئاپتاپتا قويۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەرنىڭ بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولغان ئىششىقلىرىنى ياندۇرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: جىگەر ساھەسىگە چېپىلىدۇ.

30 - نۇسخا سىركەنجىۋىل رەۋەن

تەركىبى: تۇخۇمى كاسىن 60 گرام، قىزىلگۈل، شاھتەررە، تۇخۇمى كىشوش ھەر بىرى 30 گرامدىن، رەۋەنچىنى 15 گرام، سىركە 120 گرام، قەنت 600 گرام، سۇ 1.5 لىتىر.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى چالا سوقۇپ، سۇغا بىر سۈتسىكا چېلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن بىر كىلو قالغۇچە قاينىتىپ، سۈزۈپ سۈيىگە قەنتنى سېلىپ، 750 گرام قالغۇچە قاينىتىپ ئۇنىڭدىن كېيىن سىركەنى قوشۇپ، بىر ئۆرلىتىپلا توختىتىلىدۇ.

تەسىرى: جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقىدىن بولغان كېسەللىكلىرىگە بولۇپمۇ، جىگەر بىلەن ئۆت ئوتتۇرىسىدىكى توسۇلۇشتىن بولغان سىرتقى كېسەللىكلىرىگە تېز مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ھەر كۈنى چۈشتە ۋە كەچتە تاماقتىن بۇرۇن 50 گرامنى 100 گرام سوۋۇتۇلغان قايناق سۇغا قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

31 - نۇسخا سىر كەنجىۋىل ئوردان

تەركىبى: بىخ بەدىيان، بىخ كاسىن، بىخ كەرەپشە، بىخ كەبىر ھەر بىرى 30 گرامدىن، ئارپىبەدىيان، رۇم بەدىيان، تۇخۇمى كاسىن، تۇخۇمى كىشوش، تۇخۇمى كەرەپشە ھەر بىرى 21 گرامدىن، زۇپا ھىندى، ئوردان، غاپەس، ئەفسەنتىن، جۈندە، سۈمبۈل تىپ، ئاسارۇن ھەر بىرى 15 گرامدىن، سىر كە 200 گرام، قەنت 600 گرام يۇقارقىدەك تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەر، تال قېتىشىش، جىگەرنىڭ سوغۇقتىن بولغان توسالغۇلىرىنى ئېچىش، ئىششىق ياندۇرۇش، بەلغەمدىن بولغان ئاغرىقلىرىنى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ئىستېمال قىلىش ئۇسۇلى يۇقىرىقى بىلەن ئوخشاش ئىچىلىدۇ.

32 - نۇسخا سىر كەنجىۋىل بۇزۇرى

تەركىبى: تۇخۇمى كاسىن 30 گرام، تۇخۇمى كىشوش، ئارپىبەدىيان، كەرەپشە ئۇرۇقى، رۇم بەدىيان ھەر بىرى 15 گرام.

دىن، قەنتەرىيۇن، ئادراسمان ئۇرۇقى، قىزىلگۈل ھەر بىرى 10 گرامدىن، سىر كە 300 گرام، شېكەر 900 گرام، قائىدە بويىچە

2. 1 لىتىر تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى بىلەن ئوخشاش.
تەسىرى: جىگەر، ئالدىنىڭ سوغۇقتىن بولغان توسالغۇلىرىنى
ئاجىدۇ، ھەمدە ئاشقازان ئاجىزلىق، رېماتىزم خاراكتېرلىك
قىزىتمىلارنى پەسەيتىدۇ. مۇيدۇك ھەيدەپ، ئىششىقلارنى ياندۇ-
رۇپ، ئىشتىھانى ئاجىدۇ.

33 - نۇسخا سىركەنجىۋىل ھەسلى

تەركىبى: ھەسەل 500 گرام، سىركە 250 گرام، سۇ ئىككى
لىتىر.

تەييارلىنىشى: ئالدى بىلەن ئىككى لىتىر سۇغا ھەسەلنى
سېلىپ بىر لىتىر قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن
سىركىنى قوشۇپ، بىر قاينىتىپلا تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چۈشتە ۋە كەچتە تاماقتىن بۇرۇن سو-
ۋۇتۇلغان قايناق سۇ قوشۇپ 30 گرامدىن 50 گرامغىچە ئىچىلىدۇ.
تەسىرى: جىگەر، ئۆت، ئۈچەي يوللىرىدىكى قويۇق خى-
لمىتلارنى، ھۆل شىلىمىش خىلمىتلارنى تازىلايدۇ. قان تەركى-
بىدىكى مايلىرىنى ئېرىتىدۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.

34 - نۇسخا سىركەنجىۋىل ساددە

تەركىبى: شېكەر 500 گرام، سىركە 200 گرام، سۇ 1 لىتىر.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: جىگەر، ئۆت ياللىغى، ھەم قىزىپ، ھەم سوۋۇش، كۆپ ئۇمىش قاتارلىق جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقى بولغان كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چۈشتە ۋە كەچتە تاماقتىن بۇرۇن 30 گرامدىن 50 گرام سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

35 - نۇسخا شارابى دىنار

نەركىبى: زىخ، بېھى ئۇرۇقى، تۇخۇمى كاسىن ھەر بىرى 30 گرامدىن، ئۇد ھىندى، بىخ سەۋسەن ھەر بىرى 12 گرامدىن، تۇخۇمى كىمشوش، قىزىلگۈل، قەنەرىيون، مەستىكى، دارچىن، يالپۇز ھەر بىرى 10 گرامدىن، ئارپىبەدىيان، سېرىق چېچەك، گاۋزىبان ھىندى، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، ھەر بىرى 15 گرامدىن، ۋەنچىنى 40 گرام، ئاسارۇن 5 گرام، شېكەر 1 كىلوگرام، سۇ 3 لىتىر، قائىدە بويىچە 1.25 لىتىر شەربەت تەييارلىنىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ ۋاخ، 30 گرامدىن 50 گرامغىچە ئىچىدۇ.

تەسىرى: جىگەرنىڭ سەپرا، سەۋدا، بەلغەمدىن بولغان بارلىق كېسەللىكلىرىگە جىگەر، ئاشقازان، يۈرەك، بۆرەكنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش مەقسىتىدە قاننى كۆپەيتىش، قاننى پاكىزلاش ئارقىلىق جىگەر خىزمىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. جىگەر راكى، جىگەر ئاجىزلىقىدىن بولغان بەلۇق، بەرەس كېسەللىكلىرىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

36 - نۇسخا شارابى رەۋەن

تەركىبى : رەۋەنچىنى 30 گرام ، توربۇت سىپ ، غارىقۇن ، بىستىپايەج ، تۇخۇمى كىشوش ، بىخ كەبىر ، تۇخۇمى كاسىن ھەر بىرى 15 گرامدىن ، زەنجۈل 10 گرام ، قەنت 300 گرام قانئىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى : جىگەر ، تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ ھەمدە جىگەر ، تال قېتىش ، جىگەر سانجىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى : 15 گرامدىن 50 گرامغىچە ئەھۋالغا قاراپ تاماقتىن بۇرۇن ئىچىلىدۇ.

37 - نۇسخا شارابى بۇزۇرى ھار

تەركىبى : بىخ بەدىيان ، بىخ كەبىر ، بىخ كاسىن ، بىخ كەرەپشە ، تۇخۇمى كاسىن ، ئارپىسى بەدىيان ، رۇم بەدىيان ، ئىزخىر ، تۇخۇمى كىشوش ، سۈمبۇل يىتىپ ، ھەر بىرى 12 گرامدىن ، قۇرۇق ئۈزۈم 250 گرام ، ئوردان ، زەپەر ، مەس-تىكى ، ھەر بىرى 6 گرامدىن شېكەر 1.5 لىتىر. قانئىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

تەسىرى: چىگەر، ئۆت، تال، ماسارنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، بەلغەم سەۋدادىن بولغان چىگەر ئىششىقلىرى (ياللۇغى) ۋە يەللىك ئىششىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. كۆيگەن خىلىتلارنى سۈرىدۇ، بەدەنگە چۈشكەن سېرىقلىقنى يوق قىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 20 گرامدىن 50 گرامغىچە كۈندە ئۈچ ۋاختاماقىتىن بۇرۇن قايناق سۇغا تەڭشەپ ئىچىلىدۇ.

38 - نۇسخا دىنار شەرىپىتى

تەركىبى: بىخ كاسىن 120 گرام، تۇخۇمى كاسىن، قىزىل گۈل ھەر بىرى 60 گرامدىن، گاۋزىبان ھىندى، نېلۇپەر، زىخ، ئەينۇلا ھەر بىرى 30 گرامدىن رەۋەن 45 گرام، سېرىق ئوت ئۇرۇقى 90 گرام، شېكەر 1 كىلو، سۇ 3 لىتىر. تەييارلىنىشى: دورىلارنى چالا سوقۇپ، يۇقىرىقى سۇغا سەككىز سائەت چىلاپ، ئۇنىڭدىن كېيىن بىر لىتىر قالغۇچە قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيىگە شېكەرنى سېلىپ، 1.25 لىتىر شەرىپەت تەييارلىنىدۇ. رەۋەن شەرىپەت تەييارلىنىپ بولغاندا سېلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 30 گرامدىن 50 گرامغىچە كۈندە ئۈچ ۋاخ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ئىپادىسى

تەسىرى: يۈرەك، جىگەر، بۆرەك، ئۈچەي ئېسەلىكلىرىگە بولۇپمۇ، جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقى بولغان كېسەللىكلىرىگە، جىگەر قېنىش، جىگەر راكقا ئوبدان مەدەيەت قىلىدۇ.

39 - نۇسخا شارابى رەيھان

تەركىبى: بادىرەنجى بۇيا 500 گرام، ئۈستقۇددۇس 50 گرام، گاۋزىيان ھىندى 100 گرام، سۈمبۈل 60 گرام، ئۆشەنە، پىننە، قىزىلگۈل، ھەر بىرى 30 گرامدىن، ئارپا، يات ئەفتىمۇن 50 گرامدىن، تۇخۇمى كاسىن 20 گرام، شېكەر 3 كىلوگرام، 4 لىتىر شەرىت قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: مېگە، يۈرەك، ئاسقازان، جىگەر، ئال، ئۈچەيلەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ. جىگەرنىڭ بەلغەم ۋە سۇدادىن بولغان توسالغۇ، ئىششىق، ئاغرىقلىرى ئۈچۈن ئوبدان تەسىر قىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 10 گرامدىن 20 گرامغىچە ئەھۋالغا قاراپ ئىستىمال قىلىنىدۇ.

40 - نۇسخا شارابى ئانار

تەركىبى: تاتلىق ئانار سۈيى 1 لىتىر، ئاچچىق ئانار سۈيى 500 مىللىلىتىر، شېكەر 3 كىلوگرام، قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: مۆتىدىل

تەسىرى: قان كۆپەيتىدۇ، قان توختىتىدۇ، بۆرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ، بەدەندىكى سېرىقلىقنى يوقىتىدۇ، قىزىتما كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 15 گرامدىن 30 گرامغىچە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بېرىلىدۇ.

41 - نۇسخا شارابى دارچىن

تەركىبى: قوۋزاق دارچىن، زەنجىۋىل ھەر بىرى 15 گرامدىن، قاقىلە، لاچىندانە ھەر بىرى 6 گرامدىن، قەلەمپۇر، يالپۇز، ئارپىبەدىيان ھەر بىرى 3 گرامدىن، شېكەر 1 كىلوگرام، سۇ 2 كىلو، قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 30 گرامدىن 50 گرامغىچە، كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچىلىدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، بۆرەك، جىگەر، كۆكرەك بوشلۇقىدىكى كېرەكسىز، بۇزۇق ھۆللۈكنى يوقىتىدۇ. جىگەرنىڭ بەلغەمدىن بولغان ئىششىقنى ياندۇرىدۇ. ھەزىمنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان بەدەننىڭ كۆپىشىپ قېلىشىنى (سوئىلقويىنە) يوقىتىدۇ. ئاشقازان، جىگەر راكلىرىغىمۇ مەنپەئەتلىك ياخشى.

42 - نۇسخا شارابى شىپا

تەركىبى: بىخ بەدىيان، بىخ كەرەپشە، بىخ كاسىن، بىخ

كەبىر، ھەر بىرى 90 گرامدىن ئارپىبەدىيان، كەرەپشە
 كۈرۈقى، تۇخۇمى كاسىن، ھەر بىرى 30 گرامدىن، ئەنجۈر قېقى
 20 دانە، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 100 گرام، ئىزخىر 30 گرام، ھەسەل
 1.25 كىلوگرام، سۇ 4 لىتىر.

تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە 1.5 لىتىر شەرىپەت تەييار-
 لىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 20 گرامدىن 30 گرامغىچە كۈندە
 ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ.

تەسىرى: بەدەندىكى خام ماددىلارنى پىشۇرىدۇ، جىگەرنىڭ
 توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەپ، سۇلۇق ئىششىقلارنى
 ياندۇرىدۇ، يەللەرنى ھەيدەيدۇ.

43 - نۇسخا شارابى ئەنجۈر

تەركىبى: ئەنجۈر قېقى 1250 گرام، نوقۇت 500 گرام، خو-
 لىنجان، قوۋزاق دارچىن، قەلەمپۇر، سۈمبۈل، قارىمۇچ ھەر
 بىرى گرامدىن، زەپەر 1.5 گرام، ھەسەل 2 كىلوگرام.

تەييارلىنىشى: ئەنجۈرنى تىتىپ، نوقۇتنى چالا سوقۇپ،
 باشقا دورىلارنىمۇ چالا سوقۇپ 4 كىلو سۇغا سەككىمىز سائەت
 چىلاپ، ئۇنىڭدىن كېيىن تەكشى ئوت بىلەن 2 كىلو قالغۇچە
 قاينىتىپ سۈزۈپ سۈيىگە ھەسەلنى سېلىپ، ئۈچ كىلو شەرىپەت
 تەييارلىنىدۇ. كۈندە ئۈچ قېتىم 30 گرامدىن 50 گرامغىچە
 ئىچىدۇ.

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۇرغۇتۇرۇپ قويغۇچى ۋىزىنلارنى
تەسىرى : ئاشقازان ، جىگەر ، بۆرەكنىڭ سوغۇقتىن
بولغان بارلىق كېسەللىكلىرىگە ھەمدە بالىسىياتقۇ ، دوۋساق
كېسەللىكلىرىگە ، بالىياتقۇ مەنبەلىك جىگەر كېسەللىكلىرىگە ،
قان كۆپەيتىش ، بەدەننى سەمىرىتىش مەقسەتلىرىدە ئىشلىتىدۇ.
جىگەر ئۆسمىلىرىگىمۇ مەنپەئەتى ياخشى.

44 - نۇسخا ئەرقى كاسىن

تەركىبى : كاسىن ھۆل بولسا 1 كىلوغا 5 كىلو ، قۇرۇق
بولسا 6 كىلو سۇ قۇيۇپ ، 3 كىلو ئەرەق ئېلىنىدۇ.
تەبىئىتى : سوغۇق
تەسىرى : ئىسسىقلىقتىن بولغان قىزىتما ، جىگەر كېسەل-
لىرى ، سېرىقكېسەل ، سۈيدۈك تۇتۇلۇپ ئىششىغان كېسەللىك-
لىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ ، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش تەسىرىگە
ئىگە.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى : كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ، 50 گ-
رامدىن 100 گرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

45 - نۇسخا ئەرقى شاھتەررە

تەركىبى : شاھتەررە 1 كىلو ، سۇ 6 كىلو ، 4 كىلو ئەرەق
ئېلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چۈشتە، كەچتە 50 گرامدىن 100

گرامغىچە ئىچىلىدۇ.

تەسىرى: جىگەردىن سەپرا ۋە سەۋدانىڭ بۇزۇق ماددىلىرىنى سۈرىدۇ، جىگەر، ئوتنىڭ توسۇلۇشىدىن بولغان بەدەن قىچىد- شىش، قىچىشقاق، ئىسسىق يەل ۋە يەل تاشما كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

46 - نۇسخا ئۇرۇق قىزىلگۈل

تەركىبى: قىزىلگۈل كىلو (ھۆل بولسا) سۇ 6 كىلو، قىزىلگۈل قۇرۇق بولسا 8 كىلو سۇ قۇيۇلىدۇ. ھۆلدىن 2.5 كىلو ئۇرۇق ئېلىنىدۇ، قۇرۇقىدىن 4 كىلو ئۇرۇق ئېلىنىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقىغا ئوخشاش.

تەسىرى: ئىسسىقلىقتىن بولغان قىزىتمىلارنى، ئاغرىقنى پەسەيتىدۇ، يۈرەك، جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقتىن بولغان كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ ھەمدە يۈرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئىششىق ياندۇرىدۇ، كۆڭۈلگە خۇشلۇق كەلتۈرىدۇ، ئۇسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ.

47 - نۇسخا ئۇرۇق بەدىيان

تەركىبى: ئارپىبەدىيان 1 كىلو، سۇ 10 كىلو، 5 كىلو ئۇرۇق ئېلىنىدۇ.

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئىلگىرى تېبابىتىدە داۋالاش

تەسىرى: جىگەر كۆپۈش، قورساق ئېسىلىش، ئۆت ياللوغى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۆت ۋە بۆرەكتىكى تاشنى ئېرىتىش تەسىرىگە ئىگە. سۈيدۈك ھەيدەپ ئىستىسقىنىڭ ئىششىقلىرىنى ياندۇرىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 30 گرامدىن 70 گرامغىچە كۈندە 3 ۋاخ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

48 - نۇسخا ئەرقى پاقا يوپۇرمىقى

تەركىبى: پاقا يوپۇرمىقى ھۆل بولسا 1 كىلوغا 5 كىلو سۇ قۇيۇپ، 3 كىلو ئەرەق ئېلىنىدۇ. تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق. تەسىرى: جىگەر مەنبەلىك ئىچى سۈرۈش كېسەللىكلىرىگە، جىگەر يىرىڭلىق ئىششىقىغا، ئۆپكە، ئۈچەي سىل كېسەللىكلىرىگە، ئاياللارنىڭ ئادەت توختىماسلىق كېسەللىكلىرىگە، كۆپ تەرلەشكە مەنپەئەت قىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە 5 قېتىم، ھەر قېتىمدا 50 - 100 كۈن ئىچىلىدۇ.

49 - نۇسخا ئەرقى پىننە

تەركىبى: ھۆل پىننە بولسا 1 كىلو، سىغا 5 كىلو سۇ قوشۇپ، ئەرەق ئېلىنىدۇ، پىننە قۇرۇق بولسا 1 كىلو، سىغا 10 كىلو

سۇ قوشۇپ، 7 كىلو ئەرەق ئېلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 50 گرامدىن 100 گرامغىچە كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچىلىدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، جىگەر، ئۆت ياللىغى ئۈچۈن، كۆكرەك پەردە ھەم ئۆپكەنىڭ سوغۇقتىن بولغان ياللىغى ئۈچۈن، باش قېيىش، ھۆ بولۇش، غىزا سىڭمەسلىك، سۈيۈك يولىدا ئېچىشش پەيدا بولۇپ قالغان، يەلدىن ئىچ سۈرگەن كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

50 - نۇسخا قۇرسى زىياستىس

تەركىبى: سېمىز ئوت ئۇرۇقى، كۆكنار ئۇرۇقى، تاباشىر ھەربىرى 30 گرامدىن، ئانار گۈلى 6 گرام، گىل ئەرمىنى 12 گرام، قىزىلگۈل، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى، جۈزىۋا، زىرە ھەربىرى 20 گرامدىن، ئاچچىق ئانار سۈيى 100 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئاچچىق ئانار سۈيىدە يۇغۇرۇپ تاپلىتىكا ياسىلىدۇ. (قۇرس) ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، 3 دانىدىن 5 دانىغىچە يەيدۇ.

تەسىرى: جىگەر سەۋەبىدىن بولغان دىئابت كېسىلىدىكى ئۇسسۇزلۇقنى، سۈيۈكنىڭ كۆپلىگىنى پەسەيتىدۇ.

51 - مائۇل ئۇسۇل

تەركىبى: بىخ كەبىر، بىخ كەرەپشە، تۇخۇمى كەرەپشە،

چىڭگىز كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە تېبابىيەت ۋەزىرائىتى
ئارپىبەدىيان، رۇم بەدىيان ھەر بىرى 20 گرامدىن،
ئىزخىر، سۈمبۇل، غاپەس، ئەفسەنتىن، كامادىريۇس ھەر بىرى
15 گرامدىن، ھەسەل 100 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى چالا سوقۇپ، 2 كىلو سۇغا
سەككىز سائەت چىلاپ، ئۇنىڭدىن كېيىن 1 كىلو قالغۇچە قاپ-
نىتىپ، سۈزۈپ سۈيگە ھەسەلنى سېلىپ تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 50 گرامدىن 100 گرامغىچە كۈندە بەش
قېتىم ئىچىدۇ.

تەسىرى: بەلغەمدىن بولغان ئاشقازان، جىگەر، ئۆپكە، مو-
پاسىل، ئىستىسقا كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

52 - نۇسخا مەجۇنى ئەمرۇسىسىيا

تەركىبى: زىرە گومانى، تاغ سەۋزىسى ئۇرۇقى، ئۇدېلىسان،
قوۋزاق دارچىن، قىرەمەنا، ئىزخىر مەككى، كەرەپشە ئۇرۇقى،
ھەر بىرى 9 گرامدىن، قۇستى تەلخى، قارىمۇچ، دارىماپىل ھەر
بىرى 4.5 گرامدىن، مۇرساپ 30 گرام، جونتەبەللوت 90 گرام،
ئىگىر، زەپىر ھەر بىرى 18 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسە.
تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،
تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئەتىگەن ۋە كەچتە 3 گرامدىن
10 گرامغىچە يېيىلىدۇ.

تەسىرى: جىگەر، ئالنىڭ، ماسارىقىنىڭ، ئۆتىنىڭ، توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، بۆرەكتىكى تاشنى پارچىلاپ چۈشۈرىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ. جىگەر ئاجىزلىقتىن بولغان ئىستىسقا كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

53 - نۇسخا مەجۈنى جىنتىيانا

تەركىبى: جىنتىيانا رۇمى، قارىدۇچ ھەر بىرى 30 گرام، دىن، قۇستى تەلخى، سازەج ھىندى، سۈمبۇل تىپ، رەۋەنچىنى ھەر بىرى 21 گرامدىن، تۇخۇمى كادىس، كۈنجۈت ھەر بىرى 10 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم 6 گرامدىن 10 گرامغىچە يەيدۇ.

تەسىرى: جىگەر، ئالنىڭ ياللۇغى ۋە قېتىملىشى ئۈچۈن، ئاشقازان، بۆرەك ئاجىزلىقلىرى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.

54 - نۇسخا مەجۈنى مەشكى

تەركىبى: ئىمپار، قوۋزاق دارچىن، سۈمبۇل، سازەج ھىندى،

لەكى مەغسۇل، رەۋەنچىنى، جىنتىيانا رۇمى ھەر بىرى 6

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قىياپەتتە تۇرۇش
گرامدىن، زەپەر، جۇۋىنە، كەرەپشە ئۇرۇقى، مەستىكى
رۇمى ھەر بىرى 10 گرامدىن، ئۇد ھىندى، قەلەمپۇر، ھەر بىرى
4.5 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە. قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.
تەسىرى: ئاشقازان، جىگەر ئاغرىقى، جىگەر ئىششىقى،
جىگەر قېتىش، ئۆت ياللۇغى كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت
قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىمدىن ئىككى قېتىم.
غىچە 3 گرامدىن 6 گرامغىچە تاماقتىن كېيىن يەيدۇ.

55 - نۇسخا مەجۇنى ئەينىسۇن

تەركىبى: رۇم بەدىيان، فىتىرسالىيۇن، جۈتتەبەلىسۇت،
سىيادان، سەئدە كۇفى، قۇندۇز قەھرى، كاشىم، قىرەدمەنا،
سۈمبۇل، ھەببى بىلسان، جاۋاشىر، ھىڭ، ئەنجىدان، ئاسارۇن،
زەپەر ھەر بىرى 10 گرامدىن، سەكىنەج، ئىگىر، ئاچچىق بادام
مېغىزى، بەرگى سوزاپ، زىرە، جۇۋىنە، يالپۇز، تاغ سەۋزىسى
ئۇرۇقى، خولىنجان، قىزىلگۈل، جۈئە، زەنجىۋىل، غارىقۇت،
ھۇماما، كۆيدۈرۈلگەن بۇغا مۇڭگۈزى، ھەر بىرى 15 گرامدىن،
ھەسەل ئۈچ ھەسسە، قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، 3 گرامدىن 10
گرامغىچە يەيدۇ.

تەسىرى: بارلىق ئىستىسقا ئىتەبلى يەنى جىگەر ئاجىزلىقىدىن
جىگەر قاتقان، قورساق بوشلۇقىغا سۇ چۈشكەن، پۈتۈن

56 - نۇسخا مەجۇنى سۈمبۇل

تەركىبى: سۈمبۇل تىپ، ئىزخىرمەككى، ھەر بىرى 15 گرامدىن، زەپەر، رۇم بەدىيان، ھەر بىرى 3 گرامدىن، قارىمۇچ مۇقەل ھەر بىرى 6 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە. تەييارلىنىشى: قاندىن بويىچە تەييارلىنىدۇ. تەسرى: بارلىق ئاشقازان، جىگەرنىڭ سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلىرىگە ھەمدە جىگەردە پەيدا بولغان خالتىلىق، سۇلۇق ئۆسمە، قان تومۇردا پەيدا بولغان ئۆسمەلەرنى يوق قىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، 2 گرامدىن 15 گرامغىچە يەيدۇ.

57 - نۇسخا مەجۇنى بۇزۇرى

تەركىبى: قوۋزاق دارچىن، ھۇماما، سۈمبۇل، جۇۋنە، ئارپىبەدىيان، رۇم بەدىيان، كەرەپشە ئۇرۇقى، سىيسالىيۇس، قۇندۇز قەھرى، سېرىقچېچەك، زىراۋەندە، ئاسارۇن مەستىكى، ئىزخىرمەككى باراۋەر 30 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە، قاندىن بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: 3 گرامدىن 10 گرامغىچە ناشتىدىن

كېيىن يەيدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، جىگەر، تالنىڭ ئاغرىقلىرىنى پەسەيتىدۇ، قويۇق يەللەرنى تارقىتىدۇ.

58 - مەجۈنى تاباشىر

تەركىبى: قىزىلگۈل، تاباشىر ھەر بىرى 15 گرامدىن، سىماق 6 گرام، ئانار گۈلى، قاقىلە ھەر بىرى 3 گرامدىن، مەستىكى 1.5 گرام، ھەسەل بىر ھەسسە، ئالما شەربىتى ئىككى ھەسسە، قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 6 گرامدىن 15 گرامغىچە بېرىلىدۇ.

تەسىرى: ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي يارىسى ئۈچۈن ھەم جىگەرنىڭ ھۆللۈكىنى پەسەيتىش، ئىشتىھانى ئېچىش، ئۈس-سۈزلۈقنى پەسەيتىش، جىگەر پەردىسىنىڭ يىرىڭلىق ئىششىقى ھەم جىگەردە قۇرت پەيدا بولغان كېسەللىكلەرگە، جىگەر، ئۆت مەنبەلىك ئىچ سۈرۈش، بۇرۇن قاناش، كۆپ تەرلەشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

59 - نۇسخا مەجۈنى ماددە تۇلھايات

تەركىبى: پىلىپىل، قارىمۇچ، زەنجۈۋىل، قوۋزاق دارچىن،

زىراۋەن ، خوسسىيىتى سولەپ مىسىرى ، چىلغوزا
مېغىزى ، نارجىل ، ئامىلە مۇقەششەر ، بەلىلە پوستى ، شاترەنجى
ھىندى ، شاقاقۇل ، مۇسلى سىپىد ، كۈندۈر ، رەۋەنچىنى ، جوز-
بەۋۋا ، ئەنجۈر قېقى ، كۈنجۈت ھەر بىرى 30 گرامدىن ، بابونە 45
گرام ، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 100 گرام ، ھەسەل ئۈچ ھەسسە .
تەييارلىنىشى : ئۈزۈمدىن باشقا دورىلار پوستىدىن ئايرىپ ،
سوقۇلىدۇ ، ئۈزۈم ئايرىم سوقۇلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ھەسەلگە
ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ .

تەسىرى : بارلىق سوغۇقتىن بولغان پالەج ، لەقۋا ، ئۇنتۇ-
غاقلىق كېسەللىكلىرىگە ، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش ، ئەقلىنى زىيادە
قىلىشقا ، ئىشتىھا ئېچىش ، جىگەرنىڭ بارلىق سوغۇقتىن بول-
غان كېسەللىكلىرىگە ، بۆرەك كېسەللىكلىرى ، جىنسىي ئا-
جىزلىق كېسەللىكلىرىگە ، رەڭگىروپىنى ياخشىلاش ، ئېغىزنى
خۇشبۇي قىلىش ، چوڭ كىچىك تەرەت تۇتالمايدىغان ، مەنىي
بالدۇر يۈرۈپ كېتىش ، ئىستىسقا كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت
قىلىدۇ ، بۆرەك ، دۈۋساقىتىكى تاشلارنى پارچىلاش تەسىرىگە ئىگە .
ئومۇمەن پۈتۈن بەدەننى قۇۋۋەتلەش ، سوغۇقتىن ، يەلدىن بولغان
كېسەللىكلەرنى يوقىتىش تەسىرىگە ئىگە .

ئىشلىتىش ئۇسۇلى : كۈندە ئىككى قېتىم ، 3 گرامدىن 10
گرامغىچە تاماقتىن كېيىن يەيدۇ . ئىسسىقچان كىشىلەرگە زەرەر
قىلىدۇ ، سۈت بىلەن ئىچىلسە زەرەر قىلمايدۇ .

60 - نۇسخا مەجۇنى سوم

تەركىبى : پاكىزلانغان سامساق 270 گرام ، كالا سۈتى 600 گرام ، قەلەمپۇر ، جوزبەۋۋا ، بەسباسە ، پىلىپىل ، مەستىكى ، قاقىلە ، ھېلىلە كابىلى ، دارچىن ، زەنجىۋىل ، ھەر بىرى 30 گرامدىن ، ئۇدخام ، زەپەر ھەر بىرى 15 گرامدىن ، ھەسەل ئىككى كىلوگرام .

تەييارلىنىشى : سامساقنى ئوبدان سوقۇپ ، سۈت بىلەن قاينىتىپ ، سۈت تۈگىگەندە ھەسەلنى سېلىپ قىيامىغا كەلتۈرۈپ ، ئۇنىڭدىن كېيىن زەپەرنى سېلىپ باشقا دورىلارنى كېيىن سېلىپ تەييارلىنىدۇ .

تەبىئىتى : قۇرۇق ئىسسىق .

تەسىرى : بەلغەمدىن بولغان پالەج ، لەقۋا ، سەرئى ، رەئىشە ، جىگەر ، يۈرەك زەئىپلىشىش ، يۈرەك قېپىغا سۇ چۈشۈش ، جىگەردە سۇلۇق خالتىلىق ئىششىق پەيدا بولۇش ، غەيرىي بەلغەمدىن بولغان جىگەر كېسەللىكلىرىگە ھەمدە ئاقكېسەلگە ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ .

ئىشلىتىش ئۇسۇلى : 5 گرامدىن 15 گرامغىچە كۈندە بىر قېتىم بېرىلىدۇ . دورىنىڭ كەينىدىن رەيھان ، ئۈزۈم شەربەتلىرى ئىچسە ياخشى .

61 - نۇسخا مەجۇنى ئىترىفىل ھامان

تەركىبى: پوستى ھېلىلە كابىلى، پوستى بەلىلە، ئامىلە مۇقەششەر، ئەفتمۇن، بەرەنگى كابىلى، مۇقەششەر ھەربىرى 30 گرامدىن، توربۇت سېپىد 45 گرام، ئۇستقۇددۇس، بىستىپايەج ھەربىرى 21 گرامدىن، غارىقۇن 18 گرام، كۈندۈر، سەئدە كۇفى، قۇستى تەلخ، زەنجىۋىل، زۇپا ھەربىرى 10 گرامدىن، سەزەج ھىندى، شاترەنجى ھىندى، مەستىكى، رۇم بەدىيان، قەلەمپۇر، يالپۇز ھەربىرى 6 گرامدىن، قارىمۇچ، پىلىپىل، نار مىشكى ھەربىرى 12 گرامدىن، ھەسەل ئۈچ ھەسسە، قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: چىگەرنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاپ ماددا ئالمىشىش شىنى تەرتىپكە سالىدۇ. ئاقكېسەل، چاچ ساقالىنىڭ مۇددەتتىن بۇرۇن ئاقىرىپ كېتىشىگە، چىرايىنى گۈزەللەشتۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىش مىقدارى: ئەتىگەن ۋە كەچتە تاماقتىن كېيىن 6 گرامدىن 15 گرامغىچە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بېرىلىدۇ.

62 - نۇسخا مەجۇنى مۇمىسك

تەركىبى: تىغ تەگمىگەن خەشخاش 130 گرام، زەنجىۋىل 60

گرام، جوزبەۋۋا 6 گرام، زەپەر 3 گرام، ناۋات 270 گرام،
تەييارلىنىشى: خەشخاشنى سوقۇپ، قاينىتىپ، سۈزۈپ،
سۈيگە ناۋاتنى سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. قىيام سوۋۇغاندا، يۈ-
قىرىقى دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئارىلاشتۇرۇپ
تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: ئۇسسۇزلۇق، كۆپ سىيىشنى توختىتىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چۈشتە ۋە كەچتە تاماقتىن كېيىن 5
گرامدىن 15 گرامغىچە يەيدۇ.

63 - نۇسخا مەتبۇخى زىرىشكە

تەركىبى: زىخ (ئۇرۇقىدىن ئايرىلغان) 270 گرام، تۇخۇمى
كىشۇش، تۇخۇمى كاسىن ھەر بىرى 30 گرامدىن، رەۋەنچىنى 10
گرام، قائىدە بويىچە تەييارلىنىدۇ.
تەسىرى: جىگەرنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىپ، جىگەرنى
قۇۋۋەتلەپ، ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: تاماقتىن بۇرۇن 50 گرامدىن ئىچىدۇ.

64 - نۇسخا خىيار شەنبەر چىلانمىسى

تەركىبى: خىيار شەنبەر 150 گرام، تۇخۇمى كاسىن،
ئارپىبەدىيان، شوخلا ئەرەقلىرى 500 گرامدىن.

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە تېبابىتىدە قوللىنىش

تەييارلىنىشى: خىيار شەنبەرنى چالا سوقۇپ، يۇقىرىقى
تەرەقلەرگە، باز، كۈز كۈنلىرى تۆت سائەت، قىش كۈنلىرى
بولسا بىر سوتكا چىلاپ ئۇنىڭدىن كېيىن ئوبدان مىجىپ شىر-
نىسىنى چىقىرىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

تەسىرى: بارلىق جىگەر كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىل-
ىدۇ. تەرەتنى بوشىتىدۇ، سېرىقلىقنى كۆتۈرىدۇ. بولۇپمۇ
جىگەر قېتىش، جىگەر ئىششىقى، جىگەر سانجىقى ئۈچۈن ئالا-
ھىدە تەسىر قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چۈشتە، كەچتە تاماقتىن بۇرۇن 50
گرامدىن 100 گرامغىچە ئىچىدۇ.

پىلانلىغۇچى: ئېلىز ئاتاۋۇلا سارتېكىن
مەسئۇل مۇھەررىرى: ئەركىن ئالىم
مەسئۇل كوررېكتورى: خاسىيەت ئىبراھىم

جىگەر كېسەللىكلىرىنى ئۇيغۇر تىبابىتىدە داۋالاش

تۈزگۈچىلەر: روزىباقى ھاجى، ئېلىز ئابلىمىت

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى
(ئۈرۈمچى بۇلاقبېشى كوچىسى 66 - قورۇ، پوچتا نومۇرى: 830001)
شىنجاڭ شىنخۇا كىتاپخانىسى تارقاتتى
ئۈرۈمچى ئالتۇن يارۇق باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى
850×1168 مىللىمېتىر، 32 فورمات، 3.875 باسما نۇسخا
2004 - يىل 9 - ئاي 1 - نەشرى، 1 - قېتىم بېسىلدى
تىراژى: 1-3070

ISBN 7-5372-3822-7

باھاسى: 7.00 يۈەن

