

نېرۋانا جىزىقى
ئۇيغۇر تېبابىتىدە داۋالاش



شىنجاڭ پەن - تېخنىكا نەشىرىيەت نەشرىياتى (W)

مۇقاۋىنى لايىھىگۈچى: ئەنۋەر قاسىم

ISBN 7-5372-2174-X

R·274(民文) 定价, 3.20 元

ISBN 7-5372-2174-X



9 787537 221740 >

نېرۋا ئاجزلىقنى ئۇيغۇر تىبابىتىدە داۋالاش

تۈزگۈچى: مۇھەممەتتىياز ئابلىت ھاجى

ئۆزگەرتىش: 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

ISBN 7-337-2114-X

1. تىببىي ئىلمىي كىتابلار ① تىببىي ئىلمىي كىتابلار (تەبىئىي)

② تىببىي ئىلمىي كىتابلار ③ تىببىي ئىلمىي كىتابلار (تەبىئىي)

④ تىببىي ئىلمىي كىتابلار ⑤ تىببىي ئىلمىي كىتابلار (تەبىئىي)

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

چىنلىق ئۆزگەرتىش (CIP) 1998-يىلى 10-ئاي 10-كۈنى

شىنجاڭ پەن-تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى (W)

图书在版编目(CIP)数据

维吾尔医治疗神经衰弱:维吾尔文/买买提·阿不来提
阿吉主编. —乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1999.10
ISBN 7-5372-2174-X

I. 维… II. 买… III. ①神经衰弱-治疗-维吾尔语(中国少数民族语言)②维吾尔族-民族医学-维吾尔语(中国少数民族语言) IV. R749.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 65084 号

责任编辑 帕塔尔·马合木提

封面设计 艾尼瓦尔·卡斯木

* * *

新疆科技卫生出版社(W)出版
(乌鲁木齐市龙泉街 66 号 邮编 830001)

乌鲁木齐天平印刷厂印刷

新疆新华书店发行

* * *

787×1092 毫米 32 开本 2.25 印张
1999 年 10 月第一版 2002 年 7 月第二次印刷
印数:3000—6050 定价:3.20 元

نەشرىياتتىن

نېرۋا ئاجىزلىقى — كىشىلەر ئېتىراپ قىلىشنى خالىمايدىغان، ئەمما كۆپىنچە كىشىلەردە بولىدىغان، بىر خىل روھى كېسەللىك. ئۇنىمۇ باشقا مۇنتىزىم كېسەللىكلەرگە ئوخشاش ئەستايىدىل داۋالاشقا توغرا كېلىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر كۆپ ۋە مۇرەككەپ بولۇپ، ئاساسلىقى تۇرمۇش رىتىمىنىڭ قالايمىقانلىشىشى، ماددىي بايلىق بىلەن ئەمەلىي ئېھتىياج ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنىڭ چوڭىيىپ كېتىشى، ئىجتىمائىي تۈزۈم ۋە رېئاللىق بىلەن ماسلىشىش ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت، ئائىلىۋى كېلىشمەسلىك ھەمدە ئۆگىنىش، خىزمەت جەھەتلەردىكى خىلمۇ خىل بېسىم قاتارلىقلار ئۇندىن باشقا بەدەندىكى خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقنىڭ بۇزۇلۇشى، بەدەن بىلەن كىلىمات ۋە يېمەك-ئىچمەكنىڭ مۇناسىۋىتىدىكى تاسادىپىي ئۆزگىرىش-لەرمۇ نېرۋا ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا كۆز قاراش، چۈشەنچە ۋە تەدبىر جەھەتتىكى روشەن پەرقلەر تۈپەيلى كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا تۇغۇلغان زىددىيەت ۋە كۈرەشلەرمۇ نېرۋا ئاجىزلىقىنى پەيدا قىلىدىغان ۋاسىتە ھېسابلىنىدۇ. بۇنداق كېسەللىكنىڭ بىر قىسمى-مىنى خاس دورا بىلەن داۋالاشقا بولسىمۇ، يەنە بىر قىسمىنى شۇ كىشىنىڭ ياشاش مۇھىتىنى ئۆزگەرتىش، روھىي جەھەتتىن ياردەم بېرىش، يېمەك-ئىچمەك ۋە تۇرمۇش ئادىتىنى ئىسلاھ قىلىش ئارقىلىق داۋالاشقا بولىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتىدە، نېرۋا ئاجىزلىقىنى داۋالاشنىڭ ئۆزىگە خاس نەزەرىيە ۋە ئۇسۇللىرى ھەمدە يېتەرلىك دورا خىللىرى بار. ئۇيغۇر تېبابىتىدە خاس دورا ئىشلىتىپلا قالماي، بەلكى ئىنسانشۇناسلىق ئىلمىدىن پايدىلىنىپ، بىمارلارنىڭ مىزاجى، خىلىتى ۋە نۆۋەتتىكى ئىپادىسى كۆزىتىلىپ، ئۇلار ئۆزى قايىل بولىدىغان ئوچۇق داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. شۇڭا نېرۋا ئاجىزلىقى بىمارلىرى كۆپىنچە ئۆي-غۇر تېبابىتى شىپاخانىلىرىغا كۆرۈنۈشنى، ئەكس تەسىرى، بېقىنىشى بولمىغان دورىلار بىلەن داۋالانىشنى ياخشى كۆرىدۇ. دېمەك، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئەسلى ماھىيىتى بىمارنىڭ ماددىي ھالىتىنى تەتقىق قىلىپ، «مىقدار» بىلەن داۋالاشنى ئاساس قىلماستىن، بەلكى مەۋھۇم تەپەككۇر بويىچە كىشىلەرنىڭ «ئۆلچىگىلى بولمايدىغان» تەرەپلىرىنى ئىگىلەش ئارقىلىق ئۈنۈملۈك داۋالاش ئېلىپ بېرىشتىن ئىبارەت.

بۇ كىتابتا نېرۋا ئاجىزلىقىغا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تېبابىتى نەزەرىيىسى بويىچە چۈشەنچە بېرىلگەن بولۇپ، تەھرىرلەش جەريانىدا بىر قىسىم مۇجىمەل مەزمۇنلار چىقىرىۋېتىلدى. بىر قىسىم دورا ناملىرى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى بويىچە ئېلىندى ۋە بىرلىككە كەلتۈرۈلدى. بۇ كىتابتا نېرۋا ئاجىزلىقى ۋە ئۇنى داۋالاش ھەققىدىكى مەزمۇنلار ئانچە چوڭقۇر بولمىسىمۇ، يەنىلا پايدىلىنىش قىممىتى يۇقىرى بولۇپ، كېسەللەرنىڭ كېسەللىك ئازابىنى يېڭىش ۋە داۋالانىشىدا ياخشى مەسلىھەتچى بولالايدۇ.

مۇندەرىجە

- 1 نېرۋا ئاجىزلىقى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە
- نېرۋا سىستېمىسىنىڭ قىسقىچە فىزىئولوگىيەلىك خىزمەت
- 3 پائالىيىتى ۋە ماددىي مەركەزلىرى
- نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى
- 7 نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ كلىنىكىلىق ئالامەتلىرى
- 8 نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ تۈرلەرگە بۆلۈنۈشى
- 11 نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ ئەگەشمە كېسەللىك ئالامەتلىرى ...
- 17 نېرۋا ئاجىزلىقىغا دىئاگنوز قويۇش
- 18 دىئاگنوز قويۇش ئاساسلىرى
- 19 سېلىشتۇرما دىئاگنوزى
- 22 نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە دىققەت
- قىلىدىغان ئىشلار
- 25 ئانىلار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىلا بالىنىڭ نېرۋا پائالىيىتىنى ئاس
- راشقا ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك
- 26 تۇغۇت جەريانىدا مېڭە زەخمىگە ئۇچراش سەۋەبلىك نېرۋا
- ئاجىزلاشتىن ساقلىنىش
- 28 بالىلارغا تىنچلاندۇرغۇچى دورا ۋە غىدىقلىغۇچى يېمەك-ئىچمەك
- لەرنى بەرمەسلىك كېرەك
- 30 بالىلارغا روھىي جەھەتتىكى تەربىيىنى توغرا ئېلىپ
- بېرىش لازىم
- 31 ئەقلىي ئەمگەك بىلەن شۇغۇللانغۇچىلار نېرۋىنى مۇۋاپىق ئارام
- ئالدۇرۇشقا دىققەت قىلىشى كېرەك.
- 32

- تاماکا ۋە ھاراقنى ئاز ئىستېمال قىلىش نېرۋا ئاجىزلىشىش-
 34 تىن ساقلىنىش ئۈچۈن پايدىلىق
 35 جەلق (قولدا ئىشقاپ مەنىي كەلتۈرۈش)
 37 نېرۋا ئاجىزلىقنى داۋالاش
 37 ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش
 40 دورا بىلەن داۋالاش
 نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلىدىغان مۇرەككەپ دورا نۇسخىلىرى
 47 ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى
 47 شەرىپتى ئەۋرىشم
 48 شەرىپتى سۇمبۇل
 48 كېۋەز چېچىكى شەرىپتى
 49 شەرىپتى ئەفتمۇن مۇرەككەپ
 50 شەرىپتى فەرەنجىمىشكى
 50 خېمىرى ئەۋرىشم
 51 خېمىرى مەرۋايت
 51 خېمىرى گاۋزىبان
 52 داۋايلمىشكى مۆتىدىل
 52 ئىترىفىلى ئۇستقۇددۇس
 53 ئىترىفىلى سەغىر
 53 ماددەتۇلھايات
 54 مەجۈنى ئەفتمۇن
 54 مەجۈنى نۇجاھ
 55 لوبۇبى كەبىر
 55 مەجۈنى مەسھا

56	 مەجۈنى مۇنەۋۋىم
56	 سۇفۇپى مۇنەۋۋىم
56	 سۇفۇپى كەشنىزى
57	 تاتلىق بادام مېيى
57	 قاپاق مېيى
57	 رەۋغەنى مۇرەتتىپ
	نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم يەككە دورىلار
58	 ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى
58	 سېرىق ھېلىلە
58	 ئەفتمۇن (سېرىق يۆگەي)
59	 بادام شېرىن (تاتلىق بادام)
60	 چىلان
61	 گاۋزىبان
61	 ئادەمگىياھ (رىنشاك)
62	 زەپەر
63	 سۇمبۇل
63	 شازاندېرا
64	 قاپاق
64	 قىزىلگۈل
65	 كېۋەز چېچىكى
66	 ھەسەل
66	 ئۈستقۇددۇس
67	 پىلە غوزىسى (ئەۋرىشم)
67	 بادىرەنجى بۇيا

نېرۋا ئاجىزلىقى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە

نېرۋا ئاجىزلىقى ئۇزۇن مۇددەت روھى جىددىيلىشىش سەۋەبىدىن چوڭ مېڭە پوستلىقىنىڭ قوزغىلىشى ۋە تورمۇزلىنىشى جەريانىدىكى خىزمەت تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ، روھى پائالىيەت قالايمىقانلىشىش ۋە ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىقلار بىلەن ئىپادىلىنىدىغان بىر خىل كېسەللىك.

كىشىلەر كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە خىزمەت جەريانىدا ھەر خىل شەكىلدىكى زىددىيەتلەرگە دۇچ كېلىدۇ. كۆڭۈلگە ياقمايدىغان، بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولغان مەسىلىلەرگە يولۇقىدۇ. ئەگەر ئۇلارغا توغرا مۇئامىلە قىلىپ مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا زىددىيەت ئۈزلۈكسىز كەسكىنلىشىپ نېرۋا سىستېمىسىنىڭ نورمال خىزمەت پائالىيىتىگە تەسىر يېتىپ، مېڭىنىڭ قوزغىلىشى بىلەن تورمۇزلىنىش جەريانىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ نېرۋا ئاجىزلىقى كېلىپ چىقىدۇ.

بۇنداق كېسەل بىلەن ئاغرىغۇچىلارنىڭ ئومۇمىي بەدىنىدە ناھايىتى كۆپ ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ باش قېيىش، باش ئاغرىش، ئۇيقۇسىزلىق، ئەستە قالدۇرۇشى ناچارلىشىش، زېھنىنى يىغالاماسلىق، ماغدۇرسىزلىق ھېس قىلىش، خىزمەت ۋە تۇرمۇشتا بوشاڭلىق كەيپىياتى بولۇش، مەجەزى چۈسلىشىپ، ئاسان ئاچچىقلىنىپ كىشىلەرنى بىھۇدە رەنجىتىپ قويۇش، ئەر-ئاياللاردا ئوخشاشلا جىنسىي ھەۋەسى سۈسلىشىش ياكى جىنسىي ئاجىزلىق ئەھۋاللىرى پەيدا

بولۇپ ئۆزىگە ئىشەنچسىز قارايدىغان بولۇپ قالىدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقى جىسمانىي ئەمگەك قىلغۇچىلارغا قارىغاندا ئەقلىي ئەمگەك قىلغۇچىلاردا، ياشانغانلارغا قارىغاندا ياشلاردا، ئاياللارغا قارىغاندا ئەرلەردە كۆپ ئۇچرايدۇ. ئەمما ئاياللاردا نېرۋا ئاجىزلىقى كۆرۈلسە نىسبەتەن ئېغىر ئۆتىدۇ. كلىنىكىلىق تەجرىبىلەرگە ئاساسلانغاندا بىرلا ۋاقىتتا بىر قانچە خىل مەسىلىنى ئويلاپ بىر تەرەپ قىلىدىغان، كۈندىلىك خىزمەت پائالىيىتى جىددىيلىك بىلەن ئۆتىدىغان كىشىلەردە ۋە ئۇزۇن مۇددەت روھىي جەھەتتىكى قىيىنچىلىققا ئۇچرىغان كىشىلەردە كۆپ يۈز بېرىدۇ. بۇنداق كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك خىزمەت ۋە تۇرمۇشنى ئورۇنلاشتۇرۇشى مۇۋاپىق بولماي داۋاملىق بىئارامچىلىق ئىچىدە ياشايدۇ. بۇ كېسەللىكنى مۇۋاپىق داۋالانغاندا ياكى ساقىيىشقا ئائىت بىر قىسىم تۇرمۇش تەرتىپلىرىنى بىلىۋېلىپ رىئايە قىلىنسا تېزلا ساقىيىپ كېتىدۇ. ئەگەر ئېتىبارسىز قاراپ كېسەللىك ئۆزۈنغا سوزۇلسا باشقا ئېغىر ھالدىكى روھىي كېسەللىكلەرگە دۇچار قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

بىزنىڭ مەشھۇر تېۋىپلىرىمىزدىن بىرى بولغان ھاجى ئابدۇلھەمىد مېدىۇسوفى نېرۋا ئاجىزلىقى داۋاملىشىۋەرسە مالبېخۇلىيا (يەڭگىل-دەرد-جىددىكى ساراڭلىق) ياكى جۇنۇن (ئېغىر دەرىجىدىكى ساراڭلىق) قا ئېلىپ بارىدۇ، دەپ يازغان. شۇڭا خىزمەتتە نەتىجە قازىنىش، تۇرمۇشنى شاد-خۇرام ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش تەدبىرلىرىنى بىلىۋېلىش ئىنتايىن مۇھىم.

نېرۋا سىستېمىسىنىڭ قىسقىچە فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت پائالىيىتى ۋە ماددىي مەركەزلىرى

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ زادى قانداق كېسەللىك ئىكەنلىكىنى بىلىش-
تىن ئاۋۋال نېرۋا سىستېمىسىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت پائالىيىتى
ۋە ماددىي مەركەزلىرىنى قىسقىچە ئىگىلەشكە توغرا كېلىدۇ.
نېرۋا سىستېمىسى بەدەندىكى ھەر قايسى سىستېما، ئەزالارنىڭ
پائالىيىتىنى باشقۇرۇشى، ئورۇنلاشتۇرۇشى ۋە تەكشۈش ئارقىلىق پۈ-
تۈن بەدەننىڭ ھەرىكىتىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ ئوبىيېكتىپ مۇھىتقا
ماسلاشتۇرۇش رولىنى ئوينايدىغان رەئىس (باشقۇرغۇچى) ئەزالارنىڭ
بىرى بولۇپ، ئۇ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى ۋە ئەتراپ نېرۋا سىستې-
مىسىدىن ئىبارەت چوڭ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. مەركىزىي نېرۋا
سىستېمىسى باش بوشلۇقى ۋە ئومۇرتقا كانلى ئىچىگە جايلاشقان
مېڭە، يۇلۇندىن ئىبارەت بولۇپ، تەھلىل قىلىش، ئومۇملاشتۇرۇش،
يىغىنچاقلاش رولىنى ئوينايدۇ.

ئەتراپ نېرۋا سىستېمىسى بولسا ئاساسەن نېرۋا ئىمپۇلسلىرىنى
ئۆتكۈزۈپ، مەركىزىي نېرۋىغا يەتكۈزۈپ بېرىش رولىنى ئوينايدۇ.
تەپەككۇر قىلىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھېسسىيات قاتارلىق روھىي پائالى-
يەتلەر نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئەڭ ئالىي قىسمى بولغان چوڭ مېڭە
پوستلاق قىسمىنىڭ خىزمەت پائالىيىتى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ.
ئۇزۇن يىل ئۇيغۇر تېبابىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ ئالەمدىن ئۆت-
كەن بىزنىڭ مەشھۇر تېۋىپلىرىمىز نېرۋىنىڭ خىزمەت پائالىيىتىنى

ئىنچىكىلىك بىلەن تەتقىق قىلىپ، مېڭىدە سەزگۈ، ھەرىكەت كۈچلە-
رى (قۇۋايى نەپسانىيە) نىڭ بارلىقىنى شەرھلەپ، خېلىلا مۇكەممەل
چۈشەنچە بەرگەن.

مانا بۇ سەزگۈ، ھەرىكەت كۈچلىرىنىڭ مەركىزى مېڭىدە بولۇپ،
سەزگۈ كۈچلەر (قۇۋايى مۇدىرىكە) ئىنسانلارنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى
ئەزالىرىدىن كەلگەن ھەر خىل تۇيغۇ ياكى تەسىراتلارنى سەزگۈچى
كۈچ بولۇپ، تاشقى سەزگۈچى كۈچلەر (كۆز، قۇلاق، بۇرۇن، تىل
ۋە تېرىلەر) سىرتقى مۇھىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ قوبۇل قىلغان
سىزىملارنى كۆرسىتىدۇ. بۇ تاشقى سەزگۈچى كۈچلەر قوبۇل قىلغان
سىزىم باش-مېڭە ئالدىنقى قىسمىغا، يەنى ئەقلىي تەپەككۇر مەركىزىگە
يەتكۈزۈلىدۇ. ئەقلىي تەپەككۇر مەركىزى ئىچكى سىزىم كۈچى دەپ
ئاتىلىپ 5 تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

1. ئورتاق ھېس قىلىش كۈچى (ھېسسىي مۇشتەرەك)
بەش خىل تاشقى سەزگۈ ئەزا ئارقىلىق ھېس قىلىنغان نەرسە-
لەرنىڭ تۈرلۈك تەسىراتلىرىنى يەنى ئىسسىق-سوغۇقلۇقى، چوڭ-كە-
چىكىلىكى ۋە باشقىلارنى مۇشۇ كۈچ قوبۇل قىلىپ بىرلىككە كەلتۈرۈپ
ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ. بۇ كۈچنىڭ مەركىزى چوڭ مېڭىنىڭ
ئالدىنقى تەرىپىدە بولىدۇ.

2. ئويلاش، خىيال قىلىش، ئەسلىش كۈچى (قۇۋايى مۇتخەييىلە)
تاشقى سىزىم ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان تۈرلۈك شەكىل، سۈرەت-
لەر ئورتاق ھېس قىلىش كۈچى ئارقىلىق ئۇنىڭ مەركىزىدە ساقلىنىپ

قالدۇ، ئەگەر ھېس قىلدۇرۇشقا سەۋەب بولغان شەيئىلەر يوقالسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ سۈرىتى، تەسىرى ئويلاش، خىيال قىلىش كۈچى ئارقىلىق ھەمدە ئۇنىڭ مەنىسى، ماھىيىتى ئەستە تۇتۇش كۈچى ئارقىلىق ساقلىنىپ تۇرىدۇ. شۇڭا شەيئىلەرنىڭ سۈرىتى، ماھىيىتىنى ئۇنتۇپ قېلىش ئەسلەش كۈچىنىڭ ئاجىزلىقىدىن، ئىسمى، شەكلىنى ئۇنتۇپ قېلىش ئويلاش كۈچىنىڭ ئاجىزلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

3. ھۆكۈم قىلىش كۈچى (قۇۋۋىتى مۇتەسەررىخە)

بۇ باش مېڭە ئالىي نېرۋا ھەرىكىتىنىڭ تەپەككۇرى بولۇپ، ئەقىل ۋە ئىدراكنى باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىش مەركىزىدۇر. ئۇ ئويلاش كۈچىدە ساقلانغان مەھسۇلاتلارنىڭ سۈرەتلىرىنى بىر-بىرىدىن ئاجرىتىپ ياكى قۇراشتۇرۇپ، ئۇنىڭدىن يەكۈن چىقىرىدۇ. ھۆكۈم قىلىش كۈچى كۈچلۈك بولغان ئادەملەرنىڭ ئەقلىي تەپەككۇر قابىلىيىتى ئۈستۈن بولۇپ، ئوبيېكتىپ شارائىت ۋە قانۇنىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان خىياللارغا بېرىلمەيدۇ. بۇنداق كىشىلەر مەيلى قانداقلا ئىش قىلسۇن ئىجتىمائىي مۇھىتقا بولغان تونۇشى ۋە ئۇنىڭغا ماسلىشىشى، پىكىر قىلىشى توغرا بولۇپ، تۈرلۈك ئىش-ھەرىكەتلىرىدە نەتىجىگە ئېرىشەلەيدۇ. باشقىلارنىڭ قوللىشىغا مۇيەسسەر بولالايدۇ. ئەگەر ھۆكۈم قىلىش كۈچى ئاجىزلىشىپ قالسا ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان خىياللارنى قىلىپ پاكىتسىز، يولسىز سۆزلەپ مەسىلىلەرگە توغرا يەكۈن چىقىرالماي، رېئاللىقتىن چەتنەپ كېتىپ ئىجتىمائىي مۇھىتقا ماسلاشالمايدۇ. ھۆكۈم قىلىش كۈچىنىڭ ئورنى باش مېڭىنىڭ ئالدىنقى

قىسمىدا بولۇپ قوماندانلىق مەركىزى دەپ ئاتىلىدۇ.

4. قوغدىنىش كۈچى (قۇۋۋىتى ۋاھىمە)

بۇ كۈچ شەيئى ۋە ھادىسىلەرنىڭ پايدا-زىيان، ياخشى-يامان تەرەپلىرى ۋە ئارزۇ-ھەۋەس، قايغۇ-ھەسرەت قاتارلىقلارنى مۇھاكىمە قىلىدىغان كۈچ بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ شەيئىلەر ۋە مەسىلىلەرگە نىسبەتەن يۈزەكى يوسۇندا قارىماستىن، بەلكى ئۇنىڭ ئاقىۋىتىگە توغرا قاراپ پايدىلىق ياكى زىيانلىق تەرىپىنى ئويلاپ، يامان ئىشلاردىن ئۆزىنى تارتىپ توغرا، دانا تەپەككۇر قىلىش قوغدىنىش كۈچىنىڭ خىزمەت پائالىيىتىنىڭ نورماللىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

قاتتىق روھىي ئازاب چەككەن، قورقۇنچلۇق ھادىسىلەرگە ئۇچرىغان ۋە نەشە، ئەپيۈن چېكىش بىلەن شۇغۇللانغان كىشىلەرنىڭ قوغدىنىش كۈچى ياخشى بولمايدۇ. بۇنداق كىشىلەر پايدىسىز بولغان تۈرلۈك مەسىلىلەردىن ئۆزىنى چەتكە ئالالماي زىيان تارتىدۇ.

5. ئەستە ساقلاش كۈچى (قۇۋۋىتى ھاپىزە)

بۇ نېرۋا سىستېمىسىدا ئەكس ئەتكەن بارلىق شەكىل ۋە مەزمۇنلارنى ساقلايدىغان مۇھىم كۈچ بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدا قىلغان ئىشلىرى، ئۆگەنگەن ھۈنەر-سەنئەت، ئەقلىي بىلىملىرىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قويماسلىقى ئەستە ساقلاش كۈچىنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق بولىدۇ. ئەگەر مۇشۇ مەركەزنىڭ خىزمىتىدە بۇزۇلۇش بولسا ياكى ئاجىزلاشسا ئىنسانلارنىڭ ئېسىدە ساقلاش ۋە خاتىرە قالدۇرۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ، ئۇنۇتقا قلىق ھەم نېرۋا ئاجىزلىقى

كېسەللىكى كېلىپ چىقىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى

ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملاشقان كۆڭۈلسىزلىك، ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچ-
راش كەلتۈرۈپ چىقارغان روھىي زەخمىلىنىش بۇ كېسەللىكنى پەيدا
قىلغۇچى ۋە قوزغاتقۇچى ئامىل بولۇپ، نېرۋا سىستېمىسىنىڭ چىدام-
چانلىقىنى بۇزۇپ تاشلاپ نېرۋىنى زەئىپلەشتۈرىدۇ. شۇنداقلا ئۇزۇن
مەزگىل كاللىسىدا زىددىيەت پەيدا قىلىدىغان بىر قاتار چېگىش
مەسىلىلەر نېرۋا پائالىيىتىنىڭ زىيادە جىددىيلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چى-
قىرىپ، مېڭىنىڭ قوزغىلىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، تورمۇزلىنىش ھالىتى-
نى ئاجىزلاشتۇرۇش سەۋەبلىك پەيدا بولىدۇ. ئومۇم بەدەن ئاجىزلىقى،
ئوزۇقلىنىشنىڭ تەرتىپلىك ۋە ياخشى بولماسلىقى، كۆپ مىقداردا قان
يوقىتىش، ئاياللاردىكى ھەيز قالايمىقانلىشىش، تۇرمۇش ئادىتىنىڭ
نامۇۋاپىق بولۇشى، جىنسىي مۇناسىۋەتنىڭ زىيادە كۆپ بولۇپ كېتى-
شى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى نېرۋا خىزمىتىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇ-
رۇپ، نېرۋا ئاجىزلىقى پەيدا بولۇشقا سەۋەب بولىدۇ. مەشغۇلات تۈرى
كۆپ بولۇپ، بىر كۈن ئىچىدە بىر قانچە تۈرلۈك خىزمەتلەرنى
بېجىرىدىغان ۋە نەچچە خىل مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىدىغان،
كەيپىياتى جىددىيلىك ئىچىدە ئۆتىدىغان كىشىلەردە ھەر خىل دەرد-
جىددىكى زېھنى ھارغىنلىق ۋە روھىي چارچاش تۈپەيلىدىن نېرۋا
ئاجىزلىقى كېلىپ چىقىدۇ. ھاراق، نەشە، تاماكا، ئەپيۈن، خىروئىن

ۋە مورفىن تۈرىدىكى دورىلار قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلغۇچى كىشىلەردە مېڭىنى زەھەرلەپ، مېڭىنىڭ نورمال قان ئايلىنىشى ۋە ماددا ئالماشتۇرۇشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش نەتىجىسىدە نېرۋا ئاجىزلىقى كېلىپ چىقىشقا سەۋەبچى بولىدۇ.

بىر قىسىم بەدەننى خوراتقۇچى كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىش، مەسىلەن: دىئابت كېسەللىكى، كېزىك، سىل، مېڭە پەردە ياللۇغى، ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشى، سوزۇلما جىگەر ياللۇغى كېسەللىكلىرىدە ئوخشاشلا بەدەن ئاجىزلىشىش بىلەن مېڭىنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىنىشى يېتەرلىك بولماي، نېرۋىنىڭ ھەر خىل سىرتقى تەسىرلەرگە بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش سەۋەبلىك نېرۋا ئاجىزلىقى كېلىپ چىقىدۇ. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ خىلىت نەزەرىيىسى بويىچە قارىغاندا، يۇقىرىقىلاردىن باشقا نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكى تۆت خىلىت (قان، سەپرا، بەلغەم، سەۋدا) نىڭ بەدەندىكى تەڭپۇڭلۇق قىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن سۈپىتى ئۆزگىرىپ (غەيرىي تەبىئىي) كېتىپ، قان بىلەن نېرۋا سىستېمىسىغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن، نېرۋا ھۈجەيرە رىلىزىنىڭ نورمال ماددا ئالماشتۇرۇشى ۋە ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىپ، مېڭىنىڭ خىزمىتىنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، ئاخىرىدا نېرۋا ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ كلىنىكىلىق ئالاھىەتلىرى

كېسەل كىشىنىڭ كېسەللىك زارى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، باش

قېيىش، باش ئاغرىش، ئۇيقۇسى كەلمەسلىك، يېقىنقى ئىشلارنى ئېسىدە قالدۇرۇشى ناچارلىشىش، دىققەت كۈچىنى يىغالماسلىق، ئومۇم بەدەنلىك ھارغىنلىق ھېس قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللاردىن شىكايەت قىلىدۇ. دائىم كۆڭلى پەرىشان، ئەندىشلىك بىلەن ئۆتدۇ. قالايمىقان چۈشلەرنى كۆپ كۆرىدۇ. ئەمما چۈشىنى ئەسلىيەلمەيدۇ. مەجەزى چۇس، ئاچچىقى تېز كېلىدىغان، كەيپىياتى جىددىي بولۇپ قالىدۇ. يۈرىكى تېز سوقىدۇ. قىسمەن بىمارلاردا يۈرەك ھەرىكىتى قالايمىقانلىشىدۇ. بەزى ۋاقىتلاردا يۈرەك ھەرىكىتى ئاستىلىشىپ قالىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئېغىرلىشىشىغا ئەگىشىپ ئۇيقۇسىزلىق كۈچىيىپ بىر سوتكىدا 4~3 سائەتلا ئۇخلايدىغان ھالەتكىمۇ چۈشۈپ قالىدۇ. ئۇيقۇسىزلىق سەۋەبىدىن كۈندۈزلىرى ھارغىنلىق ھېس قىلىپ تۈرلۈك مەشغۇلاتلارگە خوشياقمايدىغان، ئىش قىلغۇسى كەلمەيدىغان، داۋاملىق بىئاراملىق ھېس قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. پىكىر-خىيالى چېچىلاڭغۇ بولۇپ، ئورۇنسز سۆزلەرنى كۆپ قىلىدىغان ھەتتا ئادەتتىكى مەسىلىلەرنى مۇرەككەپلەشتۈرۈپ ئارتۇقچە ئويلاپ باشقىلەرگە زىت گەپلەرنى قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. نەتىجىدە كىشىلەر بىلەن چىقىشالمايدۇ. قورقۇنچاق ۋە تارتىنچاق بولۇپ، ئادەم كۆپ جايدا تۇرۇشتىن خىجىللىق ھېس قىلىدىغان، كۆپچىلىك ئارىسىدا سۆزلەشكە جۈرئەت قىلالمايدىغان، سۆزلىگەندە پىكىرنى يىغالمىي ئورۇنسز گەپ قىلىدىغان، داۋاملىق كاللىسىدا بىر خىل ھەل بولماي كېلىۋاتقان چېگىش مەسىلە باردەك غەمكىن يۈرۈيدىغان، ئازغىنە كېلىشمەسلىكلەر ئۈچۈن ئۆزىچە

يىغا بېسىپ ئۆزىنى تۇتۇۋالمايدىغان ئەھۋال شەكىللىنىدۇ. داۋاملىق خىزمەت، تۇرمۇش ئىشلىرىدىن نارازى بولغاندەك ئىشەنچسىز قارايدۇ. ھەر قانداق ئىشقا گۇمان بىلەن قاراپ تۇرلۇك مەشغۇلاتلىرىگە بولار-مۇ؟ بولماسمۇ؟ دېگەندەك خىيالدا بولىدۇ. بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا جۈرئەت قىلالمايدۇ ياكى بىر ئىشقا تېزلا قىزىقىپ ئاسانلا كۆڭلى سوۋۇپ كېتىدۇ. كۈچلۈك يورۇقلۇق ياكى يۇقىرى ئاۋازلەرگە بىخەتەرلىك بېرىلمەيدۇ. كۆزى تۈرلۈشۈش، قۇلاق غوڭغۇلداش، پۇت-قوللىرى سىرقىراپ ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئىشتىھاسى تۈ-تۈلۈش ئالامەتلىرى تەدرىجىي قوشۇلۇپ كېلىپ ئۆز ھاياتىدىن ئۈ-مىدىسىزلىنىدىغان ياكى بەدىنىدە ئېغىر بىر خىل كېسەللىك باردەك تۇيغۇ پەيدا بولۇپ قالىدۇ. كېسەل كىشى دائىم ئۆزىنى باشقىلاردىن تۆۋەن كۆرىدۇ. ئازراق ھەرىكەت قىلسا يۈرىكى سالىدۇ. ھەمىشە بېشى ئېسىلگەندەك سېزىم بولىدۇ. نېرۋىنىڭ قوزغىلىشچانلىقى يۇقىرىلاپ كەتكەچكە بەدەن ئىچىدىكى ئۆزگىرىش بىلەن ئىچكى پائالىيەتنىڭ ھەممىسىنى سېزىپ گۇمانىي كېسەللىك ئۇقۇمى پەيدا بولىدۇ. ۋاقىت-لىق يۈرەك سېلىش ياكى تومۇر سوقۇشى تېزلىشىش كۆرۈلسە يۈرەك كېسىلىدىن گۇمان قىلىدۇ. دائىم بېشى ئاغرىغاچقا مېڭە ئۆسمىسىدىن گۇمان قىلىدۇ. دەرۋەقە ئىچكى ئەزالاردىكى تۈرلۈك ئۆزگىرىشلەرگە دىققەت بىلەن قاراپ ھەر خىل ئەندىشىلىك كېسەللىكلەردىن گۇمان قىلىپ، ھەمىشە يامان كېسەللىككە گىرىپتار بولغان ئوخشايمەن دەپ ۋەھىمە ئىچىدە تۇرىدۇ. بىراق دوختۇر تەكشۈرگەندە باشقا كېسەللىك

سېزىلمەيدۇ. قان بېسىمى يۇقىرىلاش ياكى ۋاقىتلىق تۆۋەنلەش كېلىپ چىقىدۇ. نەپىسى سىقىلىدۇ. قورساق كۆپىدۇ. قەۋزىيەت ياكى ئىچى سۈرۈش پەيدا بولىدۇ. سۈيدۈك كۆپىيىدۇ. ئاياللاردا ھەيز قالايماقلىق شىدۇ. ئەرلەردە ئېھتىلام بولۇش، مەنىي تۇتالماسلىق، جىنسىي ئىقتىدارى ئاجىزلاش ياكى يوقىلىش ئىپادىلىرى بولىدۇ. بىر قىسىم بىمارلار جىمغۇر، سۆزلىمەس، كۆپ ئۇخلايدىغان، بىرەر قانداق ئىش-ھەرىكەت قىلغۇسى كەلمەيدىغان، ھورۇن بولۇپ قالىدۇ. يۇقىرىقى كېسەللىك ئالامەتلىرى ھەممە بىماردا بىرلا ۋاقىتتا كۆرۈلمەسلىكى مۇمكىن. كېسەللىكنىڭ تەرەققىياتى، ئېغىر-يېنىكلىكىگە قاراپ مەلۇم بىر قىسىملىرى ياكى كۆپ قىسىم ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ تۈرلەرگە بۆلۈنۈشى

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىك سەۋەبى ۋە ئالامەتلىرىگە قاراپ قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى، زەئىپلىشىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى، ئارىلاشما تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى، خىلىتلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇشتىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى، زەھەرلىنىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى دەپ 5 تۈرگە بۆلۈنىدۇ. بۇنداق تۈرلەرگە ئايرىش كلىنىكىدا دىئاگنوز قويۇش ۋە داۋالاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە، شۇنداقلا بىمار سالامەتلىكىنىڭ تېز ئەسلىگە كېلىشىدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ.

1. قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىش تېپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ بۇ خىل تىپىدە بىمارنىڭ نېرۋىسى زىيادە سەزگۈر بولۇپ، ئاۋاز ۋە يورۇقلۇقنىڭ غىدىقلىشىغا قارىتا پەۋقۇلئاددە سەزگۈر بولىدۇ. ۋاراڭ-چۇرۇڭ مۇھىتتا دائىم بىئاراملىق ھېس قىلىدۇ. كەيپىياتى مۇقىم بولماي ئاسان ئاچچىقلىنىدۇ. دائىم كىچىك ئىشلار سەۋەبىدىن باشقىلارنى رەنجىتىدىغان ئۇرۇشقاق بولۇپ قالىدۇ. ئۇيقۇ-سى ئازلاپ كېتىدۇ ياكى ئۇخلىغاندا كۆپ چۈش كۆرۈپ ئاسانلا ئويغىنىپ كېتىدۇ. بېشى چىمىلداپ ئاغرىش، يۈرەك سېلىش، قورساق قىسمى يېقىمسىزلىنىش قاتارلىقلاردىن شىكايەت قىلىدۇ ياكى ساقايىماس كېسەللىككە گىرىپتار بولۇپ قالغاندەك ۋەھىمە ئىچىدە گۇمان قىلىدۇ. كېچىسى ئۇيقۇسى كەلمەي ئۆتكەن ئىشلەرنى بىر-بىر ئەسلەپ بولىمى-غۇر خىياللارنى سۈرۈپ ياتىدۇ، ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرغاندا خۇددى شۇ كۈنى بىرەر كېلىشمەسلىك يۈز بېرىدىغاندەك ئارتۇقچە خىياللاردا بولىدۇ. دائىم روھىي جىددىيلىك بىلەن ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈپ بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمايدۇ. ئاياللاردا ھەيز قالايمىقانلىشىش، ماغدۇر-سىزلىق، يولدىشىنىڭ قىزغىن مۇھەببىتىگە ئېرىشەلمەسلىك ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە، ئەرلەردە مەنىي تۇتالماسلىق ياكى مەنىي تېز كېتىش، جىنسىي ئاجىزلىق ياكى جىنسىي ئىقتىدارى يوقىلىش ئالامەتلىرى يۈز بېرىپ، جىنسىي تۇرمۇشى كۆڭۈللۈك بولمايدۇ. دائىم باش قېيىش، باش ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ھارغىنلىق ھېس قىلىش، يۈرىكى سېلىپ نەپىسى قىيىنلاشقانداك سېزىم پەيدا بولۇش ئەھۋاللىرى

كۆرۈلىدۇ. ئەستە قالدۇرۇش كۈچى زىيادە ئاجىزلاپ كېتىدۇ.

2. زەئىپلىشىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى

بىمار روھىي جەھەتتە خامۇش ھالغا كىرىپ قالىدۇ. ناھايىتى جىمغۇر بولىدۇ. بىرەر ئىش-ھەرىكەت قىلىشقا ياكى ئۆزىنىڭ كۈندۈزلىك مۇھىم ئىشلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا خۇش ياقمايدۇ. دائىم يېتىۋېلىشقا ئامراق بولۇپ قالىدۇ. روھىي كەيپىياتى سۇس، چىرايى سۇلغۇن قىياپەتتە بولۇپ، كۆپچىلىك بىلەن بىر يەردە تۇرۇشنى خالىمايدىغان، دائىم ئادەم يوق جايدا تەنھا تۇرۇشقا ئامراق بولۇپ قالىدۇ. كۆپ مۈگىدەيدۇ. بىراق ئۇيقۇسى ئانچە ياخشى بولمايدۇ. ھارغىنلىق ھېس قىلىدۇ، ئېغىزىدىن شال ئاقىدۇ.

3. ئارىلاشما تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى

نېرۋا ئاجىزلىقنىڭ بۇ خىل تىپى بىر قەدەر مۇرەككەپ بولۇپ، ئايرىش تەسەرەك. بىمارنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كۆزەتكەندە بىر قىسىم بەلگىلىرى قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئوخشاپ كەتسە، يەنە بىر قىسىم ئالامەتلىرى زەئىپلىشىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئومۇمەن قارىغاندا ھەر ئىككى خىل نېرۋا ئاجىزلىقنىڭ ئالامىتى بىمارنىڭ شىكايىتى ياكى بەدەن ھالىتىدە تېپىلىدۇ. شۇنىڭغا ئاساسەن ئارىلاشما تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقى دېگەن قاراش مۇقىملاشتۇرۇلسا بولىدۇ.

4. زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك نېرۋا ئاجىزلىقى
زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك نېرۋا ئاجىزلىقى تاشقى مۇھىتتىكى
زەھەرلىك ماددىلارنىڭ ھەر خىل يوللار ئارقىلىق بەدەنگە تەدرىجى
كېرىپ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ خىزمىتىنى مەلۇم دەرىجىدە
قالايمىقانلاشتۇرۇشىدىن پەيدا بولىدۇ. كلىنىكىدا CO_2 دىن زەھەرلە-
نىش، ئورگانىك فوسفوردىن زەھەرلىنىش ۋە ئىسپىرتتىن زەھەرلىنىش
ئەھۋاللىرىدا كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇنداق بىمارلاردا كەيپىياتى مۇقىم
بولماسلىق، روھىي جەھەتتىن چۈشكۈنلىشىش، ئالدىراڭغۇلۇق، ئار-
تۇقچە ئەندىشىنى كۆپ قېلىش، ئەستە تۇتۇش توسقۇنلۇققا ئۇچراش،
باش ئاغرىش، باش قېيىش ۋە ئۇخلىيالماسلىق، مۈچىلىرى قولۇشۇش،
مۇسكۇللىرى تىترەش، تارتىشىش، كۆپ سۆزلەش، ھەرىكىتى كۆپ-
يىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تېز سۈرئەتتە ئورۇقلايدۇ، چىرايى نۇر-
سىز، تاتىراڭغۇ كۆرۈنىدۇ. ئېغىرلاشقاندا ھەرىكىتىنى باشقۇرالمىي بىر
ئاز دەلدەڭشىپ ماڭىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

5. خىلىتلارنىڭ نورمال تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىققان
نېرۋا ئاجىزلىقى

بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقى ئادەم بەدىنىدە بار بولغان قان، سەپرا،
بەلغەم، سەۋدا ماددىلىرىنىڭ سان ۋە سۈپىتى جەھەتتىن ئۆزگىرىپ،
قان ئېقىمى ئارقىلىق مېڭىگە يېتىپ بېرىپ، مېڭە ھۈجەيرىلىرىنىڭ
نورمال قان ئايلىنىشى، ئوزۇقلىنىشى، ماددا ئالماشتۇرۇشىغا ئوخشىمى-
غان دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىشى نەتىجىسىدە نېرۋىنىڭ فىزىئولوگى-

يىلىك خىزمەت پائالىيىتىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىشى ۋە قالايمىقانلا-
شتۇرۇشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقنىڭ كېلىپ
چىقىش مەنبەسى ۋە خاراكتېرى بىر-بىرىگە ئوخشاش بولمىغىنى
ئۈچۈن تۆت خىل ئاتىلىدۇ.

(1) زەئفى ئەسەبدە مەۋى (قان مەنبەلىك نېرۋا ئاجىزلىقى)
بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغان بىمارلارنىڭ چىرايى
قىزىلغا مايىل، بەدىنى سېمىز رەڭ بولۇپ، باش ئاغرىش، باش قىيىش
ئېغىرراق بولىدۇ. پۇت ۋە ئۈستىخانلىرى تېلىپ ئاغرىدۇ. روھىي
كەيپىياتنى غىدىقلايدىغان سىرتقى تەسىرلەرگە ئۇچرىغاندا ھېسسىياتى
ئاستا قوزغىلىدۇ. جىددىيلىشىش، ئاچچىقلىنىش ئىپادىلىرى نىسبەتەن
ئاستىراق بولۇپ، كېيىن ئۆزىنى تۇتۇۋالماي بارغانسېرى كۆتۈرۈلۈپ
كېتىدۇ. كەيپىياتى ئاسانلىقچە بېسىقمايدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقىغا مېگە قان
تومۇر قېتىش، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكى كۆپىنچە ھالەتتە
قوشۇلۇپ كېلىدۇ. تومۇرى دولقۇنلۇق ئاستا سالىدۇ.

(2) زەئفى ئەسەپ سەپراۋى (سەپرا مەنبەلىك نېرۋا ئاجىزلىقى)
بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغان بىمارلارنىڭ چىرايى
سېرىققا مايىل بولۇپ، سىرتقى روھىي غىدىقلىنىشلارغا ئۇچرىغاندا
ناھايىتى تېزلا جىددىيلىشىدۇ. ئاسانلا ئاچچىقلىنىپ كۆڭلى پەرىشان
بولىدۇ. ئۇيقۇ كەملىك ئالامىتى نىسبەتەن ئېغىر بولىدۇ. تومۇرى
ئىنچىكە، تېز سالىدۇ. كۆز ئېقى ۋە تىلىدىكى گەز سارغۇچ بولۇپ،
بىمارنىڭ ئۇسسۇلۇقى كۆپ بولىدۇ. ھەرىكىتى كۆپىيىپ، بىر يەردە

تۇرسا ئىچى تىتىلدايدۇ.

(3) زەئفى ئەسەپ بەلغىمى (بەلغەم مەنبەلىك نېرۋا ئاجىزلىقى)
بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغان بىمارلارنىڭ چىرايى
ئاقۇش، بەدىنى سېمىزەك، تېرىلىرى يۇمشاق بولۇپ، تومۇرى ئاستا
سوقىدۇ. كۆز ئېقى كۆكۈشكە مايىل ئاق بولىدۇ. تىل شىللىق
پەردىلىرى ئاق بولۇپ، ئېغىزىدىن شۆلگەي ئېقىپ قالىدىغان ئەھۋال
كۆرۈلىدۇ. بەدىنىنى تۇتقاندېمۇ ۋە بىمارنىڭ ئۆزىگىمۇ سوغۇق سېزد-
لىدۇ. بىماردا كۆپىنچە جىمغۇرلۇق، خامۇشلۇق ئەھۋاللىرى پەيدا
بولۇپ، سىرتقى تەسىرلەرگە بولغان ئىنكاسى ئاستا بولىدۇ. كۆپرەك
يېتىۋېلىشقا ئامراق بولۇپ قالىدۇ. يالغۇزلۇقنى خالايدۇ.

(4) زەئفى ئەسەپ سەۋداۋى (سەۋدا مەنبەلىك نېرۋا ئاجىزلىقى)
بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغان بىمارلارنىڭ چىرايى
قارامتۇل، بەدىنى ئورۇق، تېرىلىرى قۇرغاق بولۇپ قالىدۇ. تومۇرى
ئىنچىكە، ئاستا سالىدۇ. قورقۇنچاقلىق، گۇمانخورلۇق ئەھۋاللىرى نىس-
بەتەن ئېغىر بولۇپ، كۆپ ئويلايدىغان، غەم-ئەندىشنى كۆپ قىل-
دىغان بولۇپ قالىدۇ. سىرتقى روھىي غىدىقلىنىشلارغا ئۇچرىغاندا
ناھايتى تېزلا جىددىيلىشىپ ئۆزىنى بېسىۋالالمايدۇ. كىشىلەر بىلەن
چىقىشالمايدۇ. كۆپ سۆزلەيدۇ. بۇ خىل نېرۋا ئاجىزلىقنى ئەگەر ۋاقتىدا
داۋالىمىغاندا تەدريجىي مالبۇخۇلىيا كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇپ قې-
لىش ئېھتىمالى بولىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ ئەگەشمە كېسەللىك ئالامەتلىرى

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكى كىلىنىكىدا كۆزەتكەندە ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ كەلگەن بىر مۇنچە كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. يەڭگىللىرىدە چىرايى تاتىرىش، بەدىنى تەدرىجىي ئورۇقلاپ كېتىش، تېرىلىرى قۇرغاقلىشىش، ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، پۇت-قوللىرى مۇزلاش، گەۋدە ۋە ئۈستىخانلىرى تېلىپ ئاغرىش، چوڭ تەرتىپ بەزىدە سۈيۈلۈش، بەزىدە قېتىۋېلىش، قۇلاق غوغۇلداش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلاپ كېتىش، تېرىلىرىدە بىر نەرسە ماڭغاندەك غەيرىي سېزىم پەيدا بولۇش، قورساق كۆپۈش ئەھۋاللىرى كۆرۈلۈپ كېسەللىكى بىئارام قىلىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ نىسبەتەن ئېغىر ئۆتىدىغان ئەگەشمە كېسەللىكلىرى بولسا ئەسلى كېسەلگە ياندىشىپ كېلىپ ئومۇمىي بەدەنگە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

نەپەس سىستېمىسى كېسەللىكلىرى: نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكى ئېغىرلاشقاندا نەپەس مەركىزىنىڭ خىزمەت پائالىيىتى ۋاقىتلىق توسۇلۇشقا ئۇچراش سەۋەبلىك نېرۋا خاراكتېرلىك نەپەس قىيىنلىشىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.

ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى: نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىدە ئۇزۇن ۋاقىت ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، ھەزىم قىلىش ناچارلىرى.

شش سەۋەبلىك نېرۋا خاراكتېرلىك ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي يارىسى ياكى نېرۋا خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى، نېرۋا خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش كېلىپ چىقىدۇ.

نەسلىنىش ئەزالىرى كېسەللىكلىرى: ئاياللاردا ھەيز قالايمىقانلىشىش، ئەزلەردە كۆپ ئېھتىلام بولۇش، مەنىي تۇتالماسلىق، ئەر-ئاياللاردا ئوخشاشلا جىنسىي ھەۋىسى تۆۋەنلەش، جىنسىي ئىقتىدارى يوقىلىش ئەھۋالى پەيدا بولۇپ قالىدۇ.

يۇقۇملىنىش: نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىدە بىمارنىڭ ئۇزۇن ۋاقىت ئىشتىھاسى تۇتۇلۇپ تاماق يېگۈسى كەلمەيدىغان بولۇپ قېلىش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش سەۋەبلىك بىمار تەدرىجىي ئورۇقلاپ كېتىدۇ. نەتىجىدە بەدىنى كۈندىن-كۈنگە ئاجىزلىشىدۇ. ئۇنىڭ ئۈس-تىگە مەنىي تېز كېتىش ئەھۋالى كۆرۈلۈپ، بەدەننى تېخىمۇ ئاجىزلاشتۇرۇپ قويغانلىق سەۋەبىدىن تېنى ئاجىزلاپ بىمارنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ، ھەر خىل يۇقۇملىنىشلار ئاسانلا پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن: زۇكام، ئۆپكە ياللۇغى، تېرىدىن يۇقۇملىنىش، سۈيدۈك يوللىرىنىڭ يۇقۇملىنىشى، تۈرلۈك سىل كېسەللىكلىرى قاتارلىقلار.

نېرۋا ئاجىزلىقىغا دىئاگنوز قويۇش

نېرۋا ئاجىزلىقىغا دىئاگنوز قويۇش ئانچە قىيىن ئەمەس. ئادەتتە كېسەللىك ئالامەتلىرى، روھىي ھالىتى ۋە بىمارنىڭ شىكايەت قىلىشىغا قاراپ دىئاگنوزنى ئاسانلا مۇقىملاشتۇرۇشقا بولىدۇ. بىراق نېرۋا ئاجىز-

لىقنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، مېڭە قان تومۇر قېتىش، مېڭە ئۆسمىسى ۋە باشقا نۇرغۇن كېسەللىكلەرگە ئوخشۇشۇپ كەتكىنى ئۈچۈن يەڭگىللىك بىلەن دىئاگنوزنى مۇقىملاشتۇرۇپ خاتا داۋالاپ ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

دىئاگنوز قويۇش ئاساسلىرى

1. سەزگۈرلۈكى زىيادە يۇقىرى بولۇش

بىماردا ۋاراڭ-چۇرۇڭ ياكى يورۇقلۇقنىڭ غىدىقلىشىغا بەرداشلىق بېرەلمەي ئۆزىنى بىئاراملىق ئىچىدە قالغاندەك ھېس قىلىش، كەيپىيا-تى تۇراقلىق بولماي ئاسانلا ھاياجانلىنىش، كىچىك ئىشلارغا تەگەپ باشقىلار بىلەن جېدەل قىلىش، ئورگانىزمنىڭ ئىچكى سېزىمچانلىقى ئېشىپ كېتىش ئىپادىلىرى بولىدۇ.

2. ئۇيقۇسىزلىق

ئۇيقۇسىزلىق بولسا نېرۋا ئاجىزلىقى كېسىلىنىڭ تىپىك ئالامەت-لىرىدىن بىرى بولۇپ، كېسەللىك يەڭگىل ۋاقتىدا بىمار ئاخشىمى ياتقاندا ئۆتۈپ كەتكەن ئىشلارنى خىيال قىلىپ ئاسانلىقچە ئۇخلىيالمايدىغان، ئەتىگەندە ئادەتتىكىدىن بالدۇر ئويغىنىپ كېتىدىغان ئەھ-ۋال شەكىللىنىپ كۈندۈزلىرى ھارغىنلىق ھېس قىلىدۇ. ئېغىرلاشقاندا ئۇيقۇسىزلىق تېخىمۇ كۈچىيىپ، كېچىسى ئاساسەن ئۇخلىيالمايدىغان ھەتتا سوتكىلىق ئۇيقا ۋاقتى 4 ~ 3 سائەتلا بولۇپ، سەگەك ئۇخلايدىغان بولۇپ قالىدۇ. ئۇيقۇسىزلىق سەۋەبىدىن كۈندۈزلىرى داۋاملىق ھارغىنلىق ھېس قىلىپ كۈندىلىك مەشغۇلاتى ئېغىر تەسىرگە ئۇچرايدۇ.

3. باش ئاغرىش ۋە باش قېيىش
نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكى بىلەن ئاغرىغان كىشىلەرنىڭ ھەم-
مىسىدە دېگۈدەك باش ئاغرىش پەيدا بولىدۇ. باش ئاغرىشنىڭ خاراكتېرى تۇتقاقلىق بولۇپ، كۆپىنچە روھىي جەھەتتىن جىددىيلەشكەندە كۈچىيىپ قالىدۇ. ئادەتتىكى شارائىتتا يەڭگىل دەرىجىدە داۋاملىشىپ تۇرىدۇ. كۆڭلىگە ياقىدىغان مۇھىت ياكى ئۆزى ياقىتۇرىدىغان كىشىلەر بىلەن ھەمسۆھبەت بولغاندا ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

4. ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى تۆۋەنلەش
نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنىڭ تۆۋەنلىشى ئانچە روشەن بولمايدۇ. بىراق كېسەللىك تەرەققىي قىلىپ ئوتتۇرا ياكى ئاخىرقى باسقۇچقا بارغاندا ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنىڭ تۆۋەنلىشى روشەن ئىپادىلىنىپ، بىر قانچە كۈن ئىلگىرى قىلغان ئىشلىرىنى ياكى سۆزلىگەن سۆزلىرىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قويدۇ. ھەتتاكى ئالدىنقى كۈنى قىلغان مەشغۇلاتلىرىنى باشقىلارگە سۆزلەپ بېرەلمەي مەن تۈنۈگۈن قانداق ئىشلار بىلەن ۋاقىتنى ئۆتكۈزگەن بولغىنىم؟ قايسىبىرى بىر ئىشنى ھاۋالە قىلغان ئىدى، نېمە دېگەن بولغىنىم؟ دەپ چوڭقۇر ئويلاپمۇ ئېسىگە ئالالمايدۇ. ئىنكاس قايتۇرۇش ئاستىلىشىدۇ.

5. ئۆزىنى باشقىلاردىن تۆۋەن ھۆلچەرلەش ۋە ئۆزىگە ئىشەنمەسلىك
بۇ نېرۋا ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغان بىمارلارنىڭ ناھايىتى كۆپ قىسمىدا كۆرۈلىدىغان ئالامەت بولۇپ، گەرچە ئۆزىنىڭ مەلۇم قابىلىيىتى-

تى بولسىمۇ، ئۇنى توغرا مۆلچەرلىيەلمەيدۇ. ئەكسىچە مەن بىر يارىماس ئادەم، ھېچقانداق ئىقتىدارىم يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىلار چوقۇم مېنى بوزەك قىلىدۇ، دېگەن خىياللارنى ئويلاپ ھەممە كىشى خۇددى ئۇنى كۆزگە ئىلمىغاندەك، قىلغان ھەر بىر ئىشنى باشقىلار ياراتمىغان قىياپەتتە نەزەر سېلىۋاتقاندا ھېس قىلىدۇ-دە، باشقىلارغا گۇمان بىلەن قارايدۇ. نەتىجىدە كىشىلەر بىلەن چىقىشالمايدۇ. خىز-مەت ۋە تۇرمۇشى ئېغىر زىيانغا ئۇچرايدۇ.

6. يۈرەك سېلىش ۋە تومۇر سوقۇش تېزلىشىش
بۇ كۆپلىگەن نېرۋا ئاجىزلىقىغا گىرىپتار بولغان بىمارلاردا ئوخ-شاشلا يۈز بېرىدىغان ئالامەت بولۇپ، تۇتقاقلىق شەكىلدە كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە روھىي جىددىيلىشىش ئازراق مەسىلىگە دۇچ كەلگەندىن كېيىن تېخىمۇ روشەن ئىپادىلىنىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاشقاندا يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، پۇت-قوللىرى مۇزلاش ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. نەپىسى سىقىلىدۇ.

7. سۆز-ھەرىكىتىنىڭ تۇراقسىزلىقى
نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغان بىمارلاردا كۆپ سۆزلەش، سۆزلىگەنسىرى ئۆزىنى تۇتۇۋالماستىلىق، قىلغان گەپلىرىنى تەكرارلاۋېرىش، يىپىدىن-يىگىنىسىغىچە چۈشەندۈرۈپ كېتىش، ئازغىنە مەسىلىنى مۇرەككەپلەشتۈرۈۋېتىش، دىققىتىنى يىغالماستىلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. قىسمەن بىمارلاردا جىمغۇرلۇق، ھەرىكىتى سۇس، ئېزىد-لەڭگۈ بولۇش كەيپىياتى شەكىللىنىدۇ.

8. ئىچكى-تاشقى ئەزالاردىكى باشقا كېسەللەكلەردىن شىكايەت قىلىش بىمار دائىم قورسىقى يېقىمىسىز ئاغرىۋاتقان، پۇت-قوللىرى تېلىپ بىئارام بولغان، كۆزى تورلۇشۇپ ماغدۇرسىزلىنىپ قالغان، ئىشتىھاسى تۇتۇلۇپ تاماق يېگۈسى كەلمەيدىغانغا ئوخشاش بىر قاتار كېسەللەك ئالامەتلىرىدىن زارلىنىدۇ. دوختۇر تەپسىلىي تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندا، مەزكۇر ئەزالاردا گەۋدىلىك كېسەللەك سېزىلمەيدۇ ياكى مەلۇم تىنچلاندۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىپ كۆرگەندە يۇقىرىقى ئالامەتلەر ئۆزلۈكىدىن يوقاپ كېتىدۇ.

يۇقىرىقى ئەھۋاللارنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ۋە مەلۇم قوشۇمچە تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بارغاندىن كېيىن نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىگە ئىشەنچلىك دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ.

سېلىشتۇرما دىئاگنوزى

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىگە دىئاگنوز قويۇشتا يالغۇز بىمار سۆزلەپ بەرگەن بىر قىسىم ئالامەتلەرنى كۆزدە تۇتۇپ يەڭگىللىك بىلەن بىر تەرەپ قىلىشقا بولمايدۇ. چوقۇم ھەر تەرەپلىمە كېسەللەك تارىخىنى تەپسىلىي سوراپ ئىنچىكە بەدەن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش، زۆرۈر تېپىلغاندا ھازىرقى زامان ئىلغار تىپتىكى مېڭە تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق تەكشۈرۈپ كۆرۈپ، ئورگانىك كېسەللەك ئۆز-گىرىشى بار-يوقلۇقىنى ئېنىقلاپ بولغاندىن كېيىن دىئاگنوزنى مۇقىملاشتۇرۇش ئىنتايىن زۆرۈر.

بۇ كېسەللىككە دىئاگنوز قويۇشتا تۆۋەندىكى كېسەللىكلەردىن پەرقلەندۈرۈش لازىم.

1. ھىستېرىيە

بۇ كېسەللىكتە دائىم روھىي غىدىقلىنىشقا ئۇچرىغاندىن كېيىن ھېسسىياتنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقى كېلىپ چىقىدۇ. بىمار خامۇش ھالەتكە كىرىپ قالىدۇ. كېسەلنىڭ سىرتقى مۇھىتتىكى شەيئىلەرگە بولغان سېزىمى تولۇق بولماستىن ئورۇن، ۋاقىت، ئادەم-نەرسىلەرگە قارىتا تونۇشى خاتا بولىدۇ. بەزىلىرى ئۆزىنى زەربىگە ئۇچرىغان ھېسابلاپ غەزەپلىنىپ پەرىشانلىشىدۇ. ئىنتايىن ھاياجانلىنىش ئىپادىلىرى كۆرۈلىدۇ. تۇرۇپلا يىغلايدۇ، تۇرۇپلا ئۆزىنى تۇتالماي قاقاقلاپ كۈلۈپ كېتىدۇ. بېشى چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئوخشىمايدىغان تۈپكى پەرق شۇكى ھىستېرىيە كېسەللىكى تۇتقاقلىق شەكىلدە بولۇپ، روھىي غىدىقلىنىش پەيدا بولغاندىن كېيىن، بىمار تۇيۇقسىزلا يەرگە يىقىلىپ چۈشىدۇ. ئەمما نېرۋا ئاجىزلىقىدا بۇنداق تۇتقاقلىق شەكىلدە تۇتۇش ئەھۋالى بولماي دائىم نېرۋا خىزمىتى قالايمىقانلىشىش ئىپادىلىرى كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ ۋە بىھوش بولۇپ يىقىلىپ چۈشمەيدۇ.

2. ھېڭە قان تومۇر قېتىش كېسەللىكى

بۇ خىل كېسەللىكتە بىمارنىڭ بېشى ئېسىلىپ ئاغرىش، باش قېيىش، كۆز تورلۇشۇش، پۇت-قوللىرى ئۇيۇشۇش، ئۇيقۇسىزلىق، يۈرەك سېلىشقا ئوخشاش بىر قاتار نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئوخشاش كېتىدۇ. ھەممەي كېسەللىك ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ. بىراق بۇنىڭ نېرۋا ئاجىزلى-

قىدىن پەرقلەندىغان يېرى شۇكى يالغۇزلۇقنى خالاش، ئاسان ھايا-
جانلىنىش، ئۇنۇتقۇچىلىق، دىققىتىنى يىغالماسلىق ئەھۋاللىرى روشەن
بولمايدۇ. مۇناسىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندا مېگە قان تومۇر قېتىش
كېسەللىكى ئىكەنلىكى ئىپادىلىنىدۇ.

3. قالقانبەز خىزمىتى كۈچىيىپ كېتىش كېسەللىكى

بۇ خىل كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى خۇددى نېرۋا ئاجىز-
لىقى كېسەللىكىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. نېرۋا زىيادە سەزگۈرلۈشۈپ كۆپ
سۆزلەش، گۇمانخورلۇق، روھىي جىددىيلىشىش، ئاسان ھايانلىنىش،
دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرەلمەسلىك، ھەرىكەتتە ئالدىراخچىلىق قىلىش،
ئۇيقۇسىزلىق، بىئارام بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. قىسمەن بىمارلار-
دا غەمكىنلىك، ئەسەبلىشىش قاتارلىق روھىي ئالامەتلەر بولىدۇ. نېرۋا
ئاجىزلىقى بىلەن پەرقلەندىغان يېرى شۇكى كېسەلنىڭ تەرەققىياتى
نەسبەتەن تېز بولۇپ، قىسقا مۇددەت ئىچىدە يۇقىرىقى ئالامەتلەر
كۈندىن-كۈنگە ئېغىرلىشىپ بارىدۇ. يەنە بىرى قالقانبەز ھورمونىنىڭ
ئاجىزلىق چىقىشى زىيادە كۆپ بولغانلىقتىن، توقۇلما ئىچىدە قەنت،
ماي، ئاقسىل قاتارلىقلارنىڭ پارچىلىنىپ ئالمىشىشى تېزلىشىپ كەتكەن-
نى ئۈچۈن بىمارنىڭ ئىشتىھاسى كۈچىيىدۇ. بىراق بەدەن ئېغىرلىقى
تېز تۆۋەنلەيدۇ. يۈرەك رىتىمىدا كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولۇپ، يۈ-
رەكنىڭ مۇددەتتىن بۇرۇن سوقۇشى كۆپ كۆرۈلىدۇ. يۈرەك چوڭىيىدۇ-
دۇ، كۆز پۇتلىيىپ چىقىدۇ. قوشۇمچە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ
ئاساسىي ماددا ئالمىشىش نىسبىتىنى تەكشۈرگەندە، ھەقىقىي كېسەل-

لىك ئىپادىلىنىپ، قالقانبەز خىزمىتى كۈچىيىپ كېتىش كېسلى
ئىكەنلىكى تولۇق نامايەن بولىدۇ.

شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، قالقانبەز خىزمىتى كۈچىيىپ
كېتىش كېسەللىكىگە نېرۋا ئاجىزلىقىنى ئارىلاشتۇرۇپ قويۇپ خاتا
داۋالاپ بىمارنىڭ داۋالىنىش ۋاقتىنى بىھۇدە كېچىكتۈرۈپ قويۇشتىن
ساقلىنىش ئىنتايىن مۇھىم.

4. غەمكىنلىك كېسلى

غەمكىنلىك كېسەللىكىنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە بىر قىسىم نېرۋا
ئاجىزلىقى كېسلىنىڭ ئالامىتى كۆرۈلىشىمۇ، لېكىن بۇ خىل كېسەل
كىشىلەردە دائىم كەيپىياتى تۆۋەنلەش، ئۈمىدىسىز بولۇش، ئۆزىنىڭ
سالامەتلىك ئەھۋالىغا ئىشەنچە قىلماسلىق، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشقا
ئۇرۇنۇش قاتارلىقلار بولىدۇ. بۇلارغا ئاساسەن پەرقلىندۈرۈش كېرەك.

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار

نېرۋا ئومۇمىي بەدەن خىزمىتىنى باشقۇرىدىغان رەئىس (باشقۇر-
غۇچى) ئەزا بولۇپ، ئۇنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت پائالىيىتىدە
ئۆزگىرىش كۆرۈلسە، ئۇ ھالدا بەدەننىڭ باشقا ئەزالىرىدىمۇ ناھايىتى
چوڭ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە نېرۋا
كېسەللىكىنىڭ باشقا بەدەن كېسەللىكلىرىدىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان
مۇھىم يېرى شۇكى، ئورگانىزىمىدىكى باشقا نۇرغۇن كېسەللىكلەردە

كېسەللەنگەن شۇ ئەزا قاتتىق ئاغرىيدۇ ياكى بىمارنى ئازابلایدۇ. كېسەللىك ئازابىنى پەقەت بىمار ئۆزىلا تارتىدۇ. ئەمما نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىككە گىرىپتار بولغان بىمارلارنىڭ كېسەللىك ئازابىنى كېسەل ئۆزىلا تارتماي ئەتراپتىكى كىشىلەرنىمۇ روھىي جەھەتتىن زەخمىلەندۈرىدۇ. ياش قىز-ئوغۇللاردا نېرۋا ئاجىزلىقى كۆرۈلسە، ئازغىنە پىكىر بىرلىككە كېلەلمەسلىك سەۋەبلىك ئۆزىنىڭ خېلى كۆپ بەدەل تۆلەپ قولغا كەلتۈرگەن مۇھەببىتىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ. ئەر-خوتۇنلاردا كۆرۈلسە، سەۋر-تاقەت تۇيغۇسى بولماي ئەرزىمەس ئىشلار ئۈچۈن جىددىيلىشىپ بەختلىك تۇرمۇشىدىن ۋاز كېچىدۇ. شۇڭا نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، سەۋەبچى ئامىللارنى تۈگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىش كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى خۇشال-خۇرام ئۆتكۈزۈشى، خىزمەتتە نەتىجە قازىنىشى، جەمئىيەتنى روناق تاپقۇزۇشى، دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشى، مىللەتنىڭ ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك بولغان زور مەسىلە.

ئانىلار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە بالىنىڭ نېرۋا

پائالىيىتىنى ئاسراشقا ئەھمىيەت

بېرىشى كېرەك

ھەر قانداق بىر ئانا بولغۇچى ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە قورساقتىكى بوۋاقنىڭ ساغلام تۇغۇلۇپ ئەقلىي پائالىيىتى نورمال ئۆسۈپ يېتىلىپ كەلگۈسىدە جەمئىيەتكىمۇ، ئاتا-ئانىسىغىمۇ شان-شەرەپ كەل-

تۈرىدىغان ئەقىل-ئىدراكى يۇقىرى پەرزەنت بولۇپ چىقىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. مۇشۇنداق ئويلىمايدىغان بىرمۇ ئانا بولمىسا كېرەك. ئەمما بىر قىسىم ئاياللار ھامىلدارلىق مەزگىلىدە بوۋاقنىڭ نېرۋىسىنى ئاسراپ قېلىشقا ئانچە ئەھمىيەت بەرمەيدۇ. شۇڭا تۆۋەندىكى ئەھۋاللارغا دىققەت قىلىش كېرەك. ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە كۆپ زۇكام بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش، تۈرلۈك ۋىرۇسلۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ھامىلدارلىق مەزگىلىدە تۈرلۈك رادىئوئاكتىپلىق نۇرلارغا قاقلاماسلىقى شۇنداقلا، ئورگانىزىمدا پەيدا بولىدىغان ھەر خىل كېسەللىكلەردىن ئىمكانقەدەر ساقلىنىپ ئۆزىنى قاتتىق ئاسرىشى كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا، بۇ خىل ئەھۋاللار تۈرەلمىنىڭ تەرەققىياتىغا زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىپ، بىۋاسىتە مېڭىنىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىپ، پوستلاق قىسىم ھۈجەيرىلەرنىڭ تولۇقسىزلىقى ھەم مېڭە بۆرۈتمىچىلىرىنىڭ بۆلۈنىشىنىڭ تولۇق بولماسلىقى سەۋەبىلىك ئۆسمۈرلۈك ۋە ياشلىق دەۋرىدىكى نېرۋا ئاجىزلىقى، گالۋاڭلىق، دۆتلۈك ئەھۋاللىرىنى پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا ئاياللار ھامىلدارلىق مەزگىلىدە ئوزۇقلىنىشنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا ئەھمىيەت بېرىپ، ئوزۇقلىنىش ۋاقتىغا دىققەت قىلىش بىلەن يېمەكلىكلەرنىڭ تۈرىنىڭ مۇۋاپىق بولۇشىغىمۇ ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈش لازىم. ئۇندىن باشقا ھامىلدار ئاياللاردا ئەگەر ھاراق ئىچىش، تاماكا چېكىش ئادىتى بولسا، ئۇ ھالدا قورساقتىكى ھامىلىنىڭ نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنىڭ نورمال ماددا ئالماشتۇرۇشىغا ئېغىر ھالدا توسقۇنلۇق قىلىپ، نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنىڭ ۋە

توقۇلمىلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى توسۇپ، تۇغما خاراكتېرلىك نېرۋا زە-
ئىپلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنداق بالىلار تۇغۇلغاندىن كېيىن
كىچىكىدىن باشلاپلا نېرۋىسى ئاجىز يېتىلىپ قالىدۇ.
تەجرىبىلەرگە قارىغاندا ھامىلىدار ئاياللار مېڭىنى كۈچلەندۈرگۈ-
چى، قان ئايلىنىشىنى جانلاندۇرۇپ، روھنى كۆتۈرگۈچى دورىلارنى
ئىستېمال قىلسا بوۋاقنىڭ نېرۋا پائالىيىتىنىڭ يېتىلىشىگە بولغان تەسە-
رى ياخشى بولىدىكەن. شۇڭا ئاياللار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە خېمە-
رى مەرۋايىت، خېمىرى گاۋزبان ئەنسىرى، جەۋھىرى مۇپەررىھى ئەۋرد-
شم قاتارلىق دورىلارنىڭ قايسىسىرى بولسا مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىپ
بەرسە، تۆرەلمە نېرۋا پائالىيىتىنىڭ ساغلام تەرەققىي قىلىشىغا ئۈنۈمى
ئىنتايىن ياخشى.

تۇغۇت جەريانىدا مېڭە زەخمىگە ئۇچراش سەۋەبلىك نېرۋا ئاجىزلاشتىن ساقلىنىش

قىيىن تۇغۇت، تەتۈر بېسىم ئارقىلىق تارتىپ تۇغدۇرۇش ۋە باشقا
تۇغۇت جەريانىدىكى پەۋقۇلئاددە قوپال ھەرىكەتلەر باشنىڭ مېخانىكى-
لىق بېسىلىشى ۋە تۇنجۇقۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. دە، مېڭە ھۈ-
جەيرىلىرىنىڭ نورمال تەرەققىي قىلىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ ۋە ئۆسۈپ
يېتىلگەندىن كېيىن روھىي كەيپىياتنىڭ نورمالسىزلىقى، ئۇنۇتقازلىق
ئەھۋاللىرى كېلىپ چىقىپ، ئاسانلا نېرۋا ئاجىزلىقى كېسىلىنىڭ پەيدا
بولۇشىغا شەرت ھازىرلاپ بېرىدۇ. شۇڭا ئاياللار ۋە تۇغۇت دوختۇرلى-

رى ئىمكانقەدەر تۇغۇت جەريانىدىكى ھەرىكەت ۋە مەشغۇلات ئۇسۇل-لىرىغا كۆڭۈل بۆلۈشى لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا بوۋاق مەزگىلىدىكى قىزىتما، مېڭە پەردە ياللۇغى، بىرلەمچى تۇتقاقلىق كېسىلى قاتارلىقلاردا ئەگەر تارتىشش قايتا-قايتا قوزغالسا مېڭە قان ئايلىنىشى مەلۇم ۋاقىت توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، مېڭە ھۈجەيرىلىرىگە ئوكسىگېن ۋە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك پەيدا بولۇپ، مېڭىنىڭ ساغلاملىقىغا تەدرىجىي تەسىر يەتكۈزىدۇ. شۇنىڭ بىلەن كەيپىياتى تۇراقسىز بولۇش، ئاسانلا چار-چاشقا ئوخشاش نېرۋا ئاجىزلىق ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋاللارغا قارىتا بوۋاقلىق مەزگىلىدىكى ئەشۇنداق كېسەللىكلەردىن ساقلىنىش ياكى كۆرۈلگەن ھامان ئەستايىدىل داۋالاپ، تېز سۈرئەتتە ساقايتىشقا تىرىشىش لازىم. ئەگەر بالىلاردا تېلىقىدىغان كېسەللىك قايتا-قايتا قوزغىلىپ مېڭىنى زەخمىلەندۈرۈش شارائىتى تۇغۇلۇپ قالسا، بۇنداق بوۋاقلارغا شەرىپتى ئەۋرىشىمنى بالىنىڭ يېشىغا قاراپ 5~15g دىن كۈنىگە 3 ۋاخ قايناق سۇ بىلەن قوشۇپ ئىچۈرۈپ بېرىش، سىرتىدىن مەلھەم بەيزى (تۇخۇم يېغى) بىلەن پۇت ۋە ئالغان قىسىملىرىنى مۇۋاپىق مايلاپ بېرىشنىڭ تېلىقىشنى تۈگىتىش، نېرۋىنى كۈچلەندۈرۈش تەسىرى بار. يەنە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بولغان مۇھىم بىر مەسىلە شۇكى، بوۋاق بالىلار بار ئۆيدە تاماكا چېكىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئەگەر بۇ خىل ئەھۋال كۆپ قېتىم تەكرارلانسا، بوۋاقلارنىڭ نېرۋا سىستېمىسى كاربون تۆت ئوكسىدى بىلەن زەھەرلەنىپ، نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنىڭ ساپ ئوكسىگېن ۋە ئوزۇقلۇق ماددىلار

بىلەن تەمىنلىنىش ئېھتىياجى مەلۇم ۋاقىت توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ-دە،
نېرۋىنىڭ نورمال يېتىلىش ھالىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ بالىلاردىكى نېرۋا
ئاجىزلىشىشقا سەۋەب بولىدۇ.

بالىلارغا تىنچلاندۇرغۇچى دورا ۋە غىدىقلىغۇچى يېمەك-ئىچمەكلەرنى بەرمەسلىك كېرەك

قىسمەن ئاتا-ئانىلار بالىلىرىنى ئەتىۋارلاپ ياكى ئەكىلىتىپ
تۇرۇپ ھاراق ئىچۈرۈپ قويىدۇ ياكى بالىلىرى تاماكا قالدۇقلىرىنى
چېكىۋالسا ئۇنىڭغا يول قويىدۇ. بۇ بالىلار تەدرىجىي ئاتا-ئانىسى
ساقلاپ قويغان ھاراقنى ئۆزى ئىچىۋېلىشقا ئادەتلىنىدۇ. نەتىجىدە
ئۆسمۈرلەرنىڭ ئىسپىرت بىلەن زەھەرلىنىشى ياكى CO_2 بىلەن زەھەر-
لىنىشىنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ خىل زەھەرلىنىش بالىلارنىڭ ئەمدىلا
تەرەققىي قىلىۋاتقان مېڭە پوستلاق ماددىسىنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشى
ۋە يېتىلىشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىپ، ئۆسمۈرلەردىكى نېرۋا ئاجىزلى-
قىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇندىن باشقا داۋالاشنىڭ نامۇۋاپىق بولۇ-
شى سەۋەبلىك داۋالىغۇچى خادىملار كۆكنار، بەزرۇلبەنجى ۋە باشقا
تىنچلاندۇرغۇچى دورىلارنى ئۆسمۈرلەرگە خاتا ھالدا ئىشلىتىپ قويۇپ،
نەتىجىدە مېڭە ھۈجەيرىلىرىنىڭ تەرەققىياتى ياخشى بولماي، چوڭ
بولغاندا ئەقلىي قۇۋۋىتىنىڭ تۆۋەن بولۇشى، زېھنىي كۈچىنىڭ تولۇق
بولماسلىقى قاتارلىق نېرۋا ئاجىزلىق ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدۇ.

باللارغا روھىي جەھەتتىكى تەربىيىنى توغرا ئېلىپ بېرىش لازىم

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكنىڭ خېلى كۆپ قىسمى مېڭە پوست-
لاق ماددىسىنىڭ روھىي توسالغۇلارغا بەرداشلىق بېرەلمەي قوزغىلىش-
چانلىقى زىيادە ئېشىپ كېتىشتىن پەيدا بولىدىغان بولغاچقا، مېڭىنىڭ
فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت پائالىيىتىنى يېتىلدۈرۈش ۋە تۈرلۈك روھىي
بېسىملارغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان قىلىپ چېنىقتۇرۇپ چىقىش نېرۋا
ئاجىزلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنىڭ بىرى. بەزى
ئاتا-ئانىلار بۇ نوقتىنى ئانچە چۈشەنمەيدۇ. چۈشەنسىمۇ ئانچە ئەھمى-
يەت بەرمەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن پەرزەنتلىرىنى ھەددىدىن ئارتۇق ئەت-
ۋارلاپ نازۇك-تەبىئەتلىك، ئەركە چوڭ قىلىپ تەربىيەلەيدۇ. بۇنداق
بالىلار كىچىكىدىن تارتىپ يېمەك-ئىچمىكى تەل، تۇرمۇشى كۆڭۈللۈك
بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلىدۇ. نەتىجىدە تۇرمۇشنىڭ مەلۇم باسقۇچىغا قەدەم
قويغاندا مۇستەقىل تۇرمۇش كەچۈرۈشى، ئىجتىمائىي جەمئىيەتكە
ئارىلىشىشى ياكى ئوقۇش، خىزمەت ئىشلەش جەريانىدا بىرەر قانداق
ئوڭۇشسىزلىققا يولۇقۇپ قالسا، بۇ ئازغىنە ئىدىيىۋى قىيىنچىلىققا
بەرداشلىق بېرەلمەي جىددىيلىشىپ قايتا-قايتا ئويلىنىپ ئوخلىالماي
قالدۇ، تەشۋىشلىنىدۇ. مۇنداق ئەھۋال مەلۇم ۋاقىت داۋاملىشىۋەرسە
نېرۋا پائالىيىتىنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنى
پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن،

باللارغا كىچىكىدىن تارتىپ تەربىيەلەشنى مۇۋاپىق كۈچەيتىپ، مۇس-
تەقىل تۇرمۇش كەچۈرۈش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشكە ئەھمىيەت بې-
رىش، ئوڭۇشسىزلىققا بەرداشلىق بېرىپ ئىلگىرىلەش كۆز قارىشىنى
تىكلەشكە ئىلھاملاندۇرۇش لازىم.

ئەقلى ئەمگەك بىلەن شۇغۇللانغۇچىلار نېرۋىنى مۇۋاپىق ئارام ئالدۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇشىدا ئەقلى جەھەتتىكى
چارچاش ۋە روھىي جىددىيلىك مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. شۇڭا
بىزنىڭ ئەينى زامانلاردا ئۆتكەن تېۋىپلىرىمىز «كەتمەنچىلەردە ئاز،
قەلەمكەشلەرگە خاس كېسەل» دەپ تەرىپلىگەن، ھازىرقى رىقابەت
بىلەن تولغان دەۋردە ناھايىتى كۆپلىگەن كىشىلەر ئۆزىنىڭ ئەقلى
ھارغىنلىقىغا قارىماي ئۆگىنىش ۋە تۈرلۈك مەشغۇلاتنى جىددىيلىك
ئىچىدە ئېلىپ بارىدۇ. ئەمما نېرۋىنى مۇۋاپىق ئارام ئالدۇرۇشنى ئويلى-
مايدۇ. ئاخىرىدا مۇنداق ئالدىراشلىق ئىچىدە ئۆتكەن تۇرمۇشنىڭ
نېرۋىنى زەئىپلەشتۈرۈپ قويۇشنى بىلمەيدۇ. بولۇپمۇ ئوقۇغۇچىلار
ئادەتتىكى چاغلاردا دەرس تەكرارلاشقا ئانچە ئېتىبار بېرىپ كەتمەي
ئىمتىھان مەزگىللىرى يېتىپ كەلگەندە بىر قانچە كۈن كېچە-كۈندۈز
تەكرارلاش بىلەن شۇغۇللىنىپ كېتىدۇ، ھەتتاكى تاماق يېيىشكىمۇ
پۇرسەت چىقىرالمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن مېڭە پوستلاق ماددىسىنىڭ

زىيادە چارچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مۇنداق نېرۋىغا بولغان ئېغىر
بېسىم قايتا-قايتا تەكرارلانسا مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن نېرۋا ئاجىزلىشىش
كېلىپ چىقىدۇ. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ سالامەتلىكتە زۆرۈر
بولغان 6 نەرسە (سىتتى زۇرۇرىيە) تەلىماتىدا «ھەرىكەت ۋە جىملىق»
نىڭ نورمال بولۇشى، ئۆزىنىڭ تەڭپۇڭلۇق ھالىتىنى ساقلىشى سالا-
مەتلىك ئۈچۈن پايدىلىق دەپ، ئوتتۇرىغا قويغان. شۇڭا ھەر بىر
كىشى نېرۋىنى مۇۋاپىق ئاسرايمەن دەيدىكەن ئەلۋەتتە ئەقلىي پائال-
يەت بىلەن مېڭىنى ئارام ئالدۇرۇشقا تەڭ ئېتىبار بېرىش، مۇۋاپىق
پۇرسەت چىقىرىپ ھاۋالىق جايلاردا ساياھەت قىلىش، قىزىقارلىق
كىنو-فىلىملەرنى كۆرۈش، تەنتەربىيە، بەدەن چېنىقتۇرۇش پائالىيەت-
لىرى بىلەن شۇغۇللىنىش، ئۆزى ياقىتىدىغان دوستلىرى بىلەن
پاراڭلىشىپ پىكىر ئالماشتۇرۇپ روھىنى كۆتۈرۈش قاتارلىق پائالىيەتلەر
مېڭە ھۈجەيرىلىرىنىڭ زىيادە جىددىيلىشىشتىن پەيدا بولغان ھارغىد-
لىقنى مەلۇم دەرىجىدە ئازايتىپ، نېرۋا كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
ئۇندىن باشقا داۋاملىق ئەقلىي خىزمەت بىلەن شۇغۇللىنىدىغان كىشى-
لەر پۇرسەت چىقىرىپ ئوي پىكىرنى يېڭىلاش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشى،
باشقىلار بىلەن يۇمۇرلۇق چاقچاقلارنى قىلىشى، قىزىقارلىق كىتابلارنى
ئوقۇشى، شۇنداقلا روھىنى كۆتۈرۈشكە ماھىر بولۇشى لازىم. ھەمىشە
باشقىلار ئارىسىدا ئۆز گېپىنى كۆككە كۆتۈرۈپ ھەممە كىشى مېنىڭ
پىكىرىمگە قوشۇلۇشى، ماڭا بويسۇنۇشى، مەن نېمە دېسەم شۇنى
قىلىشى كېرەك، دەيدىغان قاراشتىن ساقلىنىشى ۋە بۇنداق ئادەتنى

تۈگىتىشى لازىم. چۈنكى كىشىلەر مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن باشقىلارنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرايدۇ. ئەتراپىدىكى كىشىلەر ۋە مۇھىت بىلەن چىقىدۇ. شالمايدۇ. نەتىجىدە نېرۋىنى نۇرغۇن چىگىش مەسىلىلەر قاپلىۋالىدۇ ۋە قايتا-قايتا ئويلاش كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ بىلەن نېرۋا جىددىيلىدۇ. شىپ مېگە پوستلاق ماددىسىنىڭ قوزغىلىشچانلىقى زىيادە ئېشىپ كېتىدۇ. دە، نېرۋىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. شۇڭا ئىمكانقەدەر ئەقلىي ئەم-گەك بىلەن ئارام ئېلىشنى مۇۋاپىق تەرتىپكە سېلىپ، تۈرلۈك روھىي بېسىملارنىڭ كېلىپ چىقىشىدىن ساقلىنىپ، تۇرمۇشنى مۇۋاپىق ئو-رۇنلاشتۇرۇش نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ھەل قىلغۇچ ئامىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

تاماكى ۋە ھاراقنى ئاز ئىستېمال قىلىش نېرۋا ئاجىزلىشىشتىن ساقلىنىشقا پايدىلىق

كىشىلەرنىڭ مەنىۋى جەھەتتىكى تۇرمۇش قارىشىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ تاماكى چېكىدىغان ۋە كۆپ مىقداردا ھاراق ئىچىپ ئۆزىنى ئاسراشنى بىلمەيدىغانلار خېلىلا ئازايغان بولسىمۇ، بىر قىسىم كىشىلەردە بۇنداق ناچار ئىللەتلەر يەنىلا داۋاملىشىپ كەلمەكتە. بۇنىڭ بىلەن شۇغۇللانغۇچى كىشىلەر مېڭىنى تىنچلاندۇرۇپ ھارغىد-لىقنى پەسەيتىدۇ، دەپ قارايدۇ. بۇ تەرىپى مەلۇم جەھەتتىن توغرىدەك قىلىسىمۇ، ئەمما كۆپ ئىستېمال قىلىشى پۈتۈن بەدەن، بولۇپمۇ نېرۋا سىستېمىسى ئۈچۈن زەھەرلەش ھالىتىنى شەكىللەندۈرىدۇ. تاماكىنى

ئۇزۇن ۋاقىت كۆپ ئىستېمال قىلغاندا مېڭىنى قۇرۇتۇپ ئۇيقۇنى قاقۇرىدۇ. ئىشتىھانى تۇتۇۋالىدۇ. بەدەندە غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ماددىسى پەيدا قىلىدۇ. بۇنداق كىشىلەردە بەزىدە ئىچى تىت-تىت بولۇش، ئاسان ئاچچىقى كېلىش، روھى چۈشكۈنلۈككە ئوخشاش ئەھۋاللار كۆرۈلۈپ، مېڭىنىڭ فىزىئولوگىيەلىك خىزمەت پائالىيىتىنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، مېڭە پوستلاق ماددىسىنىڭ قوزغىلىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، نېرۋا ئاجىزلىقى كېسىلىنى پەيدا قىلىدۇ.

جەلق (قولدا ئىشقاپ مەنىي كەلتۈرۈش)

بۇ ياشلاردا كۆرۈلىدىغان ۋە كەڭ تارقىلىپ كەتكەن بىر خىل يوشۇرۇن يامان ئادەت بولۇپ، ئۆزىنىڭ قولى ۋە ئالدىنى ياكى باشقا نەرسىلەر بىلەن جىنسىي ئەزاسىنى ئىشقاپ، غىدىقلاپ مەنىي ماڭدۇ-رۇش ۋە ئۇنىڭ بىلەن ھۇزۇرلىنىش جەلق دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئادەت قىزلار دىمۇ ئۇچرايدۇ، ئەمما ئوغۇللاردا كۆپرەك بولىدۇ. ياشلار بالاغەت-كەيەتكەندىن كېيىن ياكى ئۇنىڭدىن بۇرۇن بالىلارچە كۆنۈپ قالغان ئادىتى بويىچە جىنسىي ئەزاسىنى مەقسەتسىز ياكى مەلۇم ھېسسىياتى بىلەن تۇتۇپ ئويناپ، مەنىي سۈيۈقلۈكى ماڭغاندىن كېيىن ئۇنىڭدا ناھايىتى يېقىملىق بىر خىل ھۇزۇرلىنىش بولغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. دە، شۇنىڭغا ئادەتلىنىپ قالىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەر توي قىلغاندىن كېيىنمۇ، بۇ خىل ئادەتتىن ئۆزىنى تارتىۋالالمايدۇ. بۇ بىر خىل يوشۇرۇن ئادەت بولۇپ، جىنسىي ئالاقىنى خىيال قىلىسلا قوزغىلىدۇ.

ئىشقا ش جەريانىدا كۆز ئالدىغا خالىغان بىرەر ئايالنى ياكى ئەرنى كەلتۈرۈپ (تەسەۋۋۇر قىلىپ)، شۇنىڭ بىلەن جىنسىي ئالاقە قىلغان. دەك ھېس قىلىدۇ ۋە ھۇزۇرلىنىدۇ. بەزى ياشلار باشقىلار بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسە تۈرلۈك كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇش، جىنايەت يولغا مېڭىپ قېلىشتىن ئەندىشە قىلىش سەۋەبلىك، ئۆزىنىڭ نەپسىنى قاندۇرۇشقا ھەرىكەت قىلىپ بۇ خىل ئادەتنى يۇقتۇرۇۋالىدۇ. ئاياللاردا دەسلەپ قىزلار پەرجىنى غىدىقلاش، دىلچىقنى ئىشقا ش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن باشلىنىپ بارغانچە تەرەققىي قىلىپ ئوخشاش جىنسلىق كىشىلەر بىلەن ئۆز كۆڭلىنى خۇش قىلىش ئەھۋاللىرىمۇ ئۇچرايدۇ. بۇنداق كۆنۈپ قالغان جەلق ئادىتى ئوغۇل-قىزلارنىڭ قايسىسىدا بولسۇن توي قىلىشتىن ئۆزىنى تارتىدۇ ياكى توي قىلىشمۇ كېلىشەلمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كېسەلگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر خالىغان ۋاقىتتا جەلق بىلەن كۆپ شۇغۇللىنىپ ۋە مەنىي سۇيۇقلۇقى كۆپ چىقىپ كېتىپ نەتىجىدە بەدىنى ئاجىزلىشىدۇ. بىر تەرەپتىن بۇ خىل ئادەت نېرۋىنى ئارتۇقچە غىدىقلاپ فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت پائالىيىتىنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقى، چارچاش پەيدا قىلىپ نېرۋىنى ئاجىزلاشتۇرسا، يەنە بىر تەرەپتىن بەدەننى قۇرۇتۇپ، بۆرەكنى زەئىپلەشتۈرۈپ، مېڭىنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، نېرۋا ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ. شۇڭا جەلق ئادىتىنىڭ پەيدا بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئارقىلىق نېرۋىنىڭ نورمال خىزمىتىنى ساقلاپ قالغىلى ۋە نېرۋا ئاجىز-

لىقىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىنى داۋالاش

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنى بالدۇر بايقاپ تېز تۇتۇش قىلىپ، ۋاقتىدا داۋالاش ئىنتايىن مۇھىم. بۇ كېسەللىكنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىپ نېرۋا پائالىيىتىنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق زىيانغا ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ۋە تولۇق ساقىيىش ئىمكانىيىتىنى قولغا كەلتۈرۈشتە زور ئەھمىيەتكە ئىگە.

ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش

بۇ كېسەللىك كۆپىنچە زىيالىيلاردا، نازۇك تەبىئەتلىك كىشىلەردە پەيدا بولۇپ، ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان كېسەللىك بولغىنى ئۈچۈن ئالدى بىلەن بىمارنىڭ ساقىيىشىغا بولغان ئىشەنچنى تىكلەش ۋە دىققەت قىلىدىغان مەسىلىلەرگە نىسبەتەن چۈشەنچىنى ئاشۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. بىر تەرەپتىن دورا ئىستېمال قىلىشى، يەنە بىر تەرەپتىن ئوزۇقلۇقنى مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ، مېڭىنىڭ ۋە ئومۇمىي بەدەننىڭ قۇۋۋىتىنى ساقلىشى، ئەقلىي ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى مۇۋاپىق بىرلەشتۈرۈشى، ھەر قانداق ۋاقىتتا تەبىئىي ھالدا كۆڭلىنى خۇشال-خۇرام تۇتۇشقا رىغبەتلەندۈرۈشى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

1. روھىي جەھەتتىكى داۋالاش

روھىي جەھەتتىن داۋالاش نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنى داۋالا-

شتىكى سەل قاراشقا بولمايدىغان ئۇسۇللارنىڭ بىرى. چۈنكى بۇ خىل كېسەل بىلەن ئاغرىغان بىمارلارنىڭ ھەر قاندىقى روھىي جەھەتتىن ئىنتايىن چۈشكۈنلۈشۈپ كېتىدۇ. ساقىيىشقا بولغان ئىشەنچىسى بەك-مۇ تۆۋەن بولىدۇ. ھەممىلا كىشىدىن رەنجىپلا يۈرۈشكە مايىل كېلىدۇ. شۇڭا داۋالىغۇچى دوختۇر ئالدى بىلەن بىمارنىڭ ساقىيىشىغا بولغان ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىرگە كېسەلنىڭ خىزمەت، تۇر-مۇش ۋە ئارام ئېلىشىغا بولغان تەلەپلەرنى مۇۋاپىق تەكىتلىشى، بىمارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى، دوستلىرى، خىزمەتداشلىرى مۇمكىنقەدەر كېسەلنىڭ ساقىيىشىغا يېقىندىن ياردەملىشىپ روھىي جەھەتتىن ئىلھام بېرىپ جىددىيلىشىش، روھىي كەيپىياتىنىڭ قالايمىقانلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەھۋاللاردىن ساقلىنىشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندا قىسمەن بىمارلار دورا ئىستېمال قىلماي تۇرۇپمۇ ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

2. مۇۋاپىق جىسمانىي ھەرىكەت ئارقىلىق داۋالاش

نېرۋا ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغان بىمارلار داۋالىنىش جەريانىدا يالغۇز دورىغىلا تايىنىۋېلىپ، ئەقلىي جەھەتتىكى ھارغىنلىق پەيدا قىلىدىغان تۈرلۈك خىزمەت، مەشغۇلاتلار بىلەن شۇغۇللىنىۋەرسە ئۇ ھالدا دورىنىڭ شىپالىق ئۈنۈمى ئانچە ياخشى بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كېسەل ئەقلىي جەھەتتىكى چارچاشنى مۇۋاپىق ئازايتىشى، مەلۇم پۇرسەت چىقىرىپ يېشىللىقلاردا سەيلە قىلىشى، ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرۇپ يەڭگىل دەرىجىدىكى يۈگۈرۈش، بەدەن چېنىقتۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندا نېرۋىنىڭ

ھەددىدىن ئارتۇق بىر نۇقتىغا مەركەزلىشىپ قېلىپ تۈرلۈك خىيالى
 سېزىملارنىڭ مېڭىنى كونترول قىلىۋېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.
 ئۇندىن باشقا كۆپ ھاللاردا يالغۇز قېلىشتىن ساقلىنىشى، ئۇنىڭ
 ئورنىغا كۈچلەرنى ئايلىنىشى، مۇۋاپىق جىسمانىي ئىش-ھەرىكەت
 بىلەن شۇغۇللىنىشى لازىم. ھەر كۈنى بىر-ئىككى قېتىم ئارام ئېلىش
 ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ قۇملۇق جايلاردا ياكى ياسالغان يوللاردا يالاڭ
 ئاياغ (پۇتىغا ئاياغ كەيمەي) بىر قانچە ئون مىنۇت مېڭىپ بېرىش
 پايدىلىق. بۇ پۇت ئالىقنى قىسمىدىكى نېرۋا تۈگۈنچىلىرىنى غىدىقلاپ
 نېرۋىلارنى قوزغىتىپ ھارغىنلىقنى تۈگىتىدۇ. بەدەن مۇسكۇللىرىنى
 ئۇۋۇلاش، پۇت-قوللارنى يەڭگىل مۇجۇپ تۇتۇش، سوغۇق سۇ بىلەن
 بەدەننى يۇيۇپ ياكى سوغۇق سۇغا چىلانغان لۆڭگە بىلەن بەدەننى
 ئىشقاپ سۈرتۈشى قاتارلىق ئىشلار نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىنىڭ
 داۋالىنىش باسقۇچىدا ماسلاشتۇرۇپ ئېلىپ بېرىلسا، كېسەلنىڭ
 ساقىيىشىغا ئىنتايىن پايدىلىق.

3. يېمەك-ئىچمەك ۋە تۇرمۇش ئادىتىنى تەرتىپكە سېلىپ داۋالاش
 نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىگە گىرىپتار بولغان بىمارلاردا روھىي
 قوزغىلىش نىسبەتەن كۆپ بولغىنى ئۈچۈن نېرۋا ھۈجەيرىلىرىگە
 بولغان ئېنېرگىيە سەرپىياتى ئاشىدۇ. بۇ خىل سەرپىياتنىڭ ئورنىنى
 تولۇقلاش ۋە يېتەرلىك بولۇشنى ساقلاشقا توغرا كېلىدۇ. بىراق نېرۋا
 ئاجىزلىقى بىلەن ئاغرىغۇچىلار ئوزۇقلىنىشقا ئانچە ئەھمىيەت بەرمەيدۇ.
 شۇڭا داۋالاش جەريانىدا بىمارنىڭ مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىشىغا بولغان

تەلەپنى كۈچەيتىپ كېسەلنىڭ مىزاجى، يېشى، بەدەن ھالىتىگە قاراپ ئومۇم بەدەن قۇۋۋىتىنى كۆزدە تۇتۇپ ئوزۇقلىنىش تەكلىپىنى بېرىش لازىم. بۇنىڭدا مېڭە، يۈرەك، جىگەر، بۆرەكنى كۈچەيتىدىغان يۇقىرى كالورىيىلىك يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش، بولۇپمۇ قوي، كالا گۆشى، تۇخۇم، سۈت، بېلىق ۋە قەنتلىك يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشقا بۇيرۇش، مېۋىلەردىن ئانار، ئالما، بادام، ياڭاق، ئۈزۈم ئىستېمال مال قىلىپ بەرسە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈپ، نېرۋىنى كۈچەيتىش مەقسىدىگە يەتكىلى بولىدۇ. تۈرلۈك كۆكتاتلارنى كۆپ مىقداردا ئىستېمال قىلسا بولىۋېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيقۇسى تولىمۇ ناچارلىشىپ قالغان بىمارلار خام قاپاقنى سەي ئورنىدا ئىستېمال قىلسا، مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزۈپ ئۇيقۇنى ياخشىلاش تەسىرىنى بېرىدۇ.

دورا بىلەن داۋالاش

نېرۋا ئاجىزلىقى كېسىلىنى دورا بىلەن داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەلنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەبىنى ئېنىقلاپ، شۇنىڭغا قارىتا داۋالاش ئېلىپ بېرىشى، يەنى نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ قايسى خىل تۈردىكى نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىگە مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئەستايىدىللىق بىلەن تەكشۈرۈپ مۇقىملاشتۇرغاندىن كېيىن داۋالاش ئېلىپ بېرىشى بۇ كېسەلنىڭ ۋاقتىدا ساقىيىپ سالامەتلىكىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ.

1. خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن پەيدا بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى.

نى داۋالاش

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىلمى خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان كېسەللىكلەرگە نىسبەتەن ئالدى بىلەن خىلىتلارنى تەڭشەپ مىزاجىنى نورماللاشتۇرۇپ داۋالاشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويدى. نېرۋا ئاجىزلىقى قان ياكى سەپرا ماددىسىنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى ئىگىلىشىدىن پەيدا بولسا بىمارغا ئالدى بىلەن تۆۋەندىكى مەتبۇخنى بېرىش كېرەك. ئەفتمۇن (سېرىق ئوت) 30g، بىستىپايەنج 5g، گاۋزىبان 10g، قىزىلغان پىلە 15g، نېلۇپەر 6g، ئەينۇلا 15g، شاھتەرە 15g، چىلان 20g، تەمرى ھىندى 25g. تەييارلىنىشى: تەمرى ھىندىنى ئايرىم قايناق سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەفتمۇننى ئايرىم داكا خالتىغا سېلىپ تەييارلاپ، قالغان دورىلارنى 2000ml سۇ بىلەن قاينىتىپ، 1300ml سۈيى قالغاندا ئەفتمۇننى ئۈستىگە سېلىپ، يەنە بىر قاينىتىپ، ئۈستىگە تەمرى ھىندىنىڭ سۈيىنى قويۇپ، سۈزۈپ، 50g قىزىلگۈل گۈلچەنتىنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، ھەر قېتىمدا 100mg دىن كۈنىگە 3 ۋاخ 8 كۈنگىچە ئىچۈرۈلىدۇ. بۇ دورا قان ۋە سەپرا ماددىسىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىدۇ. قان تومۇرلارنى كېڭەيتىپ، قان ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرىدۇ. سەپرا ماددىسىنى تازىلاش تەسىرىنى بېرىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئىترىفىل، ئۈستقۇددۇس، سۇفۇپى كەشنىزى، شەرىبىتى سۇمبۇل، مەجۇنى نۇجاھ قاتارلىق دورىلارنى قائىدە بويىچە ئىچىشكە بېرىشى لازىم. بىمارنىڭ ئۈسسۈلۈقى ئۈچۈن

گاۋزبان، سۇمبۇل، قىزىلگۈل، ئۈستقۇددۇس 30g دىن، كۆكنار
 شاكىلى، سېرىقچىچەك 10g دىن ئېلىپ دەملەپ ئىچۈرۈش لازىم.
 كېسەلنىڭ تاپان ھەم ئالغان قىسمىنى بادام مېيى بىلەن مايلاپ بېرىش
 كېرەك. چىكە قىسمىنى 20g بادام مېيىغا 2g كاپۇر ئارىلاشتۇرۇپ،
 مايلاپ بېرىلسە ئۇيقۇ كەلتۈرۈدۇ، نېرۋىنى سەگىتىش تەسىرىنى بېرد-
 دۇ. داۋالاشنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا خېمىرى سەندەل، خېمىرى
 گاۋزبان ئەنبرى، شەرىتى ئەۋرىشم قاتارلىقلار ئىچكۈرۈلسە بولىدۇ.
 نېرۋا ئاجىزلىقى سەۋدا ياكى بەلغەم ماددىسىدىن پەيدا بولغان
 بولسا: ئەفتمۇن 30g، شاھتەرە 20g، تۇربۇت 15g، چۆپچىن،
 سېرىق ھېلىلە پوستى، كابىلە، ھېلىلە پوستى، بەلىلە پوستى، قارا
 ھېلىلە 15g دىن، سانائى مەككى 20g، سېرىقچىچەك، ئۈستقۇددۇس،
 گاۋزبان، قىزىلگۈل 10g دىن، سېمىز ئوت ئورۇقى، قاپاق ئورۇقى
 مېغىزى، كاسىنە ئورۇقى، بالەنگۇ، فەرەنجىمىشكى 30g دىن، چىلان
 20 دانە، تەرەنجىبىن 100g، بادام يېغى 20g، فۇلۇسى 30g، بۇ
 دورىلارنى كۆرسەتمە بويىچە ئېلىپ سانا، ئەفتمۇن، تەرەنجىبىن،
 فۇلۇس، بادام يېغىدىن باشقىلىرىنى 3000ml سۇدا قاينىتىپ
 2000ml سۈيى قالغاندا، سانا ھەم ئەفتمۇننى سېلىپ، بىرلا قاينىد-
 تىپ، ئۈستىگە تەرەنجىبىن فۇلۇسىنى چىلاپ قويۇپ، تەمى چىقىرىل-
 غان سۇنى قويۇپ، سۈزۈپ، بادام مېيىنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
 كۈنىگە 150ml دىن كۈنىگە 3 ۋاخ 15 كۈنگىچە ئىچۈرۈلىدۇ. ئەگەر
 بىماردا ئىچى بەك سۈرۈپ كېتىش، سۈيدۈك مىقدارى كۆپىيىش

ئەھۋالى كۆرۈلسە دورا ئىچۈرۈش ۋاقتىنى ئەھۋالغا قاراپ قىسقارتسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن بىمارغا ئىترىفىل ئەفتمۇنى 10g دىن 3 ۋاخ، مەجۇنى نۇجەھنى 6g دىن 3 ۋاخ، شەرىپتى سۇمبۇلى 100g دىن 3 ۋاخ ئىچۈرۈشى، چاي ئورنىدا قىزىلگۈل، گاۋزبان ھىندى، سۇمبۇل، بىدىمىشكى، لاچىندانە ھىندىلارنى 10g دىن ئېلىپ، زەپەر 1g قوشۇپ دەملەپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. داۋالاشنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا شەرىپتى ئەۋرىشم، ماددەتۇلھايات، داۋائىلمىشكى مۆتىدىل، ھەب-بى ئازراقى قاتارلىق دورىلار مۇۋاپىق مىقداردا ئىچۈرۈلسە بولىدۇ. تۆۋەندىكى داۋالاش ئۇسۇلى تۆت خىلنىڭ قايسىسىنىڭ ئۆز-گىرىشىدىن پەيدا بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى بولسۇن قوللىنىشقا بولىۋېرىدۇ. مەتبۇخى ئەفتمۇن: تەركىبىي سېرىق ئوت، كابىلە ھېلىلە پوستى، ئۈستقۇددۇس ھىندى، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، بىستىپايەنج ھىندى 30g دىن، تۇربۇت 12g، سانائى مەككى 20g، سانا، سېرىق ئوتتىن باشقا دورىلارنى 2500ml سۇدا قاينىتىپ، 1500ml سۈيى قالغاندا ئۈستىگە سانا، سېرىق ئوتنى سېلىپ، بىرلا قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 200ml دىن 3 ۋاخ ئىچۈرۈلىدۇ. ئىچۈرۈشنى 10 كۈن داۋاملاشتۇرۇش لازىم. بۇ دورا مېڭىدىكى بۇزۇلغان خىلىتلارنى تازىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش، مېڭىنىڭ ماددا ئالمىشىشنى نورماللاشتۇرۇش تەسىرىنى بېرىدۇ.

ئومۇمىي بەدەن ۋە نېرۋىنى كۈچەيتىش مەقسىدىدە خېمىرى ئەۋرىشم، ماددەتۇلھايات، ئىترىفىلى ئۈستقۇددۇس، شەرىپتى سۇمبۇل

قاتارلىق دورىلار قائىدە بويىچە ئىچۈرۈلىدۇ. ئەگەر بىمارنىڭ ئۇيقۇسى ئاز بولۇپ تىنچىسىزلاىسا بەرششا كۈنىگە 2g دىن 3 ۋاخ بېرىلىدۇ. مەجۇنى مۇنەۋۋىم كۈنىگە 10g دىن 3 ۋاخ يۇقىرىقى دورىلارغا قوشۇپ بېرىش كېرەك. قاپاق مېيى بىلەن ياكى رەۋغەنى مۇنەۋۋىم بىلەن كۈندە كەچتە چىكە قىسمىنى مايلاپ بەرسە ئۇيقۇنى ياخشىلىشى مۇمكىن.

2. قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقىنى داۋالاش
نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ بۇ خىل تىپىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش ئۈچۈن شەرىپتى سۇمبۇلدىن كۈنىگە 50g دىن 3 ۋاخ بېرىشى ياكى بەرششا كەبىردىن كۈنىگە 2g دىن 3 ۋاخ بېرىشى لازىم. ئۇسسۇلۇقى ئۈچۈن گاۋزبان، سۇمبۇل 20g دىن، كۆكنار شاكىلى 10g، قىزىلگۈل 15g، رەيھان ئۇرۇقى 10g، بادىرەنجى بۇيا 15g، بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ، چالا يانچىپ، دەملەپ ئىچىلسە بولىدۇ. مېڭىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن خېمىرى گاۋزبان ئەنسىرى كۈنىگە 5g دىن 3 ۋاخ، ماددەتۇلھايات 10g دىن 3 ۋاخ، ئىترىفىل ئۈستقۇددۇس كۈنىگە 6g دىن 3 ۋاخ بېرىش لازىم. نېرۋا قوزغىلىشى سەۋەبلىك ئۇيقۇسىزلىق ئېغىر بولسا رەۋغەنى مۇنەۋۋىم ياكى كاپۇر قوشۇلغان گۈل مېيى بىلەن بىمارنىڭ ئىككى چىكە قىسمىنى كۈنلۈكى كەچتە مايلاپ بېرىش كېرەك ھەم قاينىتىپ بولۇپ سوۋۇتۇلغان كالا سۈتىدىن بىر ئىستاكان ئىچىپ بەرسە ئۇيقۇنى ياخشىلاپ، نېرۋىغا ئارام بېرىدۇ. تامىقىغا قوي گۆشنىڭ شورپىسى ھەم ئوزۇقلۇق قىممەت.

تى يۇقىرى، مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزۈپ بېرىدىغان تاماقلار، كاللا-پا-
قالچاق گۆشى، قايماق، بادام، ياڭاق، ئالما، ئەنجۈر قاتارلىقلارنى
مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىشلار پايدىلىق. كۆكتاتلارنى كۆپ ئىستېمال
قىلىشى، ئۇيقۇسى بەك ئاز بولسا قايماق ئېشى ئېتىپ ئىچىشى لازىم.

3. زەئۇپلىشىش تېلىق نېرۋا ئاجىزلىقىنى داۋالاش

كېسەلگە مېڭە، يۈرەكنى كۈچەيتىش، بۆرەك ھەم ئومۇمىي
بەدەنگە قۇۋۋەت بېرىش تەسىرىگە ئىگە دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.
بۇنىڭ ئۈچۈن خېمىرى مەرۋايىت، شەربىتى ئەۋرىشىم، ماددەتۇلھايات،
ھەببى ئازراقى، لوبۇبى كەبىر قاتارلىق دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ ياكى
تاللاپ بېرىلسە بولىدۇ. ئۇسسۇلۇقى ئۈچۈن دارچىن، خولنىجان،
لاچىندانە ھىندى 10g دىن چالا سوقۇپ، قاينىتىپ، سۈيىگە مۇۋاپىق
ھەسەل قوشۇپ ئىچۈرۈشى، كېسەلنىڭ تاپان ۋە پاقالچەك قىسمىنى
تۇخۇم مېيى ياكى قۇستە مېيى بىلەن يەڭگىل مايلاپ بېرىشى،
تامىقىغا زىرە، قارىمۇچ سېپىلگەن كاۋاپ بېرىشى، سۈت، تۇخۇم،
شېكەرنى قوشۇپ قاينىتىپ ئىچىشى لازىم.

قۇرۇتۇلغان قىزىل ئۈزۈم 500g، بادام مېغىزى 500g، ياڭاق
مېغىزى 500g، شاقاقۇل تالقىنى 250g، سۆڭلەپ مىسىرى 100g،
ئاقىر قەرھە ھىندى 50g، ھەسەل 2Kg، بۇلارنى قانداق بويىچە
خېمىر دورا قىلىپ تەييارلاپ، كۈنىگە 20g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال
قىلسا، نېرۋا ھەم بۆرەكنى كۈچەيتىدۇ. ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ.

4. قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىش بىلەن زەئۇپلىشىش قوشۇلۇپ كەل-

گەن نېرۋا ئاجىزلىقىنى داۋالاش

بىمارنىڭ نېرۋىسىنى تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار بىلەن مېڭىنى كۈچەيتكۈچى، يۈرەك، بۆرەك قاتارلىق ئەزالارغا قۇۋۋەت بەرگۈچى، پەي-نېرۋىلارنى كۈچلەندۈرگۈچى دورىلارنى بىرلا ۋاقىتتا ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن شەرىبىتى سۇمبۇل ياكى شەرىبىتى فەرەنجىمىش-كى، خېمىرى گاۋزىبان ئەنسىرى، جەۋھىرى مۇپەررىھى-ئەۋرىشم ياكى شەرىبىتى ئەۋرىشم، ماددەتۇلھايات قاتارلىق دورىلار تاللاپ ئىشلىتىلسە بولىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ لوبۇب كەبىر، ھەببە ئازاراقى قاتارلىق دورىلار قوشۇپ بېرىلسە، بۆرەكنى سەمىرىتىپ، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، پەي-نېرۋىلارنى كۈچەيتىش تەسىرىنى بېرىدۇ.

5. زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك نېرۋا ئاجىزلىقىنى داۋالاش

ئالدى بىلەن بىمارنىڭ مېڭە قان-تومۇرلىرى ھەم ئومۇمىي بەدەندىكى زەھەرلىك ماددا قالدۇقلىرىنى تازىلاپ چىقىرىپ، كېسەللىك ماددىسىنى تۈگىتىش ئۈچۈن يەڭگىل تۈردىكى تەنقىيە بېرىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن سېرىق ئوت 30g، كابىلە ھېلىلە پوستى، ئۇستقۇد-دۇس، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، چىلان ھەرقايسىسى 30g دىن، بىستىپايەنج ھىندى 15g، تۇربۇت 10g، قىزىلگۈل، سانائى مەككى 20g، شاھتە-رە، خىيارشەنبەر 30g. دورىلارنى تەييارلاشتا سانا، سېرىق ئوت، خىيار شەنبەردىن باشقا دورىلارنى 1500ml سۇغا چىلاپ، قاينىتىپ، 1000ml سۈيى قالغاندا سانا، سېرىق ئوتنى سېلىپ، يەنە بىرلا

قاينىتىپ، ئۈستىگە خىيار شەنبەرنى چىلاپ، تەمى چىقىرىلغان سۇنى قۇيۇپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 100g دىن 3 ۋاخ ئىچۈرۈش كېرەك. ئەگەر بىمارنىڭ بەدىنى ئورۇق، تەن قۇرۇلۇشى ئاجىز بولسا يۇقىرىقى دورىنى بېرىشكە بولمايدۇ. ئۇ ھالدا كابىلە ھېلىلىسى پوس-تى، تۇربۇت، بىستىپايەنج ھەر قايسىسى 20g دىن، سېرىق ئوت 50g، ئۈستقۇددۇس 10g، قىزىلگۈل 50g، ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل، گاۋزىبان، بادىرەنجى بۇيا 30g دىن، ھەسەل 500g، يۇقىردى-قى دورىلارنى قانئەدە بويىچە شەربەت تەييارلاپ، كۈنىگە 100ml دىن 3 ۋاخ ئىچىشكە بېرىلسە بولىدۇ. داۋائىلىمىشكى مۆتىدىل 5g دىن 3 ۋاخ، بەرشىشا 2g دىن 3 ۋاخ، مەجۈنى ئۈستقۇددۇس 10g دىن 3 ۋاخ بېرىش كېرەك. كېسەلنىڭ ئۇيقۇسى كەم بولسا قاپاق مېيى ياكى بادام مېيى بىلەن بىمارنىڭ ئىككى چېكىسىنى مايلاپ بەرسە بولىدۇ. رەيھان، قىزىلگۈل، گاۋزىبان، لاچىندانە ھىندى، سۇمبۇل ھەر قايسى-دىن 20g دىن ئېلىپ، 1g زەپەر قوشۇپ، دەملەپ ئىچىشكە بېرىش لازىم.

نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلىدىغان مۇرەككەپ دورا نۇسخىلىرى ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى

شەربىتى ئەۋرىشىم

پىلە غوزىسى 500g، خولىنجان، مەستىكى، ئېگىر ھەر بىرىدىن 30g، زەپەر 10g، شېكەر 3000g، سۇ 6000ml. پىلە غوزىسىنى

قايچا بىلەن ئۇششاق قىرقىپ، ئىچىدىكى قۇرتلىرىدىن ئايرىپ تاللاپ، خولىنجان ۋە ئېگىرنى چالا سوقۇپ، قوشۇپ، دورىلارنى سۇغا بىر سوتكا چىلاپ قويۇپ، قاينىتىپ، سۇنىڭ يېرىمى قالغاندا دورا تىرىپلىرىنى سۈزۈپ ئېلىۋېتىپ، سۈيىگە شېكەر سېلىپ، سۇس ئوتتا قىيام قىلىنىدۇ. قىيامنى بىر ئاز سوۋۇتۇپ زەپەر بىلەن مەستىكىدە. نى يۇمشاق سالايە قىلىپ، ئۈستىگە سېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. ھەر خىل قۇرۇق سوغۇقتىن بولغان نېرۋا، يۈرەك ئاجىزلىقى، ئۈنۈتقاچلىق، يۈرەك سېلىش، يۈرەك تىترەش، جىنسىي ئاجىزلىققا ئىشلىتىلىدۇ. چوڭلار كۈنىگە 50g~30g دىن كۈنىگە 3 ۋاخ، بالىلارغا مىقدارىنى مۇۋاپىق ئازايتىپ بەرسە بولىدۇ.

شەرىپىتى سۈمبۇل

سۈمبۇل 60g، شېكەر 500g. سۈمبۇلنى چالراق سوقۇپ 1000ml سۇغا بىر سوتكا چىلاپ قويۇپ، قاينىتىپ، 500ml سۈيى قالغاندا سۈزۈپ، دورا سۈيىنى 2 سائەت تىندۈرۈپ، ساپ سۈزۈك دورا سۈيىگە شېكەر سېلىپ، سۇس ئوتتا قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق، روھى جىددىيلىك، ھەر خىل نېرۋا كېسەللىكلىرىگە بېرىلىدۇ. چوڭلارغا 50ml~30g دىن كۈنىگە 3 ۋاخ، بالىلارغا مىقدارىنى ئازايتىپ بەرسە بولىدۇ.

كېۋەز چىچىكى شەرىپىتى

كېۋەزنىڭ ئېچىلىپ يەرگە چۈشمىگەن چىچىكىدىن 500g،

زەپەر 5g، شېكەر 1500g، سۇ 2000ml. كېۋەز چېچىكىنى پاكىز تازىلاپ، سۇ بىلەن قاينىتىپ، 1300ml قالغاندا سۈزۈپ، سۈيگە شېكەر سېلىپ، يەڭگىل ئوت بىلەن قىيام قىلىدۇ. قىيام سوۋۇغاندىن كېيىن زەپەرنى سالايە قىلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. ھەر خىل نېرۋا كېسەللىكلىرى، ئۇيقۇسىزلىق، ھېس تۇيغۇلار- نىڭ قالايمىقانلىشىشى، روھىي ئاجىزلىق، كۆپ سۆزلەپ ئېسىنى يىغىۋالمايلىق، ئېھتىناقى رەھىمى كېسەللىكلىرىگە بېرىلىدۇ. 30~50ml دىن كۈنىگە 3 ۋاخ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.



شەرىپىتى ئەفتمۇن مۇرەككەپ

سېرىق ئوت 50g، كابىلە ھېلىلە پوستى 20g، قارا ھېلىلە 15g، چىلان 30g، ئۈستقۇددۇس ھىندى 40g، تۇربۇت 15g، قىزىلگۈل 30g، گاۋزبان 25g، سۇمبۇل 20g، شېكەر 1000g، سۇ 1500ml. سېرىق ئوتنى داكا خالتىغا ئوراپ، باشقا دورىلارنى چالا سوقۇۋېتىپ، سۇغا چىلاپ قاينىتىپ، 1000ml سۈيى قالغاندا سېرىق ئوت ئورالغان خالتىنى (سېرىق ئوتنى) سېلىپ، يەڭگىل ئوت بىلەن بىرلا قاينىتىپ، سۈزۈپ، شېكەر بىلەن قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. سەپرا، سەۋدادىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى، باش ئاغرىقى، ئۇيقۇسىزلىق، باش قېيىش، يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى، يارتا پالەچ كېسەللىكلىرىگە كۈنىگە 50g دىن 3 ۋاخ بېرىلىدۇ.

شەرىپىتى فەرەنجىمىشكى

فەرەنجىمىشكى، گاۋزىبان ھىندى، بادىرەنجى بۇيا 50g دىن، زەپەر 1g. يۇقىرىقى 3 خىل دورىنى چالا سوقۇپ، 1500ml سۇدا قاينىتىپ، سۇنىڭ يېرىمى قالغاندا سۈزۈپ، 500g شېكەر بىلەن قىيام قىلىپ بولۇپ، بىر ئاز سوۋۇتۇلغاندىن كېيىن زەپەرنى سالايە قىلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. مېڭىنى كۈچەيتىدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق ۋە يۈرەك سېلىشقا بېرىلىدۇ.

خېمىرى ئەۋرىشمى

قىزىلغان پىلە غوزىسى 300g، ئۇد ھىندى 3g، سۇمبۇل، پوستى ئۇترۇج، مەستىكى رۇمى، قەلەمپۇر، لاچىندانە ھىندى، سازەج ھىندى، ئاق سەندەل ھەر بىرى 5g دىن، ئەرقى گاۋزىبان، ئەرقى گۇلاب، ئالما سۈيى، ئانار سۈيى ھەر بىرى 120g دىن، سۇ 1500ml، ھەسەل 180g، قەن 500g، پىلە غوزىسىنى سۇ ۋە ئەرەقلەرگە بىر سوتكا چىلاپ قويۇپ، قاينىتىپ قۇۋۋىتى چىققاندىن كېيىن سىقىپ، سۈزۈپ، تەييارلانغان دورا سۈيىگە ئالما، ئانار سۈيىنى قوشۇپ ئۈستىگە قەنت ۋە ھەسەلنى سېلىپ، قاينىتىپ، قىيام قىلىپ ئۈستىگە نۇسخىدىكى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. يۈرەك ئاجىزلىقى، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، خەفەقان، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى ئۈچۈن، كۈندە 5g دىن 2 ۋاخ بېرىلىدۇ.

خېمىرى مەرۋايىت

تېشىلىمىگەن مەرۋايىت 10g، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى، كاسىنە گۈلى، كاسىنە ئۇرۇقى، فەرەنجىمىشكى، گاۋزىبان، بادىرەنجى بۇيا ھەر بىرى 6g دىن، قىزىلغان پىلە غوزىسى 10g، ئەرقى گۈلاب، ئەرقى گاۋزىبان ھەر بىرى 10ml دىن، ئىپار، ئەنبەر ھەر بىرى 1g، ئالما شەربىتى، ئامىلە مۇرابباسى ھەر بىرى 100ml دىن، ناۋات 200g. مەرۋايىتىنى ئەرقى گۈلاب ۋە ئەرقى گاۋزىبان بىلەن سالاھىيە قىلىپ، ئۆپىدەك يۇمشىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، شەربەت، مۇراببالار بىلەن قىيام قىلىپ، ئۈستىگە دورا تالقانلىرىنى سېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ خېمىر قىلىنىدۇ. مېگە، يۈرەك، جىگەرنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاشقا، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇشقا بېرىلىدۇ. كۈنىگە 3g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

خېمىرى گاۋزىبان

گاۋزىبان، ئاقلانغان يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى، قىزىلغان پىلە غوزىسى، ئاق بەھمەن، بالەنگۈ ئۇرۇقى، ئىكەكلەنگەن ئاق سەندەل، فەرەنجىمىشكى ھەر بىرى 10g دىن، ئەنبەر 1g، مەرۋايىت، ئىپار 0.5g دىن، ناۋات 360g، ئىپار، ئەنبەر، مەرۋايىتلارنى يۇمشاق سالاھىيە قىلىپ، ئېزىپ، باشقا دورىلارنى چالا سوقۇپ، 1000ml سۇدا قاينىتىپ، 1/3 قىسىم سۈيى قالغاندا سۈزۈپ، ناۋات بىلەن قىيام قىلىپ، قىيام بىر ئاز سوۋۇتۇلغاندىن كېيىن سالاھىيە قىلىپ، تەييارلانغان


دورلارنى سېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ خېمىر قىلىندۇ. مېڭە، يۈرەكنى كۈچەيتىش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش ئۈچۈن بېرىلىدۇ، كۈنىگە 5g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال قىلىندۇ.

داۋائىلىمىشكى مۆتىدىل

تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، مارجان، كەھرېۋا، دۈرنەج ئەقرەبى، پىلە غوزىسى، زورەمبات، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن 6g دىن، قەلەمپۇر، ئۆشەنە، سۈمبۇل، لاچىندانە ھىندى، سازەج ھىندى، دارچىن، زەپەر، مەستىكى، تاباشىر، ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل 2g دىن، ئەنبەر 3g، ئىپار 2g، ھەسەل 3 ھەسسە. زەپەر، ئىپار، ئەنبەرلەرنى سالايە قىلىپ، قالغان دورىلاردىن مەرۋايىت، مارجان، كەھرېۋالارمۇ ئايرىم سالايە قىلىندۇ. باشقا دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەلنى ئېرىتىپ، سالايە قىلغان دورىلارنى، ئاندىن باشقا دورىلارنى ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ مەجۈن قىلىندۇ.

ھەر خىل تىپتىكى نېرۋا ئاجىزلىقى، يۈرەك ئاجىزلىقى كېسەللىك.

لىرىگە كۈنىگە 5g دىن 3 ۋاخ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.



ئىترىفىلى ئۈستقۇددۇس

بەھار
نۇسخا

ئۈستقۇددۇس ھىندى 30g، ئەفتمۇن، ئۇد سەلىب، تۇربۇت، بادىرەنجى بۇيا، ئەفسەنتىن ھەر بىرىدىن 15g، كابىلە ھېلىلە پوستى، بەلىلە پوستى، ئامىلە، قارا ھېلىلە ھەر بىرى 20g دىن، ھەسەل پۈتۈن دورا مىقدارىنىڭ 3 ھەسسەسىگە باراۋەر ئېلىندۇ. دورىلارنى يۇمشاق

سوقۇپ تالقان قىلىپ، ھەسەلنى ئېرىتىپ، كۆپۈكنى ئېلىۋېتىپ، تالقان قىلىنغان دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. باش ئاغرىقى، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۈنۈتقاقلق، چاچ بالدۇر ئاقىرىپ كېتىش، مېڭە قان تومۇر قېتىش، قاندىكى ماي يۇقىرىلاشلارغا بېرىلىدۇ. كۈنىگە 6g دىن 3 ۋاخ چىلان سۈيى بىلەن ئىچىپ بېرىلىدۇ.

ئىتتىرىقلى سەغىر

ھېلىلە كابىلە پوستى، سېرىق ھېلىلە پوستى، بەلىلە پوستى، قارا ھېلىلە، تازىلانغان ئامىلە ھەر بىرى 30g دىن، ھەسەل 3 ھەسسە. يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، 30g بادام مېيى بىلەن مايلاپ، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، خېمىر قىلىنىدۇ. كۈنىگە 10g دىن 2 ۋاخ قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. مېڭە تومۇرلىرىدىكى توسالغۇلارنى تۈگىتىپ، زېھنى كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. بوۋاسىر كېسەللىكىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

ماددە تۇلھايات

زەنجىۋىل، قارىمۇچ، پىلىپىل. دارچىن، ئامىلە پوستى، بەلىلە پوستى، شاترەنجى ھىندى، زىراۋەندى، سۆڭەك، چىلىغوزا مېغىزى، بابۇنە يىلتىزى، نارجىل ھەر بىرى 30g دىن، بابۇنە ئۇرۇقى 15g، ئۈزۈم 90g، ھەسەل 1400g. ئۈزۈمنى ئايرىم ئېزىپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، قالغان دورىلارنى ئېزىپ، تالقان قىلىپ، ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ. ئەزالارنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ھۆل.

لۈكنى ئازايتىدۇ. ئاغرىق پەسەيتىدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقى، تىل ئېغىرلىق-
شىپ قېلىش، ئىشتىھاسىزلىق، بەل-پۇت ئاغرىقى، بۆرەك ۋە جىنسىي
ئاجىزلىق كېسەللىكلىرىگە بېرىلىدۇ. كۈنىگە 3 ۋاخ، تاماقتىن كېيىن
10g دىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

مەجۈنى ئەفتمۇن

ئەفتمۇن 30g، ئۈستقۇددۇس ھىندى، تۇربۇت، بىستىپايەنج،
ئاقىر قەرھە، ھەر بىرى 20g دىن، سوقمۇنىيا 3g، زەپەر 1g، ھەسەل
250g، زەپەر، سوقمۇنىيا يۇمشاق سالايە قىلىنىدۇ. باشقا دورىلارنى
سوقۇپ، تالقان قىلىپ، ھەسەلنى ئېرتىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
سەپرا، سەۋدا، بەلغەمدىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكى، مېڭە
قان تومۇر توسۇلۇشتىن بولغان يېرىم پالەچ، ئۇنۇتقاقلىق، تۇتقاقلىق
كېسەل، سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقى ئۈچۈن بېرىلىدۇ. كۈنىگە
6g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال قىلىنسا بولىدۇ.

مەجۈنى نۇجاھ

كابل ھېلىلىسى پوستى، بەلىلە پوستى، ئامىلە، قارا ھېلىلە
ھەر بىرى 30g دىن، بىستىپايەنج، ئەفتمۇن، ئۈستقۇددۇس، تۇربۇت
ھەر بىرى 15g دىن، ھەسەل 360g. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۈن قىلىنىدۇ. مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. سەۋدا-
نى تەڭشەيدۇ. نېرۋا ئاجىزلىقى، ھەر خىل مېڭە كېسەللىكلىرى،
تۇتقاقلىق كېسەل، مالېخۇلىيا كېسەللىكىگە بېرىلىدۇ. كۈنىگە 6g دىن

3 ۋاخ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

لوبۇبى كەبىر

پىستە مېغىزى، پىندىق مېغىزى، بادام مېغىزى، ھەببۇزەلەم مېغىزى، قۇمبېلىقى، خولىنجان، شاقاقۇل، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھ-مەن، ئاق تۇدەرى، قىزىل تۇدەرى، زەنجىۋىل، كۈنجۈت، دارچىن 15g دىن، سۇمبۇل، سەئىدى كۇفى، قەلەمپۇر، كاۋاۋىچىن، ھەببى قەلقلە، سەۋزە ئۇرۇقى، چامغۇر ئۇرۇقى، پىياز ئۇرۇقى، تۇرۇپ ئۇرۇقى، بېدە ئۇرۇقى، ھەلىۈن ئۇرۇقى، ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى، دورنەچ ئەقرەبى، زورەمبات 9g دىن، جويۇز، بەسباسە، سۇمبۇل، پىلىپىل 6g دىن، سۆڭەك، نارجىل، قۇشقاچ مېڭىسى، كۆكنار ئۇرۇقى 8g دىن، ئىكەك-لەنگەن بۇقا چۈيىسى، سۈرۈنجان، بوزىدان، پىننە 12g دىن، زەپەر، مەستىكى 9g دىن، ئۇدخام 8g، ئالتۇن ۋاراق 30 دانە، كۈمۈش ۋاراق 50 دانە، ئەنبەر 5g، ئىپار 2g، ھەسەل 3 ھەسسە. يۇقىرىقى دورىلارنى قاندىلىك مەجۇنات تەييارلاپ، كۈنىگە 6g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال قىلىنىدۇ. مېڭە، يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ. بۆرەكنى قىزىتىپ كۈچلەندۈرىدۇ، مەنىي كۈچەيتىدۇ. كۆڭۈلگە خۇشلۇق كەلتۈرىدۇ، ئومۇمىي بەدەننى سەمىرتىدۇ، پەي-نېرۋىلارنى كۈچەيتىدۇ.

مەجۇنى مەسھا

ئاقىر قەرھا 18g، ئاقمۇچ، مەستىكى، دارچىن 21g دىن، زەپەر 9g، قاقىلە 12g، قەلەمپۇر 30g، جويۇز، نەشە 9g دىن، ئىپار

2g ، بادام مېيى 30g ، ھەسەل 3 ھەسسە. زەپەر ۋە ئىپارنى سالايە قىلىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، بادام مېيىدا مايلاپ، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇنات تەييارلىنىدۇ. مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، باھنى كۈچەيتىپ، جىنسىي قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ، مەنىي كۈچەيتىدۇ.

مەجۇنى مۇنەۋۋىم

قاپاق ئۇرۇقى مېڭىزى، قارا سۇنا ئۇرۇقى مېڭىزى، تەرخەمەك مېڭىزى، بادام مېڭىزى، كۆكنار ئۇرۇقى، گۈلى گاۋزىبانلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، 2 ھەسسە ئېرىتىلگەن ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۇنات تەييارلىنىدۇ، كۈنىگە 10g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال قىلىنىدۇ. ئۇيقۇ كەلتۈرۈپ، مېڭىنى كۈچەيتىدۇ. سەپرادىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى، باش ئاغرىش، ئۇيقۇسىزلىق كېسەللىكلەرگە ياخشى پايدا قىلىدۇ.

سۇفۇپى مۇنەۋۋىم

ئۇد خام، كۈندۈر 3g دىن، كۆكنار ئۇرۇقى 30g ، قارا سۇنا ئۇرۇقى 15g ، زەپەر 1g ، ناۋات 60g . دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىنىدۇ. كۈنىگە 3g دىن 3 ۋاخ ئىستېمال قىلىنىدۇ. نېرۋىنى ياخشىلايدۇ. ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

سۇفۇپى كەشنىزى

قۇرۇق يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى 20g ، ئاق سەندەل، سېمىز ئوت

ئۇرۇقى، زەھرەمۇھرەچىنى، تاباشىر، گاۋزبان گۈلى 6g دىن، ناۋات 50g. يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ، كۈنگە 6g دىن 3 ۋاخ ئىچىدۇ. قان، سەپرادىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى، مالېخۇليا كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

تاتلىق بادام مېيى

تاتلىق بادام مېغىزىنى يۇمشاق سوقۇپ، لىگەننىڭ بىر يېنىدا قويۇپ، تۇتۇپ تۇرۇپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ بېرىلسە، بىر تەرىپىگە مېيى ساقىپ يىغىلىدۇ ياكى تازىلانغان جۇۋاز ئارقىلىق بادامنىڭ مېيى ئېلىنسۇمۇ بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن باش ۋە چېكە قىسمىنى مايلاپ بەرسە مېڭىدىكى قۇرۇقلۇقنى يوقىتىپ، ھۆللۈك پەيدا قىلىدۇ، ئۇيقۇسىزلىقنى يوقىتىدۇ.

قاياق مېيى

خام قاياقنى (ھۆل قاياقنى) ئاقلاپ، گۆشى ۋە ئۇرۇقلىرى بىلەن سوقۇپ، سىقىپ ئېلىنغان سۇنىڭ 4 ھەسسسىگە بىر ھەسسە كۈن-جۈت مېيى ئارىلاشتۇرۇپ، قاينىتىپ، سۇ قىسمى پارغا ئايلىنىپ ماي قىسمى قالغاندا سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. سىرتىدىن باش ۋە چېكە قىسمى مايلىنىدۇ. مېڭىنى ھۆللەشتۈرۈپ ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

رەۋغەنى مۇرەتتىپ

قاياق ئۇرۇقى مېغىزى، تەرخەمەك ئۇرۇقى مېغىزى، بادام مېغىزى.

زى، كۆكنار ئۇرۇقى، قارا سۇنا ئۇرۇقلىرىنى تەڭ مىقداردا بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ، سىقىپ، سۈيى ئېلىنىپ، 4 ھەسسە دورا سۈيىگە بىر ھەسسە كۈنجۈت مېيى قوشۇپ، قاينىتىپ، مېيى ئېلىنىدۇ. مېڭىنى ھۆللەشتۈرۈپ، قۇرۇقلۇقنى يوقىتىدۇ. ئىسسىقلىق بولغان باش ئاغرىقلىقىنى پەسەيتىدۇ، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم يەككە

دورىلار ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى

سېرىق ھېلىلە

تەبىئىي: قۇرۇق سوغۇق.

تەسىرى: مېڭە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، سەپرانى سۈرۈش تەسىرىدە ئىكەن.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى، ئەستە تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشى، باش ئاغرىش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ناچارلىشىش قاتارلىق ئەھۋاللارغا سېرىق ھېلىلە بىلەن مۇراببا تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ ياكى سېرىق ھېلىلە پوستى، بەلىلە، ئامىلە، سېرىق ئوت، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇقىنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ تالقان قىلىپ، كۈنىگە 5g دىن 3 ۋاخ ئىچىپ بەرسە يۇقىرىقى كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئەفتمۇن (سېرىق يۆگەي)

تەبىئىي: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: بەدەندىكى يەللەرنى تارقىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، سەۋدا، بەلغەملەرنى سۈرۈش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، مېڭىنى تازىلاش، كۆڭۈلنى خۇشال قىلىش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: سېرىق ئوت 30g، قىزىلگۈل 15g، چىلان 20g، بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ دەملەپ ئىچىپ بەرسە، سەپرادىن بولغان باش ئاغرىقىنى يوقىتىدۇ. نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇپ، كۆڭۈلنى خۇرسەن قىلىدۇ. 15g سېرىق ئوتنى 200ml كالا سۈتىگە چىلاپ، 30ml سىركەنجىۋىل قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، نېرۋا ئاجىزلىقى ۋە سەۋدادىن بولغان باش ئاغرىقى كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ. سېرىق ئوت، قىزىلگۈل، ئۈستقۇددۇس، گاۋزىبانلارنىڭ ھەر بىرىنى 20g دىن ئېلىپ، بىرلەشتۈرۈپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، كۆڭۈلنى خۇرسەن قىلىش، باش ئاغرىقىنى قالدۇرۇش تەسىرىنى بېرىدۇ. سېرىق ئوتنى ئايرىم ياكى چىلان بىلەن قوشۇپ دەملەپ ئىچسە مېڭە قان تومۇر قېتىش، يۈرەككە قان يېتىشمەسلىك كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

بادام شېرىن (قاتلىق بادام)

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

تەسىرى: مېڭىنىڭ ئەستە قالدۇرۇش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، بەدەننى سەمىرىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: 100g بادام مېغىزىنى قايناق سۇغا چىلاپ قويۇپ،

يۇمشىغاندا ئۈستىدىكى پوستىنى ئېلىۋېتىپ، قۇرۇتۇپ 300g ناۋات بىلەن بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ، مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىپ بەرسە، مېڭە-نىڭ ئەستە تۇتۇش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ. بادام 100g، ياڭاق مېغىزى 100g، قۇرۇتۇلغان قىزىل ئۈزۈم 100g. بۇلارنى سوقۇپ خېمىر قىلىپ، 20g ئاقىر قەرھانى سوقۇپ تالقان قىلىپ، 300g ئېرتىلگەن ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، ئىستېمال قىلسا نېرۋىنى كۈچەيتىدۇ. ئۇيقۇنى ياخشىلايدۇ. مەنىي كۆپەيتىپ، جىنسىي قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ. بادام مېيىنى ئايرىم ياكى كۆكنار مېيى بىلەن قوشۇپ چېكە قىسمىنى مايلاپ بەرسە ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

چىلان

تەبىئىي: مۆتىدىل.

تەسىرى: نېرۋىنى كۈچەيتىش، تىنچلاندۇرۇش (نېرۋىغا ئارام بېرىش) تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: چىلاننى قاينىتىپ، سۈيىگە شېكەر سېلىپ، شەربەت تەييارلاپ بېرىلسە قان، سەپرادىن بولغان نېرۋا قوزغىلىش، مېڭە، يۈرەك ئاجىزلىقى، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ. بىدىمىشكى، سېرىق ئوت، چىلانلارنى 20g دىن ئېلىپ، دەملەپ ئىچىلسە مېڭە قان تومۇر قېتىشتىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. چىلاننى يالغۇز دەملەپ ئىچسە سەپرا-دىن بولغان باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

گاۋزبان

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: مېڭە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكى ئۈچۈن گاۋزبان 15g، قىزىلگۈل، سۈمبۇل، بىدىمىشكى، چىلان قاتارلىقلارنى 10g دىن ئېلىپ، دەملەپ ئىچىپ بەرسە ئۇيقۇنى ياخشىلايدۇ. نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ، كۆڭۈلنى خۇرسەن قىلىدۇ. گاۋزباندا شەربەت تەييارلاپ، كۈنىگە 50ml دىن 3 ۋاخ ئىچىپ بەرسە مېڭە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىنى بېرىدۇ. ئۇنىڭ خېمىرى گاۋزبان ئەنبرى دېگەن مۇرەككەپ ياسالماسى كلىنىكىدا مېڭە، يۈرەك كېسەللىكلىرىگە كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئادەمگىياھ (رىنىشك)

تەبىئىتى: ئىسسىققا مايىل مۆتىدىل.

تەسىرى: مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت پائالىيىتىنى ياخشىلايدۇ. بولۇپمۇ نېرۋىنىڭ تورمۇزلىنىش جەريانىنى كۈچەيتىدۇ. شۇڭا قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىش تىپلىق نېرۋا ئاجىزلىقىغا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. چوڭ مېڭە پوستلىقىنى قوزغىتىپ ئەقلى كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. ئەقلى ھارغىنلىقىنى تۈگىتىدۇ. ئۇزاق ۋاقىت ئىستېمال قىلىسمۇ ئەكس تەسىرى يوق.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۈنۈتقاقلق، ئاسان چارچاش، ئۈي-قۇسزلىق، جىنسىي ئىقتىدارنىڭ تۆۋەنلەپ قېلىشى ۋە ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقىغا مەخسۇس ئۆزىنى تالقان قىلىپ 3g دىن ئىچىپ بېرىلىدۇ ياكى باشقا مۇناسىپ دورىلار بىلەن شەربەت، مەجۇنات تەييارلاپ ئىچىشكىمۇ بولىدۇ.

زەپەر

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: كۆڭۈلنى ئېچىش، ھېس-تۇيغۇنى كۈچەيتىش، توقۇل-مىلاردا تۇرۇپ قالغان ماددىلارنى پىشۇرۇش، تارقىتىش، تەڭشەش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇش، جىنسىي قۇۋۋەتنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، يۈرەككە قۇۋۋەت بېرىش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: گاۋزىبان ھىندى، لاچىندانە ھىندى، قىزىلگۈل، زەپەرلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇپ، ناۋات بىلەن دەملەپ ئىچىلسە مېڭە، يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ. زېھنى قۇۋۋەتنى ئاشۇرۇپ ئەستە تۇتۇش كۈچىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. كۆڭۈلنى خۇرسەن قىلىدۇ. ئۇيقۇنى نورماللاشتۇرىدۇ. ئۇد سەلب، ئاقىر قەرھا، ئۈستقۇددۇس، بىستىپايەنج ھەر بىرىنى 20g دىن يۇمشاق سوقۇپ، زەپەرنى 2g ئېلىپ سالايە قىلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، 150g ئېرىتىلگەن ھەسەل بىلەن خېمىر دورا تەييارلاپ كۈنىگە 3 ۋاخ 6g دىن ئىستېمال قىلسا زەئىپلىشىش خاراكتېرلىك نېرۋا ئاجىزلىق كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

سۇمبۇل

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: تىنچلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە بولۇپ، چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىنىڭ تورمۇزلىنىش جەريانىنى كۈچەيتىپ، قوزغىلىش-چانلىقنى تۆۋەنلىتىدۇ. نېرۋا خىزمىتى قالايمىقانلىشىش، قالدانبەز خىزمىتى كۈچىيىپ كېتىش كېسەللىكلىرىنى داۋالاش تەسىرىگە ئىگە. ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، روھى جىددىيلىك قاتارلىقلاردا سۇمبۇلدىن 15g، بادىرەنجى بۇيا، قىزىلگۈل، گاۋزىبانلارنى 10g دىن ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ دەملەپ ئىچىلسە ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى. سۇمبۇلنى ناۋات بىلەن دەملەپ كۈندە كەچتە ئىچىپ بەرسە ئۇيقۇسىزلىق ۋە مەنىي تېز كېتىش كېسەللىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۇنى شەربەت قىلىپ ئىچىشكە ۋە باشقا نېرۋا، يۈرەك كېسەللىكلىرىنىڭ مۇرەككەپ دورىلىرىغا قوشۇشقا بولىدۇ.

شازاندرا

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

تەسىرى: مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىپ، زېھنى قۇۋۋەت-نى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ئۇنۇتقۇچلىقنى تۈگىتىش، تىنچلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى كېسەللىكىدە 15g شازاندرا سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ ياكى ئۇنى ناۋات، شېكەر بىلەن مۇۋاپىق ئۆلچەمدە

شەربەت تەييارلاپ ئىچىلىشمۇ بولىدۇ. شازاندىرا، چىلان، ئارچا مېۋىسى- سىنىڭ ھەر بىرىنى 10g دىن ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلسە ئۇيقۇسىز- لىق، باش ئاغرىش، ئاسان چارچاش، روھى جىددىيلىك ئەھۋاللىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

قاپاق

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق. تەسىرى: مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، توسال- غۇلارنى ئېچىش، سۈيدۈك ماڭدۇرۇش، ئىسسىقلىق بولغان باش ئاغرىقى، تەپلەرنى پەسەيتىش تەسىرى بار. ئىشلىتىلىشى: سەپرا مېجەز كىشىلەرنىڭ باش ئاغرىقى، ئۇيقۇسىز- لىقى ئۈچۈن خام ھۆل قاپاقنى ئېزىپ سۈيىنى باشقا قۇيسى ياكى قاپاق مېيى تەييارلاپ چېكە قىسمىنى مايلاپ بەرسە بولىدۇ. ئىسسىق- لىق بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى، ئاياللاردىكى خەفەقان (يۈرەك تىترەش) ئۈچۈن پوستى قېتىشىمىغان خام قاپاقنى توغراپ قاپاق ئېشى قىلىپ ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. خام قاپاقنى ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ئىستېمال قىلسا قىزىتما پەسەيتىش، جىگەردىكى توسالغۇنى ئېچىش، قاننىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. مېيى مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزۈپ، ئۇيقۇ كەلتۈرۈشكە ئىنتايىن ياخشى.

قىزىلگۈل

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق، مۆتىدىلگە مايىلاق.

تەسىرى: نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتما قايتۇرۇش، ئىچىنى قاتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا، يۈرەك ئاجىزلىقى كېسەللىكى ئۈچۈن قىزىلا-گۈلنى دەملەپ، تەمىنى چىقىرىپ ئىچىپ بەرسە مەنپەئەت قىلىدۇ. قىزىلگۈل، لاجىندانە، زەپەرلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، دەملەپ ئىچسە كۆڭۈلنى ئېچىپ، روھنى كۆتۈرىدۇ، يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ. قىزىلگۈل بىلەن ماي تەييارلاپ باش، چېكە قىسمى مايلاپ بېرىلسە ئىسسىقلىقتىن بولغان باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. سەپرادىن بولغان بوغۇم ئاغرىقى ئۈچۈن ئاغرىغان جاي مايلاپ بېرىلسە بولىدۇ. قىزىلگۈل نېرۋا ئاجىزلىقىنىڭ تۈرلۈك مۇرەككەپ دورىلىرىغا قوشۇلىدۇ.

كېۋەز چېچىكى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

تەسىرى: نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، مېڭە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: كېۋەز چېچىكىنى قايناق سۇ بىلەن دەملەپ ئىچسە نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ. مېڭىنىڭ خىزمەت پائالىيىتىنى ياخشىلايدۇ. كېۋەز چېچىكىدە شەربەت تەييارلاپ، كۈنىگە 50ml دىن 3 ۋاخ ئىچىپ بەرسە مېڭە، يۈرەك ئاجىزلىقى، مالپىخۇلىياغا مەنپەئەت قىلىدۇ. قىزىلگۈل 10g، كېۋەز چېچىكى 30g، فەرەنجىمىشكى 20g، بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ شەربەت تەييارلاپ ئىچىلسە ئۇزۇنغا سوزۇلغان روھى

ئاجىزلىق، ۋەسۋەسەچىلىك، ئۇيقۇسىزلىق كېسەللىكى ئۈچۈن ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. گۈلقەنت تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا مېڭە، يۈرەكنى كۈچەيتىش تەسىرى تېخىمۇ ياخشى.

ھەسەل

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: توسالغۇلارنى ئېچىش، مېڭىنىڭ ھۆللۈكىنى تۈگىتىش، پەي-نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، تىنچلاندۇرۇش، ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، تېرىنى پارقىرىتىش تەسىرىگە ئىگە. ئىشلىتىلىشى: سوغۇقتىن بولغان نېرۋا ئاجىزلىقى، سېزىم-ھېس تۇيغۇلارنىڭ سۇسلۇقى ئۈچۈن سېرىق ئوت 30g، ئۈستقۇددۇس 20g، گاۋزبان 15g، فەرەنجىمىشكى 10g مۇۋاپىق سۇ بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ، 250g ھەسەل قوشۇپ تەييارلانغان دورىنى كۈنىگە 50g دىن 3 ۋاخ ئىچىپ بەرسە ئۇنۇتقاقلىق، نېرۋا ئاجىزلىقى، مېڭە قان تومۇر قېتىش كېسەللىكى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ. بىر قوشۇق ھەسەلنى بىر پىيالە قايناق سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، كۈنىگە 3 ۋاخ مۇشۇ ئۇسۇلدا ئىچىپ، بىر ئايغىچە داۋاملاشتۇرسا ئاياللاردىكى تۇخۇم نەيچىسى ئىششىقى، بالىياتقۇ ئىششىقى، نېرۋا زەئىپلىكى، ئاق خۇن كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ.

ئۈستقۇددۇس

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق

تەسىرى: مېڭىنى تازىلاش، پەي، نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىد-

لارنى قوزغىتىش تەسىرى بار.
ئىشلىتىلىشى: ئۇنۇتقاقلىق، بەدەن ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا، تىتىرمە
كېسەللىكلىرىگە ھەم ھەر خىل سەۋەبلەردىن پەيدا بولغان نېرۋا
ئاجىزلىقى ئۈچۈن ئۈستقۇددۇس، سېرىق ئوت، كابىلە ھېلىلە پوستى،
قىزىلگۈل، ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل ھەر بىرىدىن 30g دىن
ئېلىپ، شېكەر قوشۇپ شەربەت تەييارلاپ، كۈنىگە 50ml دىن 3
ۋاخ ئىچۈرۈلسە بولىدۇ. ئۇنىڭ شەربىتى ئۈستقۇددۇس، ئىترىفىلى
ئۈستقۇددۇس قاتارلىق مۇرەككەپ دورىلىرى ئوخشاشلا يۇقىرىقى كې-
سەللىكلەرگە ياخشى پايدا قىلىدۇ.

پىلە غوزىسى (ئەۋرىشىم)

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
تەسىرى: مېڭە، يۈرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، جىنسىي قۇۋۋەتنى
ئاشۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش تەسىرىگە ئىگە.
ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى ۋە تۈرلۈك يۈرەك كېسەللىكلىرىگە،
جىنسىي ئىقتىدارى ئاجىزلاش، ئاشقازان ۋە جىگەر مەنبەلىك ئىشتىھا-
سىزلىق كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ. شەربەت تەييارلاپ ئىچۈرۈشكە
بولىدۇ. خېمىرى ئەۋرىشىم، جەۋھىرى مۇپەررىھى ئەۋرىشىم قاتارلىق
مۇرەككەپ دورا نۇسخىلىرىنى تەييارلاشتا ئاساسلىق دورا قىلىنىدۇ.

بادرەنجى بۇيا

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
تەسىرى: تىنچلاندۇرۇش، مېڭە، يۈرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش،

كۆز، قۇلاق، تىل، بۇرۇننىڭ سېزىملىرى ۋە سىرتقى تەسىرلەرگە بولغان سەزگۈرلۈكنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار ۋە نەپەس سىقىلىش، يۆتەل كېسەللىكلىرىگىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: بادىرەنجى بۇيا، گاۋزىبان، سۇمبۇل بىلەن قوشۇپ دەملەپ ئىچىلسە نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇپ، كۆڭۈلنى خۇرسەن قىلىش، يۈرەكنى كۈچەيتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. ئايرىم ھالدا شەربەت تەييارلاپ 50ml دىن 3 ۋاخ ئىچىلسە نېرۋىنى كۈچەيتىش، يۈرەك رىتمىنى ياخشىلاش، ھاسىراشنى تۈگىتىش رولىنى ئوينايدۇ.

بىدىمىشكى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

تەسىرى: كۆڭۈلنى خۇشال قىلىش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتما قايتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: ئىسسىقلىقتىن بولغان مېڭە، يۈرەك ئاجىزلىقى، مېڭە قان تومۇرلىرى قېتىش كېسەللىكى ئۈچۈن بىدىمىشكى 20g، چىلان 15g، سېرىق يۆگەي 10g، بۇلارنى قوشۇپ قايناق سۇ بىلەن دەملەپ ئىچىشكە بېرىلسە بولىدۇ. يۈرەك سانجىقى كېسەللىكى ئۈچۈن يۇقىرىدىكى دەملەمنىڭ ئۈنۈمى ياخشى. ئۇندىن باشقا ئەرقى بىدىمىشكى تەييارلاپ ئىشلىتىشكىمۇ، ئايرىم دەملەپ ئىچىشكىمۇ بولىدۇ.

رەيھان

تەبىئىتى: ئىسسىققا مايىلراق مۆتىدىل.

تەسىرى: مېڭە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى ئېچىش، توسال-
غۇلارنى تۈگىتىش تەسىرى بار.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى، خەفەقان كېسەللىكلىرى ئۈچۈن
رەيھان بىلەن شەربەت تەييارلاپ ئىچىلسە بولىدۇ. ئۇنۇتقاقلىق، زېھنى
ئاجىزلىقى كېسەللىكى ئۈچۈن رەيھان، سېرىق ئوت، قىزىلگۈل قاتار-
لىقلاردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ دەملەپ ئىچىلسە ئۈنۈمى ياخشى،
ئۇندىن باشقا شارابى رەيھان تەييارلاپ ئىچىلسىمۇ بولىدۇ.

فەرەنجىمىشكى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

تەسىرى: مېڭىنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، باش ئاغرىقىنى پە-
سەيتىش، يۈرەك، ئاشقازان، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىگە ئىگە.
ئىشلىتىلىشى: فەرەنجىمىشكىنى ئايرىم ھالدا دەملەپ ئىچىپ بەرسە
مېڭىنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ. باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. ئېغىزنى
خۇشبۇي قىلىدۇ. شەربەت تەييارلاپ كۈنىگە 50ml دىن 3 ۋاخ
ئىچىپ بەرسە مېڭە، يۈرەكنى كۈچلەندۈرىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

لسانۇل ئەسافىر (ئەرمۇدۇن دەرىخى ئۇرۇقى)

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

خۇسۇسىيىتى: باھنى قۇۋۋەتلەش، مەنىي پەيدا قىلىش، ئاغرىق
توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

ئىشلىتىلىشى: نېرۋا ئاجىزلىقى، خەفەقان، جىنسىي ئاجىزلىق،

نەپەس سىقىلىش، بەل، بالياتقۇ ئاغرىقى ۋە مەنىي تۇتالماسلىق
 كېسەللىكى ئۈچۈن يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ، كۈنىگە 3 ۋاخ
 4g قاينىتىلغان سۈت بىلەن ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ. جىنسىي قۇۋۋەتنى
 ئاشۇرۇشقا سۇفۇپى ھەر قېتىمدا 3g دىن يىلىتىلغان تۇخۇم بىلەن
 ئارىلاشتۇرۇپ 3 ۋاخ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ. زەپەرنى، ھەسەل بىلەن
 قوشۇپ ئىستېمال قىلسا نېرۋىنى كۈچەيتىش، باھنى قوزغاش تەسىرىدە
 نى بېرىدۇ.

رەتسىمىيەت

رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت

رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت

(رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت)

رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت

رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت
 رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت رەتسىمىيەت

مەسئۇل مۇھەررىرى: پەتتار مەخمۇت
كوررېكتورى: نىساگۈل ئابدۇللا

نېرۋا ئاجىزلىقىنى ئۇيغۇر تېبابىتىدە داۋالاش
تۈزگۈچى: مۇھەممەتتىياز ئابلەت ھاجى

شىنجاڭ پەن-تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى (W) نەشر قىلدى
(ئۈرۈمچى شەھىرى بۇلاقبېشى كوچىسى 66-قورۇ، پوچتا نومۇرى 830001)
ئۈرۈمچى تىيەنپىڭ باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى
شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى تارقاتتىدۇ
787×1092 م 1/32 فورمات 2.25 باسما تاۋاق
1999- يىل 10- ئاي 1- نەشرى 2002- يىل 7- ئاي 2- قېتىم بېسىلدى
تراژى: 3000-6050

ISBN7-5372-2174-X/R. 274
باھاسى: 3.20 يۈەن